

Roskilde Amt




Borup Sø
1989-2001



Teknisk
Forvaltning

VANDMILJØ
overvågning



Roskilde Amt

Maj 2002

VANDMILJØovervågning

Borup Sø

1989-2001

Titel: VANDMILJØovervågning. Borup Sø 1989-2001

Udarbejdet af: Roskilde Amt, Teknisk Forvaltning

Tekst og figurer: Per Helmgaard

Kortmateriale: Udsnit af kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med copyright Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/KD.86.1035.

Tryk: 1. oplag

ISBN: 87-7800-527-2

Købes hos: Roskilde Amt, Biblioteket, Køgevej 80, 4000 Roskilde, tlf.: 46 30 35 52

Pris:

Indholdsfortegnelse

- 1. Sammenfatning 5**
- 2. Indledning 8**
- 3. Klimatiske forhold 9**
- 4. Sø- og oplandsbeskrivelse samt målsætning 11**
- 5. Søtilløb - vandføring og stofkoncentrationer 13**
 - 5.1 Vandføring 13
 - 5.2 Fosfor 13
 - 5.3 Kvælstof 14
- 6. Vandbalance 15**
- 7. Stofbalance 17**
 - 7.1 Fosfor 17
 - 7.2 Kvælstof 19
 - 7.3 Jern 20
- 8. Fysisk-kemiske målinger i søen 22**
 - 8.1 Næringsstoffer 22
 - 8.2 Øvrige målinger i øvandet 24
- 9. Biologiske målinger i søen 26**
 - 9.1 Planteplankton 26
 - 9.2 Dyreplankton 27
 - 9.3 Fiskebestand 29
 - 9.4 Samspillet mellem stofkoncentrationer, plankton og fiskebestand 31
- 10. Miljøfremmede stoffer og tungmetaller 33**
 - 10.1 Tungmetaller 33
 - 10.2 Miljøfremmede stoffer 33
- 11. Konklusion 35**
- 12. Referencer 36**
- 13. Bilagsfortegnelse 37**

Forord

I 1987 vedtog Folketinget Vandmiljøplanen, hvis formål er at reducere udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet. For at kunne følge effekterne af de reguleringer og investeringer, som er gennemført i forbindelse med Vandmiljøplanen, blev der i efteråret 1988 iværksat et intensivt overvågningsprogram af grundvand, spildevand, overfladevand og atmosfæren.

Som en del af dette program blev 37 sører udpeget som overvågningssøer. Søerne blev udvalgt således, at de er repræsentative for de øvrige danske søer. I Roskilde Amt er udvalgt to overvågningssøer, Gundsømagle Sø og Borup Sø. Antallet af overvågningssøer er senere reduceret til 31.

Ved revisionen af overvågningsprogrammet i 1998 ændredes overvågningen fra specifikt at være rettet mod at opgøre effekterne af de reduktionsmål, der bl.a. blev opstillet i Vandmiljøplanen, til at omfatte vandmiljøets tilstand i en bredere forstand. Eksempelvis er overvågningen af tungmetaller og miljøfremmede stoffer nu integreret i overvågningsprogrammet. Samtidig ændrede overvågningsprogrammet navn fra "Vandmiljøplanens Overvågningsprogram" til "Nationalt Program for Overvågning af Vandmiljøet 1998-2003", i daglig tale blot NOVA-2003. Hele NOVA 2003 overvågningsprogrammet er beskrevet i /1/.

Som regionale myndigheder er det amternes opgave at føre tilsynet med overvågningssøerne. Amterne behandler de indsamlede data og udgiver årligt rapporter om tilstanden og udviklingen i de enkelte overvågningssøer. De indsamlede data overføres endvidere til DMU, der på baggrund af disse data og amternes rapporter sammenfatter resultaterne fra alle sørerne i en årlig statusrapport.

1. Sammenfatning

Årets gennemsnitstemperatur var med 8,2 °C lidt over normalen på 7,8 °C. Især oktober var usædvanlig lun, men også januar samt juli og august var varmere end normalt. Nedbørsmæssigt faldt der 703 mm regn mod normalens 603 mm. Den noget større nedbørsmængde i 2001 skyldtes først og fremmest ekstreme mængder regn i august og september.

Vandtilførslen i 2001 var med 1,80 mill. m³ tæt på gennemsnittet for 1989-2000. Vandtilførslen var størst i september måned som følge af den megen nedbør i sensommeren.

Den samlede fosfortilførsel på 218 kg var ligeledes tæt på gennemsnittet på 210 kg for 1989-2000. Søen tilbageholdte også i 2001 en del af den tilførte fosfor, ca. 50 kg, hvorved søsedimentets fosforpulje fortsat stiger.

Den samlede kvælstoftilførsel på 10,4 ton var uændret sammenlignet med året før og under gennemsnittet på 13,2 ton for 1989-2000. Søen tilbageholdte knap 2,5 ton kvælstof svarende til godt 23% af den tilførte kvælstof, hvilket er lidt mere end gennemsnittet på 16% for perioden 1989-2000.

Fosforindholdet i svovlet var med et årgennemsnit på 111 µg P/l lidt højere end i 2000, men dog stadig overvågningsperiodens tredjelaveste. Sommernemsnittet på 180 µg P/l var lidt højere end året før og noget højere end i 1996-97, hvor de hidtil laveste sommermiddelkoncentrationer er registreret.

Årsmiddelkoncentrationen af totalkvælstof var med 3,36 mg N/l lidt højere end i 2000, men stadig periodens næstlaveste. Sommermiddelkoncentrationen var med 1,72 mg N/l derimod den hidtil laveste i overvågningsperioden.

Set for hele perioden 1989-2001 kan der konstateres et signifikant fald i koncentrationerne af både kvælstof og fosfor i svovlet, såvel på års- som sommerbasis.

Sommermiddelsigdybden på 0,91 meter var overvågningsperiodens hidtil bedste.

Sommermiddelbiomassen af plantoplankton var i 2001 med kun 5,7 mm³/l overvågningsperiodens hidtil absolut laveste. Plantoplanktonet var i 2001 desuden atypisk både ved det nærmest totale

fravær af blågrønalger og ved rekylalernes relativ store betydning.

Dyreplanktonbiomassen over sommeren var markant højere end i de foregående par år og græsningstrykket på plantoplanktonet var i perioder så højt, at dyreplanktonet har haft en regulerende effekt på især de små algeformer.

I 1996 blev der indledt en opfiskning af søens store fredfiskebestand med det formål, at fremskynde en positiv udvikling i søen.

Siden opfiskningen blev påbegyndt, er der fjernet godt 9,7 ton skaller og brasener fra søen. Samtidig er der i 2001 utsat omkring 600 kg store aborrer.

Fiskeundersøgelsen i efteråret 2001 viste, at fiskebestanden har ændret sig markant de sidste par år. Mængden af aborrer er således steget meget betydeligt og aborrebestandens størrelsesstruktur er ændret, således at der nu i modsætning til tidligere er mange store, rolevende aborrer. Dette vil forhåbentligt føre til, at aborrerne i søen fremover i større grad vil være i stand til at regulere mængden af skaller og brasener.

Samlet ser det ud til, at opfiskningen muligvis nu kan føre til den varige ændring i fiskebestandens sammensætning, der er en del af forudsætningen for at søen igen bliver klarvandet.

I 2001 blev der for første gang undersøgt for miljøfremmede stoffer i svovlet. Ud af de 75 stoffer, der blev analyseret for, fandtes 13 af dem i vandfassen. Generelt var koncentrationerne af de fundne stoffer dog meget lav. Rester af totalukrudtsmidlet "Round up" blev fundet i samtlige målerunder og i væsentligt højere koncentrationer end nogen af de øvrige miljøfremmede stoffer, men dog ikke i så store koncentrationer, at det vurderes at have nogen påviselig effekt på søens plante- og dyreliv.

Borup Sø er generelt målsat (B) hvilket bl.a. indebærer krav til en gennemsnitlig fosforkoncentration mindre end 150 µg P/l og en sigtdybde ikke under 1 meter, begge beregnet som sommernemsnit. Desuden er der krav om en udbredt undervandsvegetation og en varieret og alsidig fiskebestand uden masseforekomst af fredfisk. For nærværende er ingen af kravene opfyldt.

Den iværksatte intensivering af opfiskningen forventes imidlertid at kunne bringe søen et væsentlig

skridt nærmere målsætningen. Fiskebestanden er godt på vej hertil og sommersigtdybden er heller ikke langt fra målet. Fastholdes den positive udvikling forventes det, at undervandsplanter igen vil indfinde sig i søen og ad åre at kunne dække en stor del af søbunden.

Af afgørende betydning for søens udvikling i de kommende år er det imidlertid, at næringsstoftilførslen til søen reduceres yderligere. Lykkes dette ikke, er der risiko for at søen igen udvikler sig i en negativ retning.

Udviklingen gennem hele overvågningsperioden for udvalgte nøgleparametre er summarisk angivet i tabel 1. Eventuelle udviklingstendenser for hele perioden 1989-2001 er undersøgt ved hjælp af lineær regressionsanalyse og resultaterne af denne analyse er angivet ved hjælp af symboler. Det skal bemærkes, at da den foretagne analyse som nævnt er baseret på hele overvågningsperioden, vil en eventuel ny udvikling inden for de sidste par år ikke nødvendigvis statistisk slå igennem.

Tabel 1. Nøgleparametre i 2001 samt udviklingen i 1989-2001 i belastningsforhold,vandkemi og biologiske parametre. Evt. statistisk signifikante ændringer er undersøgt vha. lineær regressionsanalyse. +/-, +/--, +++/--- og +++++/---- svarer til en stigning/reduktion på henholdsvis 10%, 5%, 1% og 0,1% signifikansniveau. 0 angiver, at der ikke har været nogen signifikant ændring.

Parameter	Enhed	2001	Gns. 1989-2000	Udvikling
Opholdstid	år	0,051	0,063	0
Fosforbelastning	t/år	0,218	0,210	0
	mg/m ² /dag	6,28	6,07	0
Indløbskoncentration (Q-vægtet)	mg P/l	0,120	0,123	0
P-retention (excl. magasin)	mg/m ² /dag	1,508	1,353	0
	%	24,0	21,8	0
Kvælstofbelastning	t/år	10,420	13,173	0
	mg/m ² /dag	300,50	379,91	0
Indløbskoncentration (Q-vægtet)	mg N/l	5,83	7,25	0
N-retention (excl. magasin)	mg/m ² /dag	70,23	48,69	0
	%	23,4	16,1	0
Sediment PTOT (0-2 cm dybde)	mg P/g tv			
Sediment NTOT (0-2 cm dybde)	mg N/g tv			
Fe:P (0-2 cm dybde)				
P total år	mg P/l	0,111	0,137	--
P total sommer	mg P/l	0,180	0,200	--
PO4-P år	mg P/l	0,034	0,023	0
PO4-P sommer	mg P/l	0,048	0,017	0
N total år	mg N/l	3,36	4,52	--
N total sommer	mg N/l	1,72	2,74	---
Uorganisk N år	mg N/l	2,23	2,59	0
Uorganisk N sommer	mg N/l	0,20	0,28	--
pH år		8,1	8,2	0
pH sommer		8,2	8,4	-
Sigtdybrede år	m	1,16	0,95	0
Sigtdybrede sommer	m	0,91	0,59	+
Klorofyl år	µg/l	32	66	--
Klorofyl sommer	µg/l	44	103	--
Suspenderet stof år	mg SS/l	9,1	17,7	---
Suspenderet stof sommer	mg SS/l	14,7	28,7	--
Planteplanktonbiomasse år	mm ³ /l	3,8	11,5	0
Planteplanktonbiomasse sommer	mm ³ /l	5,7	19,4	0
% blågrønalger sommer	%	0,3	27,4	0
% kiselalger sommer	%	49,9	45,2	0
% grønalger sommer	%	13,2	11,6	0
Dyreplanktonbiomasse år	µg TV/l	443	450	---
Dyreplanktonbiomasse sommer	µg TV/l	837	768	---
% hjuldyr sommer	%	8,2	16,6	0
% vandlopper sommer	%	16,0	39,8	0
% cladoceer sommer	%	75,7	43,6	0
% Daphnia af cladoceer	%			
Græsningstryk sommer				
Pot. græsning				
% af planteplanktonbiomasse	%	62,1	20,6	0
% af planteplanktonbiomasse < 50 µm	%	78,7	69,2	--
Fisk				
Total antal (CPUE-garn)	stk.	233		
Total vægt (CPUE-garn)	kg	6,080		
% rovfisk i antal (CPUE-garn)	%	19,9		
% rovfisk i vægt (CPUE-garn)	%	34,3		
Fiskeyngel i littoralen	stk./m ³	1,552		
Fiskeyngel i pelagiet	stk./m ³	6,453		

2. Indledning

Borup Sø indgår under det nationale overvågningsprogram af vandmiljøet (NOVA) og er udvalgt som repræsentant for den type af søer, hvor næringsstofbelastningen primært stammer fra landbrugdrift.

Nærværende rapport omhandler resultaterne fra overvågningen af Borup Sø i 2001 samt udviklingen siden 1989. I overensstemmelse med paradigmaet /2/ er der i år tale om en normalrapportering.

Der er i rapporten generelt fokuseret på eventuelle udviklingstendenser i perioden 1989-2001 samt på sammenhænge mellem de fysisk-kemiske forhold, dyre- og planteplanktonet og søens fiskebestand.

I 2001 er der ud over det faste tilsyn foretaget en fiskeundersøgelse med henblik på stadig at følge effekterne af den opfiskning, der blev indledt i 1996. Endvidere er der foretaget en undersøgelse af tungmetalindholdet og indholdet af miljøfremmede stoffer i svovandet.

Samtlige data fra tilsynet i 2001 er videresendt til DMU, hvor de vil indgå i den nationale rapportering af miljøtilstanden i overvågningssøerne.

3. Klimatiske forhold

Klimatiske forhold påvirker både direkte og indirekte vandkemiske og biologiske forhold i en sø. Store nedbørsmængder, specielt i vinterhalvåret, betyder eksempelvis generelt en større udvaskning af næringsstoffer fra dyrkede arealer og dermed en tilsvarende større transport af disse næringsstoffer til søen.


På samme måde spiller temperaturen eksempelvis en rolle for udviklingen af plante- og dyreplanktonet over året og for de forskellige fiskearters gydesucces. Derfor er klimatiske forskelle fra år til år af væsentlig betydning for tolkningen af årets målereultater.

I det følgende beskrives de klimatiske forhold i 2001 og der sammenlignes med "normaler" forstået som gennemsnit for en længere årrække. I erkendelse af, at eksempelvis nedbørsmængderne varierer betragteligt fra landsdel til landsdel, er der for flere af parametrene anvendt data fra søens nære opland. Dette opland svarer typisk til et område på $20 \times 20 \text{ km}^2$, for nedbørens vedkommende dog $10 \times 10 \text{ km}^2$.

Års- og månedsmidler for temperatur, nedbør, fordampning, solskinstimer, indstråling og vindstyrke findes i bilag 1.

Temperatur

Gennemsnitstemperaturen i 2001 var med $8,2^\circ\text{C}$ lidt over normalen på $7,8^\circ\text{C}$. Især oktober var usædvanlig lun, men også januar samt juli og august var varmere end normalt. Derimod var marts, juni og december forholdsvis kolde måneder (figur 1).




Figur 1. Gennemsnitlig månedstemperatur i 2001 sammenlignet med perioden 1961-90 (data fra DMI $20 \times 20 \text{ km}^2$ grid 20156).

Solskinstimer

Antallet af solskinstimer i 2001 opgjort ved målestasjonen ved Kbhs Lufthavn var 1971 mod normalt 1754 (gennemsnit for perioden 1961-90). Også i sommerperioden maj - september var antallet af solskinstimer med 1322 større end normalens 1143 timer.


Som det fremgår af figur 2, var der især flere solskinstimer i sommerperioden maj - august, men også i februar, marts og november var der flere solskinstimer end normalt.



Figur 2. Antallet af solskinstimer pr. måned i 2001 sammenlignet med perioden 1961-90 (data fra Kbhs Lufthavn).

Nedbør

Den samlede årsnedbør ved søen i 2001 på 703 mm var væsentligt større end de 630 mm, der er gennemsnittet ved søen for perioden 1961-90.




Figur 3. Månedsnedbør i 2001 sammenlignet med gennemsnittet for perioden 1961-90 (data fra DMI $10 \times 10 \text{ km}^2$ grid 10531).

Som det ses af figur 3, var august og september ekstremt regnfulde, begge med en nedbørsmængde over det dobbelte af normalen. I årets øvrige måneder var nedbøren generelt enten tæt på eller under normalen. Især maj og juni var nedbørsfattige måneder.

Vindstyrke

Dage med blæst kan have stor betydning for de kemisk/fysiske og biologiske forhold i sørerne. I større sører kan lagdeling af vandmasserne brydes op, men også i de mindre, lavvandede sører kan dage med blæst påvirke forholdene. Eksempelvis ses ofte masseopblomstringer af blågrønalger i Borup Sø i sensommeren, såfremt denne er varm og vindstille. Dage med hård vind kan også forårsage ophvirling af bundmateriale og dermed uklart vand samt en transport af næringsstoffer fra sedimentet og op i vandfasen.

I figur 4 er vist i hvor stort omfang der i de enkelte måneder er forekommet vindstyrker på hård vind eller derover i 2001 sammenlignet med normalen for 1989-98. Som det fremgår af figuren, har perioderne med hård vind eller derover generelt været væsentligt mindre i 2001 sammenlignet med 1989-98.



Figur 4. Forekomsten af perioder med hård vind i 2001 sammenlignet med gennemsnittet for 1989-98 (data fra DMI, målestation Ledreborg allé).

4. Sø- og oplandsbeskrivelse samt målsætning

I dette afsnit er søen og dens opland kort beskrevet. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til tidligere rapporter. Søen og dens historie er desuden udførligt beskrevet af Thorkild Høy og Jørgen Dahl i 3. bind af serien om Danmarks sører /3/.

Borup Sø er beliggende umiddelbart vest for Borup by i Skovbo Kommune. Søen er omkranset af pilekrat og i den vestlige ende ellesump. Langs bredden er en veludviklet rørsump, hovedsageligt bestående af tagrør og uden for rørsumpen findes mange åkander. Der er ikke registreret undervandsvegetation i søen ved nogen af undersøgelsene, der startede i 1983.

Søens eneste egentlige tilløb er Borup Bæk, der løber til i den vestlige ende og i søens nordøstlige ende også fungerer som afløb. Borup Bæk har øst for Borup forbindelse med Kimmerslev Møllebæk, der via Kimmerslev Sø har afløb til Køge Å. Kort over søen og dens opland samt placeringen af de anvendte målestationer er vist i figur 5. De vigtigste morfometriske data for søen er vist i tabel 2. Mere udførlige data vedrørende søens dybdeforhold og morfometri findes i bilag 2.

Tabel 2. Morfometriske data for Borup Sø.

Overfladeareal	9,5 ha
Max. vanddybde	2,0 m
Gns. vanddybde	1,1 m
Vandvolumen	100.000 m ³

Det samlede topografiske opland til søen udgør 757 ha og består af deloplelandet til søens tilløb, Borup Bæk, samt det direkte opland til søen. Hovedparten af oplandet (61,6%) består af landbrugsområder, mens skovområder udgør 37,4%. Ferskvandsområder og befæstede arealer udgør med henholdsvis 0,9 og 0,1% kun en meget lille del af oplandet. Set i forhold til den gennemsnitlige arealudnyttelse for hele landet, er søens opland forholdsvis skovrigt, idet skovområderne på landsplan kun udgør omkring 11% af det samlede areal. En detaljeret opgørelse over jordtypefordeling og arealudnyttelse i oplandet findes i bilag 3.

I forbindelse med NOVA programmet skal der i perioden 1998-2003 ske en løbende indsamling af oplandsdata fra de 31 søoplande. Det overordnede formål med at indsamle data vedrørende eksempelvis oplandsafgrænsning, jordbundsforhold og arealanvendelse er, at opnå en større viden om vand- og næringsstoftransporten i de forskellige



søoplande. Ud fra oplandsanalyserne er det målet, at opstille modeller der mere præcis kan simulere betydningen af forskellige tiltag overfor kvælstof- og fosforbelastningen samt dokumentere og forklare udviklingen heri /4/.

I oplandet til Borup Sø er der registreret 24 enkelt-ejendomme, hvoraf de 23 er helårshuse. Antallet af PE er opgjort til 60, mens den samlede belastning fra disse ejendomme er opgjort til 15 kg fosfor, 70 kg kvælstof samt 328 kg Bl₅. Der er ingen direkte punktkilder i oplandet til søen.

Målsætning

Borup Sø er tildelt en generel målsætning (B) svarende til en vandkvalitet, der er upåvirket/svagt påvirket af menneskelige aktiviteter. For at opfylde denne målsætning skal følgende krav være opfyldt:

- Sigtdybden skal være over 1 meter og total-fosforkoncentrationen mindre end 150 µg P/l. Begge parametre målt som sommergennemsnit.
- Der skal sikres en alsidig og varieret fiskefauna, uden masseforekomst af fredsfisk og med et indslag af større rovfisk.
- Der skal være en undervandsvegetation, hvor dybdeudbredelsen mindst svarer til gennemsnittet for sommersigtdybden.



Figur 5. Kort over Borup Sø med topografisk opland og angivelse af målestationer samt kort over søen med angivelse af dybdegrænser.

5. Søtilløb - vandføring og stofkoncentrationer

Målinger af vandføring og stofkoncentration er foretaget på station 948 i Borup Bæk, der er det eneste egentlige tilløb til Borup Sø. Ud af det samlede opland til Borup Sø på 757 ha, dækker målestationen et opland på 425 ha, svarende til en fordeling af målt og umålt opland på henholdsvis 56% og 44%.

Vandføringen er siden 1989 målt kontinuerligt på stationen, mens vandprøver til bestemmelse af stofkoncentrationer er udtaget 26 gange årligt.


Samleskema for års- og sommermiddelværdier i tilløbet på station 948 for henholdsvis vandføring, fosfor- og kvælstofkoncentrationer findes i bilag 4.

5.1 Vandføring

Figur 6 viser vandføringen i Borup Bæk på station 948 i perioden 1989-2001 angivet som tidsvægtede års- og sommermidler.

Årsmiddelvandføringen i 2001 var med 23,8 l/s noget under gennemsnittet for 1989-2000 på 30,1 l/s (median 29,8 l/s).

Sommermiddelvandføringen i 2001 var med 13,5 l/s omvendt større end normalt sammenlignet med gennemsnittet for 1989-2000 på 9,4 l/s (median 5,5 l/s).




Figur 6. Års- og sommermiddelvandføring i Borup Bæk, st. 948, i perioden 1989-2001.

Figur 7 viser månedsmiddelvandføringen på st. 948 i 2001 samt medianværdierne for perioden 1989-2000. Vandføringen i tilløbet er primært styret af overfladeafstrømningen og dermed af forholdet mellem nedbørsmængde, fordampning og nedsivning.

Som det er karakteristisk for vandløbene i den østlige del af landet, varierer vandføringen også i Borup Bæk meget markant over året, med den største vandføring om vinteren og en meget lav vandføring om sommeren, hvor vandløbet i perioden kan tørre helt ud.

Vandføringen i tilløbet var i årets første måneder generelt lavere end normalt som følge af, at nedbørsmængden også var under det normale. Fra slutningen af maj og over i august var vandføringen som i de foregående år meget lav og tilløbet udtørrede i en kort periode i juli.

De store nedbørsmængder i august og september førte i første omgang til en vandmætning af jorden i oplandet og herefter til en usædvanlig stor vandføring i tilløbet, hvor den gennemsnitlige vandføring i september måned var på 54,4 l/s, mod en medianværdi for perioden 1989-2000 på kun 1,8 l/s.



Figur 7. Vandføringen i tilløbet Borup Bæk, st. 948, angivet som månedsmidler for 2001 og som medianværdier for perioden 1989-2000.


5.2 Fosfor

Koncentrationen af totalfosfor i tilløbet følger i vid udstrækning vandføringen. I vinterperioden, hvor vandføringen er størst, ligger fosforkoncentrationen ret konstant omkring 50-100 µg P/l. I sommerperioden stiger fosforkoncentrationen derimod i takt med at vandføringen falder. Denne stigning skyldes primært det forhold, at fosforudledningen fra enkelt-ejendomme ikke fortynes i samme grad i sommerperioden som følge af den lavere vandføring.

Figur 8 viser den vandføringsvægtede koncentration af totalfosfor beregnet som års- og sommermidler for perioden 1989-2001.

Bortset fra at den vandføringsvægtede sommermidelkoncentration i de første to år af overvågningsperioden var noget højere end i den resterende del af perioden, har der ikke været nogen entydig udviklingstendens i den vandføringsvægtede fosforkoncentrationen i tilløbet. Statistisk kan der da heller ikke påvises et eventuelt fald set for hele perioden 1989-2001.

I 2001 var den vandføringsvægtede årsmiddelkoncentrationen med 120 µg P/l tæt på gennemsnittet for 1989-2000 på 123 µg P/l.




Figur 8. Udviklingen i den vandføringsvægtede års- og sommermiddelkoncentration af totalfosfor i perioden 1989-2001.

Den vandføringsvægtede sommermiddelkoncentration i 2001 var med 167 µg P/l i niveau med de foregående fire år og dermed under gennemsnittet for 1989-2000 på 239 µg P/l. At gennemsnittet for hele perioden er så relativt højt skyldes de førnævnte høje koncentrationer i de første par år af overvågningsperioden. Betragtes medianværdien for perioden 1989-2000 er denne da også med 184 µg P/l væsentlig lavere.

Figur 9 viser udviklingen i den vandføringsvægtede års- og sommermiddelkoncentration af opløst fosfat gennem overvågningsperioden.

Også her er der sket et fald i sommermidlen efter de første par år i overvågningsperioden, men hverken for sommer- eller årsmiddelkoncentrationen kan der statistisk for hele perioden 1989-2001 påvises et fald.

Den vandføringsvægtede årsmiddelkoncentrationen i 2001 var med 55 µg PO₄/l lidt højere end i 2000, men under gennemsnittet på 70 µg PO₄/l for hele perioden 1989-2000. Sommermidlen var med 94 µg PO₄/l væsentligt under gennemsnittet på 156 µg PO₄/l for 1989-2000.




Figur 9. Udviklingen i den vandføringsvægtede års- og sommermiddelkoncentration af opløst fosfat i perioden 1989-2001.

5.3 Kvælstof

Modsat fosforkoncentrationen er kvælstofkoncentrationen i tilløbet generelt højest om vinteren og lavest i sommerperioden.

Figur 10 viser udviklingen i den vandføringsvægtede års- og sommermiddelkoncentration af totalkvælstof i tilløbet.



Figur 10. Udviklingen i den vandføringsvægtede års- og sommermiddelkoncentration af totalkvælstof i perioden 1989-2001.

Årsmidlen for 2001 var med 5,83 mg N/l noget under gennemsnittet på 7,20 mg N/l for 1989-2000, mens sommermidlen med 6,01 mg N/l omvendt var noget over gennemsnittet på 4,66 mg N/l primært som følge af en relativ høj kvælstofkoncentration og vandføring i august-september.

Set for hele overvågningsperioden 1989-2001 kan der hverken for års- eller sommermiddelkoncentrationen af kvælstof i tilløbet statistisk påvises et fald i den vandføringsvægtede kvælstofkoncentration.

6. Vandbalance

Beregningsgrundlag

Vandbalancerne for 1989-97 er beregnet ved brug af EDB-programmet STOQ-sømodul, version 3.30, mens der fra og med 1998 er anvendt STOQ-sømodul windows vers. 4.0 til 4.6. De beregnede vandbalancer for 2001 opdelt på månedsbasis findes i bilag 5. Års- og sommerværdier for 1989-2001 findes i bilag 6.

Vandføringen er siden 1989 målt kontinuerligt i tilløbet (st. 948) og afløbet vha. Q/H målere. Ved undersøgelserne i 1983 og 1988 blev vandføringen målt med vingemåler i forbindelse med udtagning af vandprøver. På baggrund af den dermed forbundne store usikkerhed på vandbalancen i 1983 og 1988 er vand- og stofbalancer fra disse år ikke vurderet nærmere.

I STOQ-sømodul opstilles vandbalancen på baggrund af det målte bidrag fra tilløbet, det beregnede bidrag fra umålt opland, den målte fraførsel i afløbet, nedbør og fordampning samt magasineringen i søen som følge af vandstandsændringerne. Vandbalancen afstemmes herefter som tilført overfladevand minus fraført overfladevand, hvor den eventuelt resterende positive eller negative vandmængde henregnes som udveksling med grundvandet, henholdsvis som grundvandsindsivning eller som udsivning til grundvandet.

I forbindelse med temarapporteringen i 1995 /5/ blev det vurderet som meget tvivlsomt, at der sker en grundvandsindsivning til søen. På den baggrund blev det konkluderet, at forskellen mellem tilført og fraført overfladevand ved vandbalanceberegningerne dels skyldes usikkerhed på opgørelsen af de til- og fraførte vandmængder og dels usikkerhed på magasinændringer i søen.

Til- og fraførte vandmængder

Vandbalanceberegningen for 2001 samt gennemsnit og medianværdier for perioden 1989-2000 fremgår af tabel 3.

Den samlede vandtilførsel i 2001 var med 1,80 mill. m³ tæt på gennemsnittet for perioden 1989-2000.

Derimod var den beregnede grundvandsindsivning i 2001 på 0,44 mill. m³ - svarende til ca. 25% af den samlede vandtilførsel - væsentligt større end normalt. Tallet er dog ikke umiddelbart sammenligneligt med gennemsnits- og medianværdier for 1989-2000, da tallet kan være både positivt (indsivning) og negativt (udsivning). Da den beregnede


indsivning af grundvand som nævnt primært kan henføres til usikkerhed omkring til- og fraført overfladevand samt magasinændringer kan det konstateres, at vandbalancen for søen i 2001 er behæftet med en større usikkerhed end normalt.

Tabel 3. Til- og fraførte vandmængder i 1000 m³.

	År 2001	Gns. 1989-2000	Median 1989-2000
Nedbør	78	63	63
Fordampning	62	56	57
Målt opland	750	947	936
Umålt opland	594	757	749
Afløb	1806	1796	1896
Magasin	-3	1	2
Ind-/udsivning	444	85	92
Samlet tilførsel	1803	1840	1937
Samlet fraførsel	1806	1839	1937

I figur 11 er vist de årligt tilførte vandmængder for 1983 og 1988-2001. Beregningerne for 1983 samt 1988 skal som nævnt tages med forbehold, idet vandføringen disse år kun er foretaget med vingemåler i forbindelse med udtagning af vandkemiprøver. Som det kan ses på figuren, varierer den tilførte vandmængde til søen betragteligt fra år til år, med vandmængder omkring 0,6 - 0,8 mill. m³ i tørre år som 1996-97 og op til 3,5 mill. m³ i våde år som 1994.

Tilførte vandmængder 1983 og 1988-2001




Figur 11. Tilførte vandmængder i 1983 og 1988-2001. De angivne vandmængder er for 1983 og 1988 tilført overfladevand. I perioden 1989-2001 er den beregnede indsivning lagt til overfladevandet.

Hydraulisk opholdstid

Den hydrauliske opholdstid for søvandet afhænger af vandføringen i tilløbet og dermed af nedbørsmængden. I år med en stor nedbørsmængde er opholdstiden derfor normalt kort og omvendt lang i nedbørsfattige år.

Figur 12 viser den gennemsnitlige opholdstid på års- og sommerbasis for overvågningsperioden. I 2001 var den gennemsnitlige opholdstid på årsbasis 19 dage mod gennemsnittet for perioden 1989-2000 på 23 dage (median 18 dage). Som det ses på figuren, har den gennemsnitlige opholdstid på årsbasis varieret betydeligt - fra 10 dage i 1994 til 53 dage i 1996.



Figur 12. Års- og sommergennemsnitlig opholdstid i perioden 1989-2001.

Som følge af den tidligere omtalte karakteristiske årstidsvariation i vandføringen i tilløbet, er den gennemsnitlige opholdstid i sommerperioden normalt langt større end opholdstiden på årsbasis (figur 12). I de år, hvor nedbørsmængden og nedbørsfordelingen har været tættest på normalen, har opholdstiden i sommerperioden været omkring 50-75 dage. I de tørre somre 1989, 1992 og 1996-97 var opholdstiden meget lang, omkring 150-200 dage, mens opholdstiden i regnfulde somre er nede omkring 25 dage. I sommeren 2001 var opholdstiden 28 dage, hvilket er blandt de hidtil korteste i overvågningsperioden.

7. Stofbalance

Beregningsgrundlag

Stofbalanceberegningen for 1989-97 er foretaget vha. STOQ-sømodul, vers. 3.30, mens der siden 1998 er anvendt STOQ-sømodul windows vers. 4.0 til 4.6. Stofbalanceberegningerne omfatter totalfosfor, totalkvælstof og totaljern.

Stofbalancerne for 2001 på månedsbasis findes i bilag 5. Årlige stofmængder 1989-2001 samt vandføringsvægtede indløbskoncentrationer for de nævnte parametre findes i bilag 6.

Da de vandføringsvægtede indløbskoncentrationer til søen er identiske med koncentrationerne i tilløbet Borup Bæk, vil de ikke blive nærmere behandlet i dette afsnit. Der henvises i stedet til afsnit 5.

I 1993 blev prøvetagningsstrategien ændret i forhold til de foregående år. Tidligere blev der udtaget prøver i sø og afløb sideløbende, men i perioden 1993-97 er prøverne i vinterperioden skiftevis udtaget i søen og i afløbet, mens der i sommerperioden ikke er udtaget afløbsprøver. I stedet er de målte søkoncentrationer anvendt som afløbsprøver.

Siden 1998 er der igen udtaget separate prøver i afløbet svarende til det normale program (26 prøver/år).

I beregningerne er stoftransporten fra det umålte opland fundet ved at arealkorrigere med det målte opland. Det er dermed antaget, at stofkoncentrationerne fra det målte og umålte opland er ens.

Ved beregningsmetoden er det endvidere antaget, at de ind- og udsivende grundvandsmængder, som STOQ-sømodul programmet beregner, primært er et udtryk for usikkerheden på vandbalancen (jf. afsnit 6). Det betyder, at der reelt er tale om overfladevand. Stofbidraget fra "indsivende grundvand" til søen er derfor beregnet ved brug af vandføringsvægtede stofkoncentrationer i det målte tilløb (station 948). Dette svarer til de anbefalinger, som en teknisk arbejdsgruppe med repræsentanter fra amterne og Danmarks Miljøundersøgelser har givet /6/.

Da beregningsprogrammet STOQ-sømodul tidligere kun kunne anvende en enkelt værdi pr. år for stofkoncentrationen i det indsvivende "grundvand", er der i beregningerne 1989-1998 anvendt vandføringsvægtede årsmedier af stofkoncentrationen i tilløbet. Fra og med 1999 er anvendt de målte stof-

koncentrationer i tilløbet. Stoftransporten fra søen via udsivende "grundvand" er beregnet ved brug af interpolerede stofkoncentrationer i søvandet.

7.1 Fosfor

Årlige til- og fraførsler samt tilbageholdelse


Den samlede til- og fraførsel samt den beregnede tilbageholdelse af fosfor i 2001 er vist i tabel 4. Søen blev tilført 218 kg fosfor, hvilket er tæt på gennemsnittet for perioden 1989-2000 på 210 kg. Tilbageholdelsen i 2001 er beregnet til 52 kg mod et gennemsnit for 1989-2000 på 47 kg.

Tabel 4. Til- og fraført samt tilbageholdt fosfor i kg.

	År 2001	Gns. 1989-2000	Median 1989-2000
Atmosfærisk dep.	1	2	2
Målt opland	90	109	104
Umålt opland	71	86	83
Afløb	165	157	157
Ind-/udsivning	56	7	8
Magasin	1	-1	0
Retention	52	47	43
Samlet tilførsel	218	210	202
Samlet fraførsel	165	164	158

I figur 13 er vist den årlige til- og fraførsel af fosfor i 1983 og 1988-2001. Som tidligere nævnt er vandføringen i tilløbet ikke målt kontinuerligt i 1983 og 1988, hvorfor fosforbalancen for disse to år er behæftet med stor usikkerhed.

Fosforbalance 1983 og 1988-2001




Figur 13. Til- og fraførsel af fosfor i 1983 og 1988-2001.

I 1983 var den beregnede fosfortilførsel på knap 700 kg og dermed væsentligt højere end i nogen af de efterfølgende år. Denne meget store fosfortilførsel er næppe reel, men fremkommet som følge af den usikre opgørelse af vandtilførslen dette år, hvor vandføringen i tilløbet er beregnet ud fra et beskedent antal vandføringsmålinger udført med vingemåler.

Betrages perioden 1989-2001 har fosfortilførslen svinget mellem 460 kg i 1994 - der var et meget nedbørsrigt år - og 100 kg i 1992 - der omvendt var et meget nedbørsfattigt år.

Der kan ikke statistisk påvises ændringer i fosfortilførslen i overvågningsperioden.

I figur 14 er vist den beregnede årlige fosfortilbageholdelse i 1989-2001. På nær i 1993, hvor gennemskylingen af søen begyndte i det meget tidlige efterår, har søen hvert år tilbageholdt fosfor. Denne tilbageholdelse har som maksimum været op til knap 150 kg, svarende til ca. 1,5 g P/m² søareal.



Figur 14. Den beregnede fosfortilbageholdelse (excl. magasinering) i kg for perioden 1989-2001.

I hovedparten af årene har tilbageholdelsen dog været væsentligt mindre med et gennemsnit for årene 1989-2000 på knap 50 kg/år svarende til ca. 0,5 g P/m² søareal. Tilbageholdelsen i 2001 svarede med ca. 51 kg fosfor til gennemsnittet for de foregående år.

Statistisk kan der ikke påvises en udvikling i fosforretentionen for perioden 1989-2001.

Samlet er sedimentets fosforpulje siden 1989 øget med godt 600 kg svarende til ca. 6,5 g fosfor pr. m² søareal.

Fosfortilbageholdelsen finder typisk sted i 1. samt 3.-4. kvartal. I 2. kvartal friges derimod normalt fosfor fra sedimentet, og det er i høj grad denne


årligt tilbagevendende fosforfrigivelse i det sene forår og forsommeren, der styrer søvandets fosforkoncentration i sommerperioden, hvor der føres meget lidt fosfor til søen via tilløbet. Frigivelsen af fosfor i det sene forår og forsommeren er antageligt primært betinget af temperaturstigningen, der medfører forøget biologisk aktivitet i sedimentet.

Kildeopsplitning

De årlige eksterne tilførsler af fosfor opdelt på belastningskilder fremgår af bilag 7, der endvidere indeholder den anvendte beregningsmetode.

I figur 15 er vist de enkelte kilders bidrag til fosfortilførslen i 2001. Atmosfærebidraget er som det fremgår af figuren af en meget beskedent størrelse, hvorfor der reelt kun er 3 fosforkilder tilbage af betydning, - bidraget fra enkeltejendomme, bidraget fra landbrug samt naturbidraget (basisbidraget).

Kildeopsplitning af fosfor 2001




Figur 15. Kildeopsplitning af fosfortilførslen i 2001.

I 2001 udgjorde landbrugsbidraget med 52% lidt over halvdelen af den samlede fosfortilførsel. Naturbidraget udgjorde med 40% det næststørste bidrag, mens bidraget fra enkeltejendomme stort set udgjorde resten.

I figur 16 er vist de enkelte kilders bidrag i perioden 1989-2001.

Som gennemsnit for perioden 1989-2001 har landbrugsbidraget tegnet sig for ca. 41% af den samlede fosfortilførsel, mens bidraget fra enkeltejendomme har udgjort ca. 14%. Sidstnævnte bidrag er muligvis underestimeret, da fosforkoncentrationen i tilløbet specielt i sommerperioden tyder på et ikke uvæsentligt spildevandsbidrag.

Endelig har naturbidraget og det atmosfæriske bidrag i gennemsnit udgjort henholdsvis 44% og knap 1%.



Figur 16. Fosfortilførslen til Borup Sø 1989-2001 fordelt på belastningskilder.

7.2 Kvælstof

Årlige til- og fraførsler samt tilbageholdelse


Den samlede til- og fraførsel samt den beregnede tilbageholdelse af kvælstof i 2001 er vist i tabel 5. Søen blev tilført ca. 10,4 ton kvælstof, hvilket er noget under gennemsnittet for perioden 1989-2000 på 13,2 ton. Tilbageholdelsen i 2001 er beregnet til ca. 2,4 ton kg mod et gennemsnit for 1989-2000 på ca. 1,7 ton.

Tabel 5. Til- og fraført samt tilbageholdt kvælstof i kg.

	År 2001	Gns. 1989-2000	Median 1989-2000
Atmosfærisk dep.	143	156	143
Målt opland	4.370	6.672	6.921
Umålt opland	3.465	5.333	5.512
Afløb	7.911	11.295	10.938
Ind-/udsivning	2.442	821	921
Magasin	74	-1	-33
Retention	2.435	1.688	1.421
Samlet tilførsel	10.420	13.173	13.093
Samlet fraførsel	7.911	11.486	11.529

Den årlige til- og fraførsel af kvælstof i 1983 og 1988-2001 er vist i figur 17. Den tilsyneladende meget store kvælstoftilførsel i 1983 skal tages med et stort forbehold som følge af, at vandtilførslen dette år er meget usikkert bestemt.


Kvælstoftilførslen har gennem perioden 1989-2001 svinget mellem godt 4 ton i det tørre år 1996 til lige godt 20 ton i 1994, der var et meget nedbørsrigt år.



Figur 17. Til- og fraførsel af kvælstof i 1983 og 1988-2001.

Variationen i kvælstoftilførslen er således primært styret af de klimatiske forhold, og statistisk kan der da heller ikke påvises en egentlig udvikling i kvælstoftilførslen for hele perioden 1989-2001.

I figur 18 er vist den beregnede årlige kvælstoftilbageholdelse i 1989-2001. Som det fremgår af figuren, varierer tilbageholdelsen ganske betydeligt fra år til år. Dette hænger sammen med, at tilbageholdelsen ikke alene afhænger af den tilførte kvælstofmængde - der som nævnt varierer ganske betydeligt - men også af opholdstiden i søen.



Figur 18. Den beregnede kvælstoftilbageholdelse (excl. magasinering) i kg for perioden 1989-2001.

Søen tilbageholdte i 2001 ca. 2,4 ton kvælstof svarende til 25,6 g N pr. m² søareal. I procent blev godt 23% af den tilførte kvælstof tilbageholdt i søen mod et gennemsnit på 16% for 1989-2000.

Statistisk kan der ikke påvises en udvikling i kvælstoftilbageholdelsen.


Kildeopsplitning

Fordelingen af den tilførte kvælstof i 2001 på belastningskilder er vist i figur 19. Langt den overvejende del (76%) stammer fra landbrugsområder, mens den resterende del stort set udgøres af naturbidraget.



Figur 19. Kildeopsplitning af kvælstoftilførslen i 2001.

Denne fordeling er stort set identisk med gennemsnittet for 1989-2000, hvor landbrugsbidraget har udgjort 74,6%, naturbidraget 23,4%, bidraget fra enkeltejendomme 0,8% og endelig det atmosfæriske bidrag på 1,2% (figur 20). Der er således reelt kun to betydende kilder til kvælstofbelastningen - landbrugsbidraget og naturbidraget.



Figur 20. Kvælstoftilførslen til Borup Sø 1989-2001 fordelt på belastningskilder.

7.3 Jern


Årlige til- og fraførsler samt tilbageholdelse

Den til- og fraførte jernmængde i 2001 samt den beregnede tilbageholdelse er vist i tabel 6. Tilførslen i 2001 var med godt 1,1 ton lidt over gennemsnittet for 1989-2000.

Tabel 6. Til- og fraført samt tilbageholdt jern i kg.

	År 2001	Gns. 1989-2001	Median 1989-2001
Atmosfærisk dep.	0	0	0
Målt opland	461	468	398
Umålt opland	366	374	318
Afløb	346	452	459
Ind-/udsivning	319	76	37
Magasin	-6	0	-2
Retention	807	465	299
Samlet tilførsel	1.146	928	923
Samlet fraførsel	346	462	467

Som det fremgår af figur 21, har jerntilførslen imidlertid varieret betydeligt fra år til år. Den største jerntilførsel på godt 2 ton fandt sted i 1998, mens der omvendt kun blev tilført omkring 200 kg i de tørre år 1996-97.




Figur 21. Til- og fraførsel af jern i 1990 og 1992-2001. Der er ikke opstillet jernbalancer for 1989 og -91, hvor der ikke blev målt for jernindhold i tilløbet.

Søen tilbageholdte i 2001 godt 800 kg jern, hvilket var over gennemsnittet på knap 500 kg for perioden 1989-2000 (figur 22). De godt 800 kg i 2001 svarer til 70% af den tilførte jernmængde, hvilket er væsentligt mere end gennemsnittet på 45% for perioden 1989-2000.

Tilbageholdelsen har i de fleste år været på omkring halvdelen af den tilførte jernmængde. Nogle år skiller sig dog markant ud i forhold til de øvrige år, med enten en meget lille eller meget stor tilbageholdelse.

Sedimentundersøgelsen i 1997 viste et jern-fosfor forhold i de øverste 10 cm af sedimentet på knap 7:1 mod et tilsvarende forhold i 1990 på ca 6:1 /7/. Selv om jern-fosfor forholdet er steget en smule siden 1990, er der stadig lang vej op til det jern-fosfor forhold på over 15:1, hvor jernindholdet under iltede forhold i sedimentet kan spille en væsentlig rolle for fosforfrigivelsen /8/.



Figur 22. Den beregnede jerntilbageholdelse (excl. magasinering) i kg for 1990 og 1992-2001.

8. Fysisk-kemiske målinger i søen


I dette afsnit præsenteres nogle af de målte parametre i sværvandet i 2001 og en eventuel udvikling i perioden 1989-2001 er vurderet. Års- og sommermidler for samtlige målte parametre i sværvandet samt figurer over udviklingsforløb findes i bilag 8.

8.1 Næringsstoffer

Total fosfor

Fosforkoncentrationen i søen har i alle årene været karakteriseret ved lave værdier i vinterperioden, hvor sværvandskoncentrationen stort set er identisk med indløbskoncentrationen som følge af den korte opholdstid. I sommerperioden løber der normalt kun meget lidt vand til søen, og indløbskoncentrationen er derfor af mindre betydning. Sværvandskoncentrationen stiger i sommerperioden til relativt høje værdier, typisk omkring 200-300 µg P/l, som følge af en fosforfrigivelse fra sedimentet kombineret med den lange opholdstid.

Figur 23 viser denne udvikling i fosforkoncentrationen i sværvandet over året. I 2001 lå fosforkoncentrationen i årets første måneder under normalen for herefter at variere betydeligt i sommerperioden, fra omkring 100 til 300 µg P/l. Fra september og året ud faldt fosforkoncentrationen igen til under gennemsnittet for 1989-2000.




Figur 23. Koncentrationen af fosfor i sværvandet i 2001 samt månedsgennemsnittet for 1989-2000 inkl. 90-10% og 75-25% fraktiler.

Figur 24 viser udviklingen i års- og sommermiddelkoncentrationen af fosfor i sværvandet i perioden 1989-2001. I 2001 var den tidsvægtede årsmiddelkoncentration af fosfor med 111 µg P/l den tredielaveste i overvågningsperioden, hvor kun årsmiddel-

koncentrationen i 1997 og 2000 har været lavere.

Den tidsvægtede sommermiddelkoncentration af fosfor var med 180 µg P/l lidt højere end i 2000, men i niveau med 1999 og dermed stadig lidt højere end i 1996-97, hvor de hidtil laveste sommermiddelkoncentrationer er registreret.

Totalfosfor - års- og sommermidler




Figur 24. Den tidsvægtede års- og sommermiddelkoncentration af totalfosfor i sværvandet 1983 og 1988-2001.

Set for hele perioden 1989-2001 kan der konstateres et signifikant fald i både års- og sommermiddekkoncentrationen af fosfor (lineær regressionsanalyse, $P < 0,05$).

Opløst fosfat

Sværvandets indhold af opløst fosfat ($\text{PO}_4\text{-P}$) i 2001 samt gennemsnittet for 1989-2000 er vist i figur 25.




Figur 25. Koncentrationen af opløst fosfat i sværvandet i 2001 samt månedsgennemsnittet for 1989-2000 inkl. 90-10% og 75-25% fraktiler.

Normalt falder indholdet af opløst fosfat i sommerperioden til under detektionsgrænsen som følge af algeres optag. Opløst fosfat er derfor normalt en potentiel begrænsende faktor for algevæksten i søen om sommeren. Dette var langt fra tilfældet i 2001, hvor søvandskoncentrationen af opløst fosfat fra slutningen af juni og til midten af september var helt usædvanlig høj. I modsætning til de foregående år var opløst fosfat således ikke en potentiel begrænsende faktor for algernes vækst i store dele af sommeren 2001.

Udviklingen i den gennemsnitlige års- og sommermiddelkoncentration af fosfat er vist i figur 26.

Fosfat, års- og sommermidler



Figur 26. Den tidsvægtede års- og sommermiddelkoncentration af opløst fosfat i 1983 og 1988-2001.


Den meget høje sommermiddelkoncentration af opløst fosfat i 2001 betød en brat afslutning på det generelle fald i sommermidlen, der har fundet sted i de foregående år. Sommermiddelkoncentration af opløst fosfat i 2001 var med 48 µg P/l samtidig den hidtil højeste i alle de år, hvor der er målt for opløst fosfat i søen.

Total kvælstof

Modsat fosforkoncentrationen er kvælstofkoncentrationen i søvandet sædvanligvis højest i vinterperioden som følge af de høje kvælstofkoncentrationer i tilløbet i denne periode.

Kvælstofkoncentrationen i søvandet i 2001 samt gennemsnittet for 1989-2000 er vist i figur 27. Kvælstofkoncentrationen lå i 2001 markant under månedsmidlerne for 1989-2000 på nærmest i oktober, hvor koncentrationen var lidt over gennemsnittet.

De generelt lave søvandskoncentrationer i 2001 hang sammen med tilsvarende lave kvælstofkoncentrationen i tilløbet Borup Bæk stort set hele året.




Figur 27. Koncentrationen af kvælstof i søvandet i 2001 samt månedsgennemsnittet for 1989-2000 incl. 90-10% og 75-25% fraktiler.

Søvandets indhold af totalkvælstof beregnet som henholdsvis års- og sommermidler i 1983 og 1988-2001 er vist i figur 28. I 2001 var årsmiddelkoncentrationen 3,36 mg N/l, hvilket er den næstlaveste i overvågningsperioden. Kun i 2000 var årsmiddelkoncentrationen lavere.

Sommermiddelkoncentrationen af totalkvælstof i 2001 var med 1,72 mg N/l den hidtil laveste siden 1989.

Totalkvælstof - års- og sommermidler



Figur 28. Den tidsvægtede års- og sommermiddelkoncentration af totalkvælstof i søvandet 1983 og 1988-2001.


Set for hele perioden 1989-2001 kan der konstateres et signifikant fald i både års- og sommermiddelkoncentrationen af kvælstof i søvandet (lineær regressionsanalyse, $P < 0,05$ og $P < 0,01$ for henholdsvis års- og sommermidlen).

Organisk kvælstof


Langt hovedparten af den kvælstofmængde der tilføres søen, er på nitratform og stammer fra

dyrkede arealer. Koncentrationen af uorganisk kvælstof i søen er derfor sædvanligvis høj i vinterperioden, hvor udvaskningen fra de dyrkede arealer er størst. I sommerperioden falder koncentrationen af uorganisk kvælstof i øvandet dels som følge af en lav tilførsel og dels som følge af denitrifikation samt algernes optag. Koncentrationen af uorganisk kvælstof falder derfor i perioder om sommeren til så lave værdier, at uorganisk kvælstof kan være potentielt begrænsende for planteplanktonet.

I figur 29 og 30 er vist øvandskoncentrationerne af henholdsvis nitrit-kvælstof og ammonium-kvælstof. For begge gælder, at koncentrationerne i 2001 generelt var lave sammenlignet med gennemsnittet for de foregående år.



Figur 29. Koncentrationen af nitrit-nitrat kvælstof i øvandet i 2001 samt månedsgennemsnittet for 1989-2000 incl. 90-10% og 75-25% fraktiler.



Figur 30. Koncentrationen af ammonium kvælstof i øvandet i 2001 samt månedsgennemsnittet for 1989-2000 incl. 90-10% og 75-25% fraktiler.


Set for hele perioden 1989-2001 kan der konstateres et signifikant fald i sommermiddelkoncentrationen

af nitrat-kvælstof (lineær regressionsanalyse, $P < 0,05$).

Koncentrationen af ammonium-kvælstof i øvandet faldt allerede i marts måned til meget lave værdier og på nær en periode i maj-juni var koncentrationen typisk omkring eller under detektionsgrænsen.

Koncentrationen af både nitrat og ammonium var i 2001 i perioder under detektionsgrænsen og uorganisk kvælstof derfor også i 2001 en potentiel begrænsende faktor for planteplanktonets vækst.

Udviklingen i den gennemsnitlige års- og sommermiddelkoncentration af uorganisk kvælstof (nitrit-nitrat-N + ammonium-N) er vist i figur 31.



Figur 31. Den tidsvægtede års- og sommermiddelkoncentration af uorganisk kvælstof i øvandet 1983 og 1988-2001.


Set for perioden 1989-2001 kan der konstateres et signifikant fald i sommermiddelkoncentrationen (lineær regressionsanalyse, $P < 0,05$), mens der ikke er et tilsvarende fald i årsmiddelkoncentrationen.

8.2 Øvrige målinger i øvandet

Klorofyl

Søvandets indhold af klorofyl i 2001 sammenlignet med gennemsnittet for 1989-2000 er vist i figur 32.


Klorofylindholdet i 2001 afveg meget markant fra de foregående år. Efter stort set at have fulgt det normale mønster i årets første måneder begyndte klorofylindholdet stik imod sædvanen at falde i slutningen af april. Dette fald fortsatte til midten af juni, hvor klorofylindholdet nåede helt ned på vinterniveau.



Figur 32. Klorofylindholdet i søvandet i 2001 samt månedsgennemsnittet for 1989-2000 incl. 90-10% og 75-25% fraktiler.

Herefter steg klorofylindholdet efter mod årets maksimum i juli, hvor klorofylindholdet dog stadig var under det normale. Resten af året var klorofylindholdet igen meget markant under normalen.

Klorofylindholdet i søvandet beregnet som sommerringensnit for 1983 og 1988-2001 er vist i figur 33. Det sommerringensnitlige klorofylindhold i 2001 på 44 µg /l var periodens suverænt laveste.




Figur 33. Den tidsvægtede sommermidlerkoncentration af klorofyl a i søvandet i 1983 og 1988-2001.

Selv om der er stor variation fra år til år, er der en tydelig tendens til et generelt lavere klorofylindhold i perioden siden 1995 sammenlignet med de foregående år. Betragtes udviklingen fra 1989 til 2001 kan der da også statistisk påvises et fald i sommermidlen (lineær regressionsanalyse, $P < 0,05$).

Sigtdybde


Figur 34 viser udviklingen i sigtdybden i 2001 sammenlignet med månedsgennemsnittet for 1989-2000. Bortset fra årets første måned var sigtdybden i den resterende del af året over normalen.

Især fra og med maj var sigtdybden markant bedre end tidligere og sigtdybder på en meter eller derover blev nået i både juni og juli.



Figur 34. Udviklingen i sigtdybden i 2001 samt månedsgennemsnittet for 1989-2000 inkl. 90-10% og 75-25% fraktiler.

Den gennemsnitlige sommersigtdybde i 1983 og 1988-2001 er vist i figur 35. I perioden op til 1990 lå sommersigtdybden meget konstant omkring 0,55 meter. I 1991 steg sommersigtdybden en smule til 0,66 meter for herefter at falde markant året efter. Sommersigtdybden lå i de følgende år omkring 0,45 meter, men steg herefter og nåede i 1997 op på 0,87 meter. Herefter faldt sommersigtdybden igen og nåede i 2000 ned på 0,58 meter.



Figur 35. Den gennemsnitlige sommersigtdybde i 1983 og 1988-2001.

Sommersigtdybden i 2001 på 0,91 meter er den hidtil bedste og tæt på målsætningskravet på 1 meter. Betragtes perioden 1989-2001 kan der statistisk påvises en svag stigning i sommersigtdybden (lineær regressionsanalyse, $P < 0,10$).

9. Biologiske målinger i søen

I dette afsnit præsenteres resultaterne af de biologiske undersøgelser i 2001 samt udviklingen i perioden 1989-2001. Søens plante- og dyreplankton er siden 1989 blevet undersøgt efter Miljøstyrelsens retningslinier /9,10/. Hvert års undersøgelser med artslister, volumenberegninger osv. er udarbejdet som interne rapporter. Vigtige nøgletal for planktonet i perioden 1989-2001 findes i bilag 9.

Årstidsvariationer inden for plante- og dyreplanktonets biomasser og artssammensætning er detaljeret beskrevet i tidligere rapporter. I det følgende er der derfor primært fokuseret på markante ændringer i perioden 1989-2001. Til vurderingen af hvorvidt der er sket signifikante ændringer, er anvendt lineær regressionsanalyse mellem tiden (år) og års- og sommernemsnit af planktonbiomassen og -sammensætningen.

Søens fiskebestand er undersøgt i 1988, 1993 og 2000 efter retningslinierne angivet i vejledningen for fiskeundersøgelser fra DMU /11/. Undersøgelserne er særligt rapporteret i /12,13,14/. Derudover er der årligt foretaget fiskeundersøgelser siden 1996 efter et reduceret program med henblik på at følge effekterne af den biomanipulation, der blev sat i værk i 1996. De foreløbige resultater af opfiskningen er ligeledes vurderet i dette afsnit.

Endelig er søens fiskeyngel siden 1998 undersøgt årligt efter retningslinierne i vejledningen for fiskeyngelundersøgelser fra DMU /15/.


9.1 Planteplankton

Udvikling i biomasse og artssammensætning

Sommernemsnittet af planteplankton steg i perioden 1989-91 jævnt, fra 12,4 til 15,0 mm³/l, for herefter i 1992 at stige brat til 29,7 mm³/l, dels som følge af et mindre græsningstryk dette år og dels som følge af en varm sommer, der gav algerne gode vækstbetingelser (figur 36).

I 1993 faldt sommernemsnittet igen som følge af en kølig sommer samt en stor gennemstrømning af søen allerede i september måned.

Året efter steg sommernemsnittet atter bla. som følge af en varm sommer og et lavt græsningstryk og nåede med 29,2 mm³/l op på samme høje niveau som i 1992.



Figur 36. Tidsvægtede sommernemsnit af planteplankton 1989-2001.

I 1995 faldt sommernemsnittet igen som følge af dels en kølig forsomer og dels et øget græsningstryk. I 1996 steg sommernemsnittet til 26,7 mm³/l trods lave planteplanktonbiomasser i maj og juni måned. Årsagen til den høje sommernemsnittet i 1996 var den varme og tørre august måned, der skabte basis for en rekordstør blågrønalgebiomasse, der midt i måneden nåede et ekstremt højt niveau på 173 mm³/l.


I 1997 faldt sommernemsnittet til 10,9 mm³/l, der var det hidtil laveste sommernemsnitt. Årsagen til dette fald var primært udeblivelsen af den massive blågrønalgeoplomstring, der de senere år havde fundet sted omkring august måned. I 1998 steg sommernemsnittet til 18,5 mm³/l, og forøgelsen skyldtes primært en stigning i mængden af kiselalger og rekylalger i forhold til året før. I 1999 lå sommernemsnittet med 18,3 mm³/l i niveau med biomassen i 1998 og ligeledes tæt på gennemsnittet for den foregående periode 1989-98 på 20 mm³/l.

I 2000 faldt sommernemsnittet igen i forhold til de seneste to år og var med 12,3 mm³/l i niveau med biomasserne i 1989 og 1997. Faldet var primært betinget af en mindre biomasse af kiselalger og grønalger, mens biomassen af blågrønalger var i niveau med 1999.

I 2001 fortsatte faldet i algebiomassen og sommernemsnittet på bare 5,7 mm³/l var den hidtil laveste i overvågningsperioden. Faktisk var sommernemsnittet i 2001 kun godt det halve af den hidtil laveste sommernemsnittet registreret i 1997.

Sammenfattende har planktonbiomassen varieret fra år til år med de største biomasser i perioden omkring 1992-96, hvor blågrønalgerne typisk opbyggede en relativ stor biomasse. I den efterfølgende periode har sommermiddelbiomassen af plant plankton generelt været faldende.

Betrages de enkelte algegruppers procentvise andel af biomassen i vækstsæsonen ses blågrønalgernes skiftende betydning tydeligt (figur 37). Blågrønalgernes procentandel var jævnt stigende frem til 1996, hvor de udgjorde 65% af sommerbiomassen. I 1997-98 faldt blågrønalgernes betydning brat, men andelen var igen stigende i 1999-2000 for så stort set at være fraværende i 2001, hvor de kun udgjorde 0,3% af den samlede algebiomasse.



Figur 37. De enkelte algegruppers procentandel af planteplanktonbiomassen i sommerperioderne 1989-2001.


Status 2001

Udviklingen i planteplanktonbiomassen i 2001 er vist i figur 38. I starten af april dominerede kiselalger, afløst af rekylalger i midten af måneden og sidst på måneden af gulalger, der dominerede det meste af maj måned. Fra slutningen af maj til over i juli fik rekylalger større og større betydning, men herefter tog kiselalgerne over og var helt dominerende i sensommeren.

Årets største biomasse på 9,7 mm³/l blev nået i midten af september og her udgjorde kiselagerne - fortrinsvis arter tilhørende den trådformede centriske slægt *Aulacoseria* - 74% af biomassen. Herefter klingede biomassen af kiselalger af og rekylalger blev igen dominerende algegruppe i søen.

Udviklingen i planteplanktonbiomassen i 2001 var atypisk først og fremmest på grund af blågrønalgernes ringe betydning. Blågrønalgerne har i hovedparten af årene opbygget en betydelig biomasse i sensommeren, men de store nedbørsmængder i august og september og den deraf følgende hurtige

vandudskiftning i søen har formodentlig været en medvirkende faktor til blågrønalgerne ringe forekomst.




Figur 38. Udviklingen i planteplanktonbiomassen i 2001.

Derudover var året atypisk ved rekylalgernes relativ store betydning ikke mindst i maj måned, hvor kiselalgerne normalt er den dominerende algegruppe i søen.

9.2 Dyreplankton

Udvikling i biomasse og artssammensætning

Dyreplanktonbiomassen har generelt været faldende fra overvågningsperiodens start og frem til omkring 1996, hvor sommermiddelbiomassen var under en fjerdedel af biomassen i 1989 (figur 39).



Figur 39. Udviklingen i den sommernemmetslige dyreplanktonbiomasse i 1989-2001.


Sommermiddelbiomassen begyndte så igen at stige og nåede med 837 µg tv/l i 2001 det højeste niveau siden 1992.

Nedgangen i dyreplanktonets sommermiddelbiomasse frem til 1996 skyldtes først og fremmest en

nedgang i dafniebiomassen, men også hjuldyrenes og vandloppernes biomasse faldt i perioden.

Betrages de tre dyreplanktongruppers procentandel af sommermiddelbiomassen gennem overvågningsperioden, er der ikke sket signifikante ændringer. Der er således tale om en generel tilbagegang for alle tre grupper (figur 40).

Bemærkelsesværdigt er det imidlertid, at dafnierne i 2001 udgjorde 75% af dyreplanktonbiomassen - den hidtil absolut største andel.




Figur 40. Udviklingen i de enkelte dyreplanktongruppers procentandel af sommermiddelbiomassen 1989-2001.

Status 2001

Udviklingen i dyreplanktonbiomassen over året i 2001 er vist i figur 41.

Dyreplanktonbiomassen var lav frem til begyndelsen af maj, hvorefter der i løbet af maj blev opbygget årets største biomasse på lige knap 4.000 µg tv/l. Dette biomasse maksimum var faktisk usædvanligt stort - det næststørste hidtil registreret i søen - kun overgået én gang i 1989.



Figur 41. Udviklingen i dyreplanktonbiomassen i 2001.

Årets store biomasse maksimum var helt domineret af dafnier, med snabeldafnien *Bosmina longirostris* som den klart mest betydnende art. *Bosmina longirostris* udgjorde således omkring 90% af den samlede dyreplanktonbiomasse i slutningen af maj.

Dyreplanktonbiomassen faldt herefter brat og var i begyndelsen af juli nede på en biomasse på knap 500 µg tv/l. I de følgende måneder klingede biomassen langsomt af, men i hovedparten af perioden stadig med dafnier som de mest betydnende. *Daphnia cucullata* var frem til august den næstvigteste dafnieart og i august og begyndelsen af september den vigtigste art.


Fødebegrensning

Mængden af umiddelbart tilgængelig føde for dyreplanktonet (alger < 50 µm) var generelt ikke begrænsende for dyreplanktonets udvikling i 2001.

Dafnierne var kun fødebegrænsede først i april, først i juni samt i november. De calanoide vandløper var ikke fødebegrænsede på noget tidspunkt.

Græsning

Udviklingen i mængden af planteplankton og dyreplanktonets græsningstryk på planteplanktonet i 2000 er vist i figur 42. Planteplanktonet er på figuren opsplittet i alger < 50 µm, der er den del af algerne som umiddelbart er spiselige for dyreplanktonet, og alger > 50 µm.




Figur 42. Græsning (mg C/l/d) og mængden af planteplankton (mg C/l) i 2001.

I lighed med sidste år var græsningstrykket i 2001 i perioder højt. Dette var især tilfældet sidst i maj og først i juni, hvor græsningstrykket var endda meget højt (240-328%), men græsningstrykket var også betydeligt i resten af vækstsæsonen (27-52%).

Dyreplanktonet har således sandsynligvis haft en regulerende effekt på mængden af de små algefomer i søen gennem hele vækstsæsonen. Især i maj og juni må dyreplanktonets græsning have haft en betydelig effekt på mængden af de små alger.

Udviklingen i dyreplanktonets potentielle græsningstryk på planteplanktonet i perioden 1989-2001 er vist i figur 43. På figuren er dels angivet det potentielle græsningstryk på hele planteplanktonet og dels det potentielle græsningstryk på den del af algerne, der umiddelbart er spiselig for dyreplanktonet (alger < 50 µm). De viste værdier på figuren er sommermidler for de enkelte år.

Som det fremgår af figuren, er græsningstrykket generelt faldet i de første år af overvågningsperioden. Herefter har græsningstrykket varieret fra år til år uden nogen tydelig udvikling. I 2000 og 2001 ser det imidlertid ud til, at græsningstrykket efter er stigende, bl.a. er græsningstrykket i 2001 på den totale algemængde overvågningsperiodens hidtil højeste.



Figur 43. Udviklingen i det sommernemsnitlige græsningstryk 1989-2001.

Set for hele perioden kan der dog konstateres et signifikant fald i græsningstrykket på den del af algerne, der er mindre end 50 µm (lineær regressionsanalyse, $P < 0,05$).

9.3 Fiskebestand

Fiskeyngel

Søens fiskeyngel blev undersøgt i juli 2001 efter det standardiserede fiskeyngelundersøgelsesprogram /15/. Resultaterne er medtaget i bilag 10.

Der blev som ved de foregående yngelundersøgelser konstateret yngel fra 4 arter; skalle, regnløje, brasen og aborre, hvortil kommer etårig regnløjer.

Den samlede yngeltæthed (inklusive etårlige) var 1,55 pr. m³ i littoralen og 6,45 pr. m³ i pelagiet (tabel 7), hvilket var lidt mindre sammenlignet med de foregående år.

Vægtmæssigt var tætheden 0,45 g vådvægt pr. m³ i littoralen og 2,54 g pr. m³ i pelagiet (tabel 8), hvilket var lidt mere end i 2000.

Sammenlignet med 13 andre danske sører, hvor der er foretaget yngelundersøgelser de seneste fire år, var tætheden af karpefiskeyngel i 2001 over midtel, mens aborrefiskeynglens tæthed var meget stor.

Tabel 7. Den beregnede tæthed af fiskeynglen i littoralen og pelagiet juli 2001.

	Antal m ³		Procent	
	Littoralen	Pelagiet	Littoralen	Pelagiet
Karpefisk	0,994	3,342	64	52
Aborrefisk	0,558	3,111	36	48
Laksefisk	0	0	0	0
Andre	0	0	0	0
Total	1,552	6,453	100	100

Tabel 8. Den beregnede biomassetæthed af fiskeynglen i littoralen og pelagiet juli 2001.

	Vådvægt g/ m ³		Procent	
	Littoralen	Pelagiet	Littoralen	Pelagiet
Karpefisk	0,152	0,534	34	21
Aborrefisk	0,299	2,004	66	79
Laksefisk	0	0	0	0
Andre	0	0	0	0
Total	0,452	2,538	100	100

Skalleynglen var en smule under middelstørrelse, aborreynglen var normal, mens de få brasener der blev fanget var usædvanlig store sammenlignet med fangsterne i de øvrige 13 sører.

Fiskeynglens beregnede konsumptionsrate (inklusive etårlige regnløjer) omkring 1. juli var med godt 72 mg tv/m³/d større end i de foregående år og meget betydelig sammenlignet med de øvrige undersøgte sører. Fiskeynglen har således antageligt ydet et betydeligt prædationstryk på søens dyreplankton i 2001.

Øvrig fiskebestand

Søens fiskebestand er undersøgt i 1988, 1993 og igen i 2000 efter det standardiserede fiskeprogram. I forbindelse med den opfiskning, der blev indledt i foråret 1996, er fiskebestanden tillige undersøgt årligt siden 1996 efter et reduceret undersøgelsesprogram. Formålet med disse undersøgelser er løbende at følge udviklingen i fiskebestanden under opfiskningen.

Udviklingen i fiskebestanden fra 1988 og frem til 1996 er udførligt beskrevet i temarapporten fra 1997 [7] og fiskebestandens sammensætning og udvikling i 1997-2001 er på baggrund af de udførte fiskeundersøgelser beskrevet i interne notater. Resultaterne fra fiskeundersøgelsen i 2000 er beskrevet i en særskilt rapport [14].

I det følgende gives derfor kun et kort resume af fiskebestandens udvikling i perioden 1988-2001 samt en beskrivelse af fiskebestandens aktuelle størrelse og sammensætning.

Søen rummer i alt 10 arter: Skalle, brasen, aborre, hork, regnløje, rudskalle, gedde, suder, ål og spejlkarpe, hvoraf sidstnævnte første gang er registreret i søen i 1996 og hork i 2000. Sandart er tidligere forekommet i søen, men er ikke registreret siden 1996.


Fiskebestanden var både i 1988 og i 1993 karakteristisk for en mindre, lavvandede og næringsrig sø med en ringe sigtdybde, dvs. - med en udpræget dominans af småskaller og mindre brasener, med en til tider talrig bestand af regnløjer og med gedden som dominerende rovfisk. Fiskebiomassen var med skønsmæssigt 40-50 g vådvægt/m³ forholdsvis høj i overensstemmelse med søens høje næringsniveau, og rovfisk udgjorde med 9-12% kun en beskeden andel af fiskebiomassen.

I foråret 1996 indledtes opfiskningen af skaller og brasener og siden starten i 1996 er der i alt opfisket knap 9,7 ton fisk i søen fordelt på ca. 4,1 ton skaller og 5,5 ton brasener.

Udviklingen i fiskebestandens biomasse i perioden 1988-2001 er vist i figur 44.

Fra en meget betydelig tæthed på knap 550 kg/ha - svarende til en samlet biomasse af fisk på ca. 5,2 ton i søen - var tætheden af fisk nede på ca. 150 kg/ha i sensommeren 2000 - svarende til en samlet fiskebiomasse i søen på 1,5 ton.

Skønnnet fiskebiomasse 1988-2001



Figur 44. Skønnnet biomasse af rovfisk og fredsfisk (excl. ål) i søen 1988, 1993 og 1996-2001.

I 2001 er der opfisket lidt over 1 ton skaller og brasener, hvoraf langt hovedparten (915 kg) var brasener. Efter opfiskningen i 2001 er biomassen af fredsfisk skønnnet til ca. 160 kg/ha mod en skønnnet biomasse i 1988 på ca. 460 kg/ha.


På trods af en betydelig nedfiskning har fredsfiskebestanden tidligere formået at gendanne en væsentlig del af den opfiskede biomasse. Især har skallerne udvist en stor evne til hurtigt at erstatte den tabte biomasse, mens brasenerne kun i mindre omfang har formået at overkomme fiskeriet, blandt andet som følge af større fiskerityrk.

Dette var især tilfældet i 1998 og 1999, hvor fiskeritykket ikke var tilstrækkeligt stort. I disse to år oversteg skallernes og brasernes nettoproduktion den opfiskede mængde med det resultat, at begge arter påny øgede deres biomasse. Fiskeritykket blev derfor øget i 2000.

Samtidig blev der i 2001 gjort et forsøg på at styrke søens aborrebestand. Fiskeundersøgelserne i de foregående år viste nemlig, at aborrebestanden endnu ikke havde reageret på den massive opfiskning af skaller og brasener. Når hovedparten af skallerne og braserne fjernes fra en sø kan aboren normalt i kraft af et stort vækstpotentiale hurtigt opbygge en stor bestand af rovlevendeaborrer. Dette var imidlertid endnu ikke sket i Borup Sø.

I løbet af 2001 blev der derfor utsat ca. 600 kg store aborer. På grund af leveringsvanskeligheder, blev kun en mindre del af aborrerne utsat i foråret (ca. 160 kg), mens de resterende ca. 440 kg først blev utsat i november måned.

Figur 45 viser udviklingen i søens rovfiskebestand i perioden fra 1988 og frem.



Figur 45. Rovfiskenes procentandel af den samlede fiskebestand (excl. ål) i perioden 1988-2001.

I 1988 udgjorde rovfiskene skønsmæssigt knap 20% af søens samlede fiskebestand (ål ikke medregnet, da elektrofiskeri ikke er indgået ved alle fiskeundersøgelserne i søen). Tidligere utsatte sandarter udgjorde dengang en væsentlig del af rovfiskebestanden. I 1993 var rovfiskenes andel reduceret til godt 10% som følge af en markant nedgang i både sandarternes og aborrernes biomasse.

Efter biomanipulationen blev iværksat i 1996 steg rovfiskenes andel af fiskebestanden igen som følge af en stor reduktion i mængden af skaller og brasener. Frem til 1999 faldt rovfiskenes andel imidlertid igen, dels som følge af at fredfiskebestanden påny øgede dens biomasse og dels fordi aborrebestanden ikke voksede.

Efter intensiveringingen af opfiskningen i 2000 steg aborrernes andel og denne gang ser det ud til, at aborrebestanden har reageret på den mindskede fødekonkurrence, idet både bestandens biomasse og størrelsesstruktur har ændret sig væsentligt.

I sensommeren 2001 udgjorde aborrerne omkring en tredjedel af den samlede fiskebestands biomasse og i modsætning til tidligere er vækst og overlevelse markant bedre. Aborrebestanden er så yderligere styrket gennem udsætning af 440 kg store aborrer i november 2001.

Geddebestanden er også søgt styrket gennem årlige udsætninger af årsyngel og vækst og overlevelse blandt den utsatte geddeyngel har været relativ god. Den skønnede biomasse af gedder er dog i 2001 stadig lidt mindre end før opfiskningen.

9.4 Samspillet mellem stofkoncentrationer, plante- og dyreplankton samt fiskebestand

I dette afsnit er udviklingen gennem perioden og de vigtigste styrende faktorer kort resumeret og mulige effekter af den igangværende opfiskning er vurderet.

Sommermiddelbiomassen af planteplankton var i perioden 1989-1992 kraftigt stigende, primært som følge af en stigning i biomassen af kiselalger. I perioden 1993-96 varierede biomassen en del, men forblev generelt på et højt niveau. Gennem hele perioden 1989-96 steg blågrønalgernes biomasse og nåede et foreløbigt maksimum i 1996, hvor de helt dominerede biomassen af alger i søen.

Sideløbende faldt sommermiddelbiomassen af dyreplankton markant, hovedsageligt som følge af et fald i biomassen af dafnier, der i 1996 nåede ned på en syvendedel af biomassen i 1989. Dyreplanktonets tilbagegang resulterede i at græsningstrykket på algerne faldt ligeså markant. I takt hermed fik tilgængeligheden af næringsstoffer større og større betydning som regulerende faktor for algbiomassen i søen.

For at vende den negative udvikling i søen blev der som tidligere nævnt iværksat en opfiskning i 1996 af søens meget store bestand af skaller og brasener.

Samme år steg sigtdybden på trods af en stor mængde blågrønalger og denne udvikling fortsatte i 1997, hvor biomassen af planteplankton, - primært som følge af en beskeden blågrønalgebiomasse dette år - faldt markant. Denne forbedring kunne imidlertid ikke tilskrives et større græsningstryk på planteplanktonet, idet biomassen af dyreplankton i disse år nåede et absolut minimum.

I 1998 og 1999 fortsatte opfiskningen i søen, men fiskeritrykket var ikke tilstrækkeligt stort til at reducere mængden af skaller og brasener yderligere. Tværtimod begyndte mængden af skaller og brasener at stige som følge af en usædvanlig effektiv rekruttering hos begge arter.

I 1998 steg algebiomassen igen, men masseopblomstringen af blågrønalger udeblev for andet år i træk. Samtidig steg dyreplanktonbiomassen markant i kraft af en væsentlig større dafniebiomasse.

At mængden af dafnier steg i både 1997 og 1998 hang sandsynligvis sammen med blågrønalgernes tilbagegang. Blågrønalger udgør nemlig generelt et

dårligt fødegrundlag for dafnierne. Selv om dyreplanktonbiomassen steg i 1998, forblev græsningstrykket på algerne lavt.

Planteplanktonbiomassen var i 1999 i niveau med 1998, men modsat de forgående par år skete igen en masseopblomstring af blågrønalger i september/oktober, antageligt som følge af en usædvanlig varm sensommer. Dyreplanktonbiomassen var lavere end i 1998 og specielt biomassen af dafnier og vandlopper var blandt de lavest registrerede i overvågningsperioden. Græsningstrykket var således lavt gennem hele året.

I 2000 faldt sommermiddelbiomassen af planteplankton igen til et niveau svarende til i 1997, der var overvågningsperiodens hidtil laveste. Samtidig steg dyreplanktonbiomassen og modsat de foregående par år var græsningstrykket så stort, at dyreplanktonet antageligt i perioder har kunnet regulere mængden af de små algeformer i søen.

Fiskeundersøgelsen i juli 2000 viste samstændende et væsentligt mindre predationstryk på dyreplanktonet end i de foregående par år og fiskeynglen var næppe i stand til at begrænse dyreplanktonet i 2000. Samtidig medførte den intensiverede opfiskning af skaller og brasener i, at fredfiskebestanden nu var nede på det hidtil laveste niveau siden overvågningen af søen begyndte.

I 2001 fortsatte den positive udvikling i søen. Sommermiddelbiomassen af planteplankton nåede ned på det hidtil absolut laveste niveau og sigtdybden var med et sommernemsnit på 0,91 meter ikke bare overvågningsperiodens hidtil højeste, men også meget tæt på målsætningskravet på 1 meter.

Dyreplanktonbiomassen steg markant i forhold til 2000 og dafnier var igen dominerende blandt dyreplanktonet. Græsningstrykket var i perioder højt og dyreplanktonet kunne i disse perioder antagelig regulere mængden af de små alger i søen.

Fiskebestanden har også ændret karakter. Mest markant er aborrernes store andel af fiskebestanden i 2001, hvilket forhåbentligt vil føre til en regulering af skalle- og brasenbestanden.

Sammenfattende ser det ud til, at opfiskningen muligvis nu kan føre til den varige ændring i fiskebestandens sammensætning, der er en del af forudsætningen for at søen igen bliver klarvandet.

10. Miljøfremmede stoffer og tungmetaller

Som noget nyt måles for indholdet af miljøfremmede stoffer i vandfasen i 8 af NOVA sørerne, bl.a. Borup Sø. Målingerne udføres hvert andet år, hvor der udtages 6 vandprøver fordelt på to i juni, to i juli, én i august og én i september /16/. Samtidig måles for indhold af tungmetaller.

I dette afsnit præsenteres resultaterne af målingerne i 2001. En liste over undersøgte stoffer samt analyseresultater findes i bilag 12.

10.1 Tungmetaller

Der er i 2001 analyseret for følgende stoffer: Arsen, bly, cadmium, chrom, kobber, kviksølv, nikkel og zink. En tilsvarende undersøgelse af indholdet af tungmetaller i vandfasen blev foretaget i 1998 og resultaterne herfra er medtaget i tabel 9, der viser gennemsnitskoncentrationen af de enkelte tungmetaller i vandfasen i henholdsvis 1998 og 2001 samt kvalitetskrav for stofferne.

Tabel 9. Gennemsnitskoncentrationer af tungmetaller i vandfasen i 1998 og 2001 samt kvalitetskrav i henhold til /17/. Alle værdier angivet i µg/l.

Tungmetal	1998	2001	Kvalitetskrav
Arsen (As)	0,242	0,753	4
Bly (Pb)	0,583	0,433	3,2
Cadmium (Cd)	0,032	0,007	5
Chrom (Cr)	0,340	0,222	10
Kobber (Cu)	0,633	0,567	12
Kviksølv (Hg)	0,002	0,018	1
Nikkel (Ni)	0,860	0,783	160
Zink (Zn)	-	1,383	110

Indholdet af tungmetaller i svovlet i Borup Sø er generelt lavt, hvilket også er forventeligt, da der ikke er udledninger fra industri og renseanlæg i oplandet til søen.

Sammenlignet med kvalitetskravene angivet i tabel 9 er indholdet af samtlige målte tungmetaller i svovlet da også væsentligt under kravene.

Tungmetalindholdet i svovlet samt eventuel bioakkumulerende effekt hos fisk er tidligere detaljeret beskrevet i /18/. Heri blev det konkluderet, at koncentrationerne af tungmetaller i Borup Sø generelt ligger væsentligt under grænsen for akutte

effekter på dyre- og plantelivet i søen. Med hensyn til bioakkumulation af tungmetaller i fisk er det kun bly, der kommer i nærheden af koncentrationer, der kan medføre kroniske effekter hos fiskene.

10.2 Miljøfremmede stoffer

Der er analyseret for 75 miljøfremmede stoffer indenfor følgende grupper: Polyaromatiske kulbrinter (PAH'er), pesticider, aromatiske kulbrinter, phenoler, blødgørere, anioniske detergenter samt ethere.

Der blev fundet 13 miljøfremmede stoffer, defineret som stoffer der forekom i koncentrationer over detektionsgrænsen. Af disse stammede de 12 fra pesticider - enten som aktiv stof eller nedbrydningsprodukt heraf, mens ét stof tilhørte gruppen phenoler. Fundne stoffer samt stofkoncentrationer og antallet af fund er vist i tabel 10.

Tabel 10. Fundne miljøfremmede stoffer. Max. koncentration, gennemsnitskoncentration samt antallet af fund ud af 6 prøvetagninger.

Stof	Gns. (µg/l)	Max. (µg/l)	Antal fund
AMPA	0,084	0,13	6
Glyphosat	0,041	0,11	6
Terbutylazin	0,015	0,031	4
Dichlorprop	0,010	0,027	4
Hydroxysimazin	0,008	0,014	4
BAM	0,008	0,022	3
3-hydroxycarbofuran	0,013	0,043	2
Simazin	0,008	0,032	2
TCA	0,006	0,021	2
MCPA	0,003	0,01	2
Hydroxyatrazin	0,004	0,012	1
Bentazon	0,003	0,016	1
Nonylphenolethoxylater	0,017	0,1	1

Hyppigst forekommende var glyphosat og dets nedbrydningsprodukt AMPA (aminomethylphosphonsyre), der begge blev fundet ved alle seks målerunder. Det var samtidig de to stoffer, der forekom i de klart højeste koncentrationer. Glyphosat er det aktive stof i totalukrudtsmidlet "Round

up”, der er tilladt at anvende og bruges på såvel marker som i haver.

Terbutylazin, dichlorprop og hydroxysimazin blev fundet i 4 ud af 6 prøver. Terbutylazin er det aktive stof i et herbicid i gruppen af triaziner, der bl.a. rummer simazin og atrazin. Sidstnævnte stof blev tidligere ofte anvendt langs veje og jernbaner inden det blev forbudt i 1994. Dichlorprop er det aktive stof i et herbicid af phenoxyregruppen. Stoffet er tilladt at anvende med en række begrænsninger på korn- og frøgræsmarker samt på plæner. Hydroxysimazin er et nedbrydningsprodukt af herbicidet simazin, der også er tilladt at anvende ligeledes med en række begrænsninger.

BAM (2,6-dichlorbenzamid) er et nedbrydningsprodukt af herbicidet dichlorbenil, der især er anvendt i haver og på befæstede arealer. Stoffet er i dag forbudt. BAM er fundet i 3 ud af 6 målerunder.

3-hydroxycarbofuran, simazin, TCA og MCPA er fundet i 2 ud af 6 målerunder. 3-hydroxycarbofuran er et nedbrydningsprodukt af insekticidet carbofuran, der bl.a. er anvendt som middel mod skadedyr på planter. Simazin er et herbicid med en række begrænsninger på anvendelsen. TCA er et herbicid med trichloreddikesyre som aktivstof. MCPA er et herbicid tilhørende phenoxyregruppen.

Hydroxyatrazin og bentazon blev begge fundet ved en enkelt målerunde. Hydroxyatrazin er et nedbrydningsprodukt fra herbicider med atrazin som aktivstof. Atrazin blev som tidligere nævnt allerede forbudt i 1994. Bentazon er et herbicid med begrænset anvendelse på marker.

Udover ovennævnte pesticider blev der ved én af målerunderne fundet nonylphenolethoxylat, der er et overfladeaktivt stof i bl.a. vaske- og rengøringsmidler, maling og lak, kosmetik samt hjælpestof i bekæmpelsesmidler. Nonylphenoler virker som kønshormonet østrogen hos pattedyr, fisk og krebsdyr.

For alle ovennævnte stoffer pånær glyphosat og AMPA gælder, at *når* de er fundet er det typisk i meget små koncentrationer lige omkring detektionsniveauet.

Glyphosat og AMPA (som tidligere nævnt henholdsvis aktivstoffet i “Round up” og dettes nedbrydningsprodukt) er altså både de hyppigst forekommende stoffer og samtidig dem, der blev fundet i de største koncentrationer. Den største koncentration af glyphosat (0,11 µg/l) blev fundet i september, hvor koncentrationen var væsentligt højere end

ved de foregående 5 målerunder (0,021 - 0,036 µg/l). Største koncentration af AMPA (0,13 µg/l) blev ligeledes fundet i september, men her var forskellen fra de foregående 5 målerunder (0,046 - 0,11 µg/l) ikke så markant.

De højest målte koncentrationer af såvel glyphosat og AMPA ligger lige akkurat over grænseværdien for indholdet i drikkevand, der er på 0,1 µg/l for begge stoffers vedkommende /19/.

Glyphosat er vurderet til at have en lav akut giftighed overfor dafnier, mens det er giftigt overfor fisk og alger. AMPA er vurderet til at have en lav akut giftighed overfor fisk og dafnier, mens det er moderat giftigt overfor alger /20/.

De koncentrationer, hvor glyphosat og AMPA har en effekt er imidlertid betydeligt højere end de koncentrationer, der er målt i vandfasen i søen. De koncentrationer af stofferne, hvor der ikke er observeret en effekt (NOEC koncentrationer) er således adskillige mg pr.liter vand.

11. Konklusion

Set for hele perioden 1989-2001 kan der ikke konstateres et fald i hverken fosfor- eller kvælstoftiførslen til Borup Sø. De betydelige variationer årene imellem i tilførslen af både fosfor og kvælstof kan stort set tilskrives variationer i vandtilførsel til søen i de respektive år.

Der har dog i de seneste 4-5 år været en tendens til et fald i den vandføringsvægtede indløbskoncentration af fosfor.

Mængden af tilført fosfor er fortsat større end den fosformængde, der fraføres søen, hvorfor søens interne fosforpulje stadig øges.

I perioden 1989-96 var søen inde i en negativ udvikling, med stigende algebiomasser og med en større og større dominans af blågrønalger. Samtidig faldt mængden af dyreplankton i form af en nedgang i mængden af dafnier.

For at vende denne udvikling blev der i 1996 iværksat en opfiskning af søens meget store bestand af skaller og brasener. I 1996 og 1997 var tilstanden i søen bedre, men dyreplanktonet formåede stadig ikke at kontrollere mængden af alger i søen og i 1998-99 gik udviklingen igen den gale vej med stigende algebiomasser.

For igen at vende udviklingen blev opfiskningen intensiveret i 2000.

Resultaterne fra overvågningen i 2001 viser, at algebiomassen igen er faldet og nu er den laveste hidtil registrerede. Samtidig er mængden af dafnier fortsat stigende og dyreplanktonet er igen i stand til i perioder at regulere mængden af plantoplankton.

Fiskebestanden har også gennemgået en markant udvikling de sidste par år. Mængden af aborre er steget meget betydeligt og aborrebestandens størrelsesstruktur er ændret, således at der nu i modsætning til tidligere er mange store aborre.

Den ovennævnte udvikling afspejles i 2001 i overvågningsperiodens hidtil bedste sommersigtdybde på 0,91 m.

2001 var også året, hvor der for første gang blev undersøgt for miljøfremmede stoffer i søen. Ud af de 75 stoffer, der blev analyseret for, fandtes 13 af dem i vandfasen. Generelt var koncentrationerne af de fundne stoffer dog meget lav. Rester af totalukrudtsmidlet "Round up" blev fundet i samtlige

målerunder og i væsentligt højere koncentrationer end nogen af de øvrige miljøfremmede stoffer, men dog ikke i så store koncentrationer, at det vurderes at have nogen påviselig effekt på søens plante- og dyreliv.

Borup Sø er generelt målsat (B) hvilket bl.a. indebærer krav til en gennemsnitlig fosforkoncentration mindre end 100-150 µg P/l og en sigtdybde ikke under 1 meter, begge beregnet som sommergennemsnit. Desuden er der krav om en udbredt undervandsvegetation og en varieret og alsidig fiskebestand uden masseforekomst af fredfisk.

For nærværende er ingen af kravene opfyldt.

Den iværksatte intensivering af opfiskningen forventes imidlertid at kunne bringe søen et væsentlig skridt nærmere målsætningen. Fiskebestanden er godt på vej her til og sommersigtdybden er heller ikke langt fra målet. Fastholdes den positive udvikling forventes det, at undervandsplanter igen vil indfinde sig i søen og ad åre at kunne dække en stor del af sòbunden.

Af afgørende betydning for søens udvikling i de kommende år er det imidlertid, at næringsstoftilførslen til søen reduceres yderligere. Lykkes dette ikke, er der risiko for at søen igen udvikler sig i en negativ retning.

12. Referencer

- 1/ Miljøstyrelsen (2000). NOVA 2003. Programbeskrivelse for det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003. Redegørelse fra Miljøstyrelsen nr. 1.
- 2/ Danmarks Miljøundersøgelser (2000). Paradigma 2001. www.dmu.dk.
- 3/ Høy, T. og J. Dahl (1995). Danmarks søer. Søerne i Roskilde Amt, Københavns Kommune og Københavns Amt. Strandbergs Forlag.
- 4/ Danmarks Miljøundersøgelser (1999). Oplandsanalyse af vandløbs- og søoplante 1998-2003. Vandløb og søer. Teknisk anvisning fra DMU nr. 15.
- 5/ Roskilde Amt (1995). Vandmiljøovervågning. Borup Sø 1989-94.
- 6/ Danmarks Miljøundersøgelser (1994). Notat fra arbejdsgruppe vedrørende beregning af den diffuse tilførsel af total N og total P fra umålte oplande i overvågningsprogrammet.
- 7/ Roskilde Amt (1997). Vandmiljøovervågning. Overvågning af søer 1996 samt temarapportering regionale søer.
- 8/ Kristensen, P., Jensen, J.P. & E. Jeppesen (1990). Eutrofieringsmodeller for søer. NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, nr. C9.
- 9/ Olrik, K. (1991). Planteplankton-metoder. Prøvetagning, bearbejdning og rapportering ved undersøgelser af planteplankton i søer og marine områder. Miljøprojekt nr. 187. Miljøstyrelsen.
- 10/ Hansen, A.-M., E. Jeppesen, S. Bosselmann & P. Andersen (1992). Zooplankton i søer - metoder og artslist. Miljøprojekt 205. Miljøstyrelsen.
- 11/ Mortensen, E., H.J. Jensen, J.P. Müller & M. Timmermann (1990). Fiskeundersøgelser i søer. Undersøgelsesprogram, fiskeredskaber og metoder. Danmarks Miljøundersøgelser. Teknisk anvisning fra DMU, nr. 3.
- 12/ Roskilde Amt (1989). Fiskeribiologisk undersøgelse af Borup Sø, august 1988. Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium for Roskilde Amt.
- 13/ Roskilde Amt (1994). Fiskebestanden i Borup Sø, August 1993. Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium for Roskilde Amt.
- 14/ Roskilde Amt (2001). Fiskebestanden i Borup Sø, september 2000. Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium for Roskilde Amt.
- 15/ Lauridsen T.L. (1998). Fiskeyngelundersøgelser i søer. - Danmarks Miljøundersøgelser. Teknisk anvisning fra DMU.
- 16/ Danmarks Miljøundersøgelser (1999). Overvågning af miljøfremmede stoffer i ferskvand. Teknisk anvisning fra DMU nr. 17.
- 17/ Miljø- og Energiministeriet (1996). Bekendtgørelse om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af visse farlige toffer til vandløb, søer eller havet. Bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober 1996.
- 18/ Roskilde Amt (1999). Vandmiljøovervågning. Borup Sø 1989-98.
- 19/ DMU (1999). Miljøfremmede stoffer. Datablade af 23. marts 1999.
- 20/ Miljøstyrelsen (2000). Udleveret baggrundsmateriale om Round up.

13. Bilagsoversigt

1. Klimadata.
2. Søkort og morfometriske data.
3. Oplandsstørrelse, areal- og jordtypefordeling.
4. Samleskema for vandføring og stofkoncentrationer i tilløbet Borup Bæk, station 948, i perioden 1989-2001.
5. Vand- og stofbalanceberegninger for 2001 opgjort på månedsbasis.
6. Samleskemaer for vand og stof 1989-2001. Års- og sommerværdier.
7. Kildeopsplitning.
8. Samleskema for fysisk-kemiske målinger 1989-2001.
9. Samleskemaer for plankton.
10. Fiskeyngelundersøgelse 2001.
11. Fiskeundersøgelse 2001.
12. Tungmetaller og miljøfremmede stoffer.
13. Oversigt over udførte undersøgelser i søen.

Bilag 1

KLIMADATA - Borup Sø

Temperatur (grader C)

Måned	Normal 1961-90	2001
Jan	-0,4	1,6
Feb	-0,3	0,6
Mar	2	0,9
Apr	6	5,7
Maj	11,2	12,0
Jun	15,1	13,2
Jul	16,1	17,9
Aug	16	17,1
Sep	12,9	12,6
Okt	9	11,8
Nov	4,7	5,0
Dec	1,4	0,4
GNS:	7,8	8,2

Solskinstimer

Målestation: Københavns Lufthavn

Måned	Normal 1961-90	2001
Jan	43	24
Feb	68	110
Mar	117	138
Apr	185	158
Maj	249	329
Jun	259	286
Jul	244	345
Aug	233	247
Sep	158	115
Okt	103	87
Nov	57	100
Dec	38	32
År	1754	1971
Sommer	1143	1322

Globalindstråling (MJ/m²)

Måned	Normal	2001
Jan		41
Feb		134
Mar		269
Apr		343
Maj		620
Jun		589
Jul		648
Aug		458
Sep		249
Okt		151
Nov		94
Dec		38
SUM:	3.634	
GNS:	303	

Hård vind målt ved Ledreborg Alle

(DMI 30421 Ledreborg Alle II)

% vindhastigheder lig med eller over 10,8 m/s

Måned	Normal 1989 - 98	2001
jan	5,7	0,0
feb	5,2	2,8
mar	5,2	2,7
apr	1,6	0,4
maj	0,5	0,5
jun	0,2	0,1
jul	0,0	0,0
aug	0,1	0,0
sep	0,3	0,0
okt	1,2	1,3
nov	1,3	0,8
dec	2,0	1,2

Potentiel fordampning (mm)


Måned	Normal 1961-90	2001
Jan	5	5,1
Feb	11	15,7
Mar	30	31,8
Apr	56	47,1
Maj	87	103,0
Jun	102	100,8
Jul	104	122,2
Aug	83	84,4
Sep	51	41,6
Okt	27	24,9
Nov	10	12,5
Dec	4	4,4
SUM:	570	594
GNS:	48	49

Nedbør (mm)

Måned	Normal 1961-90	2001
Jan	49	37
Feb	32	42
Mar	41	34
Apr	40	48
Maj	44	21
Jun	51	57
Jul	64	38
Aug	63	133
Sep	62	144
Okt	59	44
Nov	65	53
Dec	60	54
SUM:	630	703
GNS:	53	59

Bilag 2


N



BORUP SØ

SKOVBO KOMMUNE, ROSKILDE AMT

1:5000



Ekkolodning foretaget maj 1991
ved vandspejl 40,0 m over DNN (GI)
Måling og udarbejdelse: Landinspektør Thorkild Høy
2. udg. juni 1991 på basis af fuldstændig nymåling.

©THORKILD HØY

BORUP SØ

Morfometriske data bestemt efter kort i 1:5000 udarbejdet af Thorkild Høy i 1991.

Areal: 9,5 ha

Volumen:

I dybdeintervallet 0 - 1 meter: 74.000 m³

I dybdeintervallet 1 - 1,5 meter: 20.000 m³

I dybdeintervallet 1,5 - 2,0 meter: 6.000 m³

Volumen i alt: 100.000 m³

Middeldybde: 1,05 meter

Bilag 3

BORUP SØ. Topografisk opland, jordtypefordeling og arealudnyttelse.

OPLAND TIL:	Deloplund til Borup Bæk, st. 948		Deloplund direkte til sø		Samlet opland	
ENHED:	ha	%	ha	%	ha	%
TOTAL AREAL:	420	100	337	100	757	100
JORDTYPEFORDELING:						
1) Grovsandet jord	-	-	-	-	-	-
2) Finsandet jord	-	-	-	-	-	-
3) Lerblændet sandjord	3	1.4	-	-	3	0.6
4) Sandblændet lerjord	202	91.8	200	81.3	402	86.3
5) Lerjord	15	6.8	46	18.7	61	13.1
6) Svær lerjord	-	-	-	-	-	-
7) Humus	-	-	-	-	-	-
8) Kalkrig jord	-	-	-	-	-	-
AREALUDNYTTELSE:						
Dyrket areal	220	52.4	246	73.0	466	61.6
Skovareal	192	45.7	91	27.0	283	37.4
Ferskvandsareal	7	1.7	-	-	7	0.9
Byzoneareal	-	-	-	-	-	-
Befæstet areal	1	0.2	-	-	1	0.1
Andre arealer	-	-	-	-	-	-
CORINE:						
2110 Dyrket areal	225	53.6	251	74.5	476	62.9
3130 Blandet skov	195	46.4	86	25.5	281	37.1

Bilag 4

Borup Bæk, station 948	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Vandføring													
Årsmiddel (l/s)	20,3	29,8	29,5	23,3	46	62,1	33,5	9,3	10,0	35,5	36,8	24,1	23,8
Sommermiddel (l/s)	6,6	5,7	11,3	2,2	32,7	28,9	5,2	7,7	1,9	3,0	5,1	1,5	13,5
Total-P													
Årsmiddelkoncentration (mg/l)	0,346	0,305	0,206	0,300	0,154	0,242	0,303	0,395	0,337	0,203	0,176	0,156	0,188
Sommermiddelkoncentration (mg/l)	0,504	0,588	0,339	0,501	0,278	0,441	0,476	0,462	0,388	0,284	0,272	0,227	0,282
Vandføringsvægtet årsmiddelkonz. (mg/l)	0,221	0,113	0,118	0,074	0,095	0,130	0,084	0,188	0,161	0,138	0,089	0,066	0,120
Vandføringsvægtet sommermiddelkonz. (mg/l)	0,653	0,380	0,174	0,117	0,162	0,277	0,128	0,179	0,258	0,190	0,193	0,155	0,167
Årlig stoftransport (kg)	141,3	105,9	109,5	54,7	138,1	254,5	89,0	55,2	50,9	153,9	102,8	50,7	89,8
Sommer stoftransport (kg)	57,3	28,8	25,9	3,4	69,8	106,1	8,7	18,3	6,3	7,4	13,0	3,1	29,9
Opløst fosfatfosfor													
Årsmiddelkoncentration (mg/l)	0,182	0,217	0,109	0,246	0,117	0,186	0,238	0,332	0,269	0,127	0,104	0,100	0,101
Sommermiddelkoncentration (mg/l)	0,325	0,440	0,180	0,435	0,227	0,375	0,378	0,404	0,309	0,221	0,175	0,156	0,182
Vandføringsvægtet årsmiddelkonz. (mg/l)	0,103	0,066	0,062	0,040	0,060	0,078	0,044	0,136	0,117	0,050	0,043	0,034	0,055
Vandføringsvægtet sommermiddelkonz. (mg/l)	0,339	0,247	0,088	0,083	0,111	0,217	0,094	0,128	0,200	0,132	0,121	0,107	0,094
Årlig stoftransport (kg)	66,0	62,4	57,9	29,4	87,6	152,2	46,0	40,0	37,0	56,5	49,5	25,9	41,4
Sommer stoftransport (kg)	29,4	18,5	13,1	2,4	47,9	82,4	6,4	13,0	5,0	5,2	8,1	2,1	16,6
Part-P													
Årsmiddelkoncentration (mg/l)	0,164	0,088	0,097	0,054	0,037	0,056	0,065	0,063	0,068	0,076	0,072	0,057	0,087
Sommermiddelkoncentration (mg/l)	0,179	0,148	0,159	0,066	0,051	0,066	0,098	0,058	0,079	0,063	0,097	0,071	0,101
Vandføringsvægtet årsmiddelkonz. (mg/l)	0,118	0,046	0,055	0,034	0,035	0,052	0,041	0,051	0,044	0,087	0,046	0,032	0,065
Vandføringsvægtet sommermiddelkonz. (mg/l)	0,322	0,138	0,086	0,035	0,051	0,062	0,034	0,049	0,040	0,053	0,072	0,048	0,074
Årlig stoftransport (kg)	75,4	43,5	51,6	25,3	50,5	102,3	43,0	15,0	14,0	97,3	53,3	24,8	48,4
Sommer stoftransport (kg)	27,9	10,3	12,8	1,0	21,9	23,6	2,3	5,0	1,0	2,1	4,8	1,0	13,3
Total-N													
Årsmiddelkoncentration (mg/l)	6,417	6,651	6,067	7,829	7,274	5,108	4,617	5,909	6,260	6,872	5,080	4,873	5,131
Sommermiddelkoncentration (mg/l)	4,345	5,024	4,684	5,283	5,416	4,635	3,747	4,745	4,463	5,049	4,657	4,303	4,700
Vandføringsvægtet årsmiddelkonz. (mg/l)	8,108	8,222	7,228	10,294	7,164	5,637	5,404	6,310	7,857	8,624	6,129	6,018	5,830
Vandføringsvægtet sommermiddelkonz. (mg/l)	3,683	7,014	4,605	4,812	5,240	5,154	3,439	4,198	3,738	5,451	4,098	4,485	6,006
Årlig stoftransport (kg)	5,195	7,736	6,729	7,573	10,391	11,044	5,715	1,848	2,490	9,646	7,113	4,590	4,370
Sommer stoftransport (kg)	323	532	685	138	2,264	1,971	235	429	92	213	277	90	1,073

Bilag 5

Vandbalance Borup Sø 2001

Alle værdier i 1000m³

	Nedbør x søareal	Fordampn. x søareal	Direkte tilførsel	Målt tilløb	Umwält oplund	Samlet ekstern tilførsel	Fraførsel (i søafløb)	Magasin "Grundvand" (+ indsvinng - udsivning)	Samlet tilførsel (ekstern + indsvinng)	Samlet fraførsel (søafløb + udsivning)
Jan	4,1	0,6	0,0	88,6	70,2	162,3	244,8	-8,8	73,7	236,0
Feb	4,7	1,6	0,0	122,5	97,1	222,7	265,7	2,7	45,6	268,3
Mar	3,7	3,3	0,0	86,0	68,2	154,6	167,0	2,5	14,9	169,5
Apr	5,2	4,9	0,0	82,8	65,6	148,7	160,8	-0,9	11,2	159,9
Maj	2,3	10,7	0,0	26,9	21,3	39,8	61,8	-16,8	5,3	45,1
Jun	6,3	10,5	0,0	4,8	3,8	4,4	24,3	-6,0	14,0	18,4
Jul	4,2	12,7	0,0	0,9	0,7	-6,9	0,8	-7,9	-0,1	-6,9
Aug	14,6	8,8	0,0	5,1	4,0	14,9	7,2	5,1	-2,6	14,9
Sep	15,9	4,4	0,0	141,0	111,8	264,3	322,0	33,8	91,4	355,7
Okt	4,8	2,6	0,0	55,4	43,9	101,5	223,3	-16,2	105,5	207,0
Nov	5,8	1,3	0,0	53,9	42,8	101,2	119,3	9,5	27,7	128,9
Dec	6,0	0,5	0,0	81,6	64,7	151,8	208,4	0,5	57,2	209,0
År	43,2	47,2	0,0	178,7	141,7	1359,3	416,2	8,2	108,0	1467,3
Sommer	77,5	62,0	0,0	749,5	594,3	316,5	1805,5	-2,5	443,7	424,5
										416,2

Stofbalance Borup Sø 2001

TOTAL FOSFOR

Alle værdier i kg

	Atm. deposition (kg)	Umwält oplund (kg)	Målt tilløb (kg)	Fraløb (kg)	"Grundvand" (kg)	Magasin (kg)	Retention (kg)	Magasin + retention (kg)
Jan	0,1	6,7	8,4	21,8	6,7	-1,6	1,7	0,1
Feb	0,1	10,4	13,1	39,0	4,5	-1,9	-9,0	-10,9
Mar	0,1	4,0	5,1	11,5	0,8	1,7	-3,2	-1,5
Apr	0,1	4,7	5,9	6,9	0,7	0,8	3,7	4,5
Maj	0,1	1,6	2,0	4,9	0,4	13,7	-14,5	-0,8
Jun	0,1	0,6	0,8	2,4	2,7	-3,9	5,7	1,8
Jul	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	1,0	-0,6	0,4
Aug	0,1	2,3	2,9	1,7	-0,6	-0,7	3,7	3,0
Sep	0,1	18,9	23,9	31,4	16,4	-4,5	32,4	27,9
Okt	0,1	6,1	7,7	23,3	13,1	-3,5	7,2	3,7
Nov	0,1	8,0	10,0	8,7	3,9	-0,9	14,2	13,3
Dec	0,1	7,7	9,7	13,3	7,3	0,5	11,0	11,5
År	0,9	71,2	89,8	165,1	55,9	0,7	52,3	53,0
Sommer	0,4	23,6	29,9	40,6	18,9	5,6	26,7	32,3

Stofbalance Borup Sø 2001

TOTAL KVÆLSTOF

Alle værdier i kg

	Atm. deposition (kg)	Umwält oplund (kg)	Målt tilløb (kg)	Fraløb (kg)	"Grundvand" (kg)	Magasin (kg)	Retention (kg)	Magasin + retention (kg)
Jan	12	520	656	1675	514	-13	40	27
Feb	12	634	799	1762	302	35	-50	-15
Mar	12	393	496	788	86	-160	359	199
Apr	12	307	387	542	52	-163	379	216
Maj	12	83	104	126	19	-108	200	92
Jun	12	18	23	36	62	-48	126	79
Jul	12	4	5	2	-0	-5	24	18
Aug	12	17	22	13	-4	-4	38	34
Sep	12	729	920	807	574	207	1221	1428
Okt	12	230	290	937	423	-7	26	19
Nov	12	200	253	357	125	68	164	233
Dec	12	330	416	867	289	272	-92	180
År	143	3465	4370	7911	2442	74	2435	2509
Sommer	60	851	1073	984	651	42	1609	1651

Stofbalance Borup Sø 2001

JERN

Alle værdier i kg

	Atm. deposition (kg)	Umwält oplund (kg)	Målt tilløb (kg)	Fraløb (kg)	"Grundvand" (kg)	Magasin (kg)	Retention (kg)	Magasin + retention (kg)
Jan	0,0	33,6	42,4	118,6	36,8	-20,7	14,9	-5,8
Feb	0,0	46,3	58,3	47,4	19,1	-11,6	87,9	76,3
Mar	0,0	19,8	25,0	17,5	4,3	5,6	26,0	31,6
Apr	0,0	19,0	24,0	11,2	2,7	-3,6	38,1	34,5
Maj	0,0	3,9	4,9	5,9	0,8	7,3	-3,6	3,7
Jun	0,0	1,3	1,6	3,6	5,7	-8,5	13,5	5,0
Jul	0,0	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,4	0,4
Aug	0,0	5,3	6,7	1,7	-0,2	-0,9	11,0	10,1
Sep	0,0	105,8	133,5	49,2	85,7	0,3	275,5	275,8
Okt	0,0	32,9	41,5	44,4	83,3	-1,4	114,7	113,3
Nov	0,0	43,7	55,1	14,7	23,1	9,4	97,8	107,2
Dec	0,0	53,8	67,9	31,4	58,0	18,0	130,3	148,3
År	0,0	365,7	461,2	345,8	319,3	-6,1	806,5	800,4
Sommer	0,0	116,6	147,0	60,6	92,0	-1,8	296,8	295,0

Bilag 6

Borup Sø - Vand- og stofbalanceberegninger

Vand- og stofbalanceberegningerne er for 1989-97 udført ved hjælp af EDB-programmet STOQ-sømodul vers. 3.30, i 1998-2001 er anvendt vers. 4.4 - 4.6.

De anvendte beregningsmetoder er udførligt beskrevet i de tidligere års rapporter, eksempelvis i rapporten "Borup Sø 1989-95". For en gennemgang af programmets beregningsmetoder henvises derfor til eksempelvis nævnte rapport.

Til de beregnede værdier i samleskemaerne knytter sig følgende forklaringer:

Vandbalancer

1. Vandbalancer for perioden 1989-2001 er beregnet under hensyntagen til vandstandsændringer, nedbør og fordampning.
2. Opholdstiden er beregnet på grundlag af fraførte vandmængder.

Stofbalancer

1. Indsivet stofmængde via grundvandsindsivning lagt til tilførslen; udsivet stofmængde via grundvandsudsivning er lagt til fraførslen. Dette som følge af, at den beregnede ind- eller udsivning stammer fra usikkerheden på vandbalancen.
2. Retentionen (tilbageholdelsen) er beregnet som:

tilført stofmængde - fraført stofmængde,

hvor tilført stofmængde er:

transport fra målt opland + transport fra umålt opland + atm. deposition - magasinering + transport i grundvand

3. Vandføringsvægtet indløbskoncentration er beregnet som periodens stoftilførsel i målt opland / periodens vandtilførsel ligeledes i målt opland.

Årsopgørelse Vandbalance

	Nedbør	For-damping opland (1000m3)	Umålt (1000m3)	Tilløb (1000m3)	Afløb (1000m3)	"Grundvand" (1000m3)	Magasin (1000m3)	Samlet overfladetilførsel (1000m3)	Samlet incl. udsivning (1000m3)	Samlet tillørsel (1000m3)	Samlet fraførsel incl. udsivning (1000m3)	Stighøjde overfladetilførsel (m/år)	Stighøjde scatløb (m/år)	Opholdstid År (dage)
1983														
1988	2.256	1.569	641	1.089	-54	2	2.214	2.214	1.569	2.256	2.256	31,1	23,7	
1989	51	59	513	941	2.125	452	24	1.144	1.144	1.143	1.143	23,3	16,5	
1990	62	58	753	931	1.836	138	-12	1.697	2.149	2.125	2.125	12,0	11,5	30
1991	64	54	745	930	1.836	138	-12	1.686	1.824	1.836	1.836	17,9	22,4	0,082
1992	50	61	589	736	1.380	69	2	1.313	1.382	1.380	1.380	17,7	19,3	0,044
1993	74	52	1.160	1.450	2.651	23	6	2.633	2.656	2.651	2.651	27,7	27,9	16
1994	75	56	1.568	1.959	3.302	-256	-12	3.545	3.545	3.558	3.558	37,3	34,8	0,058
1995	50	57	846	1.057	2.091	173	-21	1.897	2.070	2.070	2.070	20,0	22,0	21
1996	49	62	234	293	617	116	12	513	629	617	617	5,4	6,5	0,060
1997	70	62	254	317	760	190	9	578	768	760	760	6,1	8,0	22
1998	82	47	897	1.118	1.984	-54	13	2.051	2.051	2.038	2.038	21,6	20,9	0,041
1999	77	54	920	1.161	1.956	-148	0	2.104	2.104	2.104	2.104	22,1	20,6	15
2000	59	46	605	763	1.763	372	-11	1.381	1.752	1.763	1.763	14,5	18,6	0,045
2001	78	62	594	750	1.806	444	-3	1.359	1.806	1.806	1.806	14,3	19,0	19

Sommeropgørelse Vandbalance

	Nedbør	For-damping opland (1000m3)	Umålt (1000m3)	Tilløb (1000m3)	Afløb (1000m3)	"Grundvand" (1000m3)	Magasin (1000m3)	Samlet overfladetilførsel (1000m3)	Samlet incl. udsivning (1000m3)	Samlet tillørsel (1000m3)	Samlet fraførsel incl. udsivning (1000m3)	Stighøjde overfladetilførsel (m/år)	Stighøjde scatløb (m/år)	Opholdstid År (dage)
1983														
1988	25	45	70	88	82	-68	-12	138	138	150	150	1,5	0,9	0,411
1989	29	43	61	76	177	72	17	123	195	177	177	1,3	1,9	0,184
1990	34	40	119	149	282	14	-7	261	275	282	282	2,7	3,0	0,140
1991	15	48	23	29	59	-6	-48	18	66	66	66	0,2	0,6	0,499
1992	37	346	432	607	-131	43	781	781	738	738	738	8,2	6,4	0,060
1993	41	306	382	394	-282	-1	675	675	676	676	676	7,1	4,1	0,076
1994	30	44	55	68	117	-18	-37	98	98	135	135	1,0	1,2	0,267
1995	19	44	54	68	217	96	-7	114	210	217	217	1,2	2,3	0,135
1996	23	48	82	102	178	6	-26	159	159	185	185	1,7	1,9	0,203
1997	34	48	20	24	90	30	-30	30	60	90	90	0,3	0,9	0,408
1998	31	37	31	39	69	-12	-16	64	64	81	81	0,7	0,7	0,286
1999	35	42	54	68	217	96	-7	114	210	217	217	1,2	2,3	0,135
2000	22	36	16	20	92	55	-15	22	78	92	92	0,2	1,0	0,271
2001	43	47	142	179	416	108	8	424	424	416	416	3,3	4,4	0,076

Borup Sø

	Nedbør	For-damping opland (1000m3)	Umålt (1000m3)	Tilløb (1000m3)	Afløb (1000m3)	"Grundvand" (1000m3)	Magasin (1000m3)	Samlet overfladetilførsel incl. udsivning (1000m3)	Samlet udsivning incl. udsivning (1000m3)	Samlet tillørsel (1000m3)	Samlet fraførsel incl. udsivning (1000m3)	Stighøjde overfladetilførsel (m/år)	Stighøjde scatløb (m/år)	Opholdstid År (dage)
1983														
1988	25	45	70	88	82	-68	-12	138	138	150	150	1,5	0,9	0,411
1989	29	43	61	76	177	72	17	123	195	177	177	1,3	1,9	0,184
1990	34	40	119	149	282	14	-7	261	275	282	282	2,7	3,0	0,140
1991	15	48	23	29	59	-6	-48	18	66	66	66	0,2	0,6	0,499
1992	37	346	432	607	-131	43	781	781	738	738	738	8,2	6,4	0,060
1993	41	306	382	394	-282	-1	675	675	676	676	676	7,1	4,1	0,076
1994	30	44	55	68	117	-18	-37	98	98	135	135	1,0	1,2	0,267
1995	19	44	54	68	217	96	-7	114	210	217	217	1,2	2,3	0,135
1996	23	48	82	102	178	6	-26	159	159	185	185	1,7	1,9	0,203
1997	34	48	20	24	90	30	-30	30	60	90	90	0,3	0,9	0,408
1998	31	37	31	39	69	-12	-16	64	64	81	81	0,7	0,7	0,286
1999	35	42	54	68	217	96	-7	114	210	217	217	1,2	2,3	0,135
2000	22	36	16	20	92	55	-15	22	78	92	92	0,2	1,0	0,271
2001	43	47	142	179	416	108	8	424	424	416	416	3,3	4,4	0,076

Årsopgørelse TOTAL-P

	Atm. dep. (kg)	Umfålt oplænd (kg)	Tilløb (kg)	Fraløb (kg)	"Grund- vand" (kg)	Magasin (kg)	Retention + retention (kg)	Magasin (kg)	Retention + retention (kg)	Magasin (kg)	Retention + retention (kg)	Magasin (kg)	Samlet tilførsel (kg)	Samlet fraførsel (kg)	Magasin + retention (g/m ² /år)	Retention (g/m ² /år)	Magasin + retention (g/m ² /år)	Vandføringsvægtet indløbskoncentration (mg/l)
1983																		
1988	1	113	141	103	-5	0	148	148	57,7	57,7	2,69	1,55	4,26	1,56	0,235			
1989	2	85	106	192	51	3	49	52	20,0	21,2	243	192	2,56	0,51	0,120	0,221		
1990	1	88	109	170	17	-5	51	46	23,5	21,3	216	170	2,27	0,53	0,113			
1991	1	44	55	92	-0	5	3	8	2,8	7,6	100	92	1,05	0,03	0,08	0,48	0,118	
1992	1	110	138	288	-10	-3	-46	-48	-18,2	-19,3	250	299	2,64	-0,48	-1,32	-0,51	0,095	
1993	2	204	255	303	-65	-3	95	92	20,6	20,0	460	368	4,84	1,00	2,74	0,97	0,130	
1994	2	71	89	170	13	1	4	5	2,2	2,9	175	170	1,84	0,04	0,11	0,05	0,084	
1995	2	44	55	95	21	-9	37	27	29,8	22,3	123	95	1,29	0,38	1,05	0,29	0,188	
1996	2	29	51	54	31	1	57	58	50,8	51,7	112	54	1,18	0,60	1,65	0,61	0,161	
1997	1	123	154	143	-3	3	129	132	46,4	47,6	278	146	2,93	1,36	3,72	1,39	0,138	
1998	1	82	103	172	2	0	16	16	8,5	8,5	188	172	1,97	0,17	0,46	0,17	0,089	
1999	1	40	51	107	32	-3	21	18	17,1	14,4	124	107	1,31	0,22	0,61	0,19	0,066	
2000	1	71	90	165	56	1	52	53	24,0	24,3	218	165	2,29	0,55	1,51	0,56	0,120	

Sommeropgørelse TOTAL-P

	Atm. dep. (kg)	Umfålt oplænd (kg)	Tilløb (kg)	Fraløb (kg)	"Grund- vand" (kg)	Magasin (kg)	Retention + retention (kg)	Magasin (kg)	Retention + retention (kg)	Magasin (kg)	Retention + retention (kg)	Magasin (kg)	Samlet tilførsel (kg)	Samlet fraførsel (kg)	Magasin + retention (g/m ² /år)	Retention (g/m ² /år)	Magasin + retention (g/m ² /år)	Vandføringsvægtet indløbskoncentration (mg/l)
1983																		
1988	1	46	23	56	8	1	4	3	67	70	64,9	36	75,0	48	12	0,51	0,38	0,101
1989	1	21	26	44	1	4	0	0	4	4	6,8	-21	67,6	104	34	1,09	1,94	0,260
1990	1	3	3	8	-3	2	-6	-6	-4	-4	9,0	-37,8	60	48	44	0,51	0,00	0,653
1991	1	56	70	115	-26	6	-21	-15	-16,3	-16,3	-92,8	-67,5	7	11	0,07	-0,06	-0,18	0,174
1992	1	85	106	68	-73	3	47	51	24,8	24,8	-11,5	-126	141	141	1,33	-0,22	-0,59	0,117
1993	1	7	9	20	-3	3	-10	-6	-10	-14	-42,7	-42,7	40,3	34	20	0,35	0,15	0,179
1994	0	6	7	20	-3	1	4	0	0	14	52,6	52,6	42,3	17	10	0,18	0,09	0,162
1995	0	10	13	31	18	7	4	11	8,6	8,6	25,7	25,7	42	31	0,44	0,04	0,190	0,128
1996	0	3	3	12	9	-4	6	2	6	40,1	16,3	15	12	12	0,15	0,06	0,11	0,193
1997	0	24	30	41	19	6	27	32	32	44,4	36,7	73	44,4	41	41	0,77	0,28	0,155
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,03	0,167
1999	0	10	13	31	18	7	4	11	8,6	8,6	25,7	25,7	42	31	0,44	0,04	0,10	0,155
2000	0	3	3	12	9	-4	6	2	6	40,1	16,3	15	12	12	0,15	0,06	0,17	0,190
2001	0	24	30	41	19	6	27	32	32	44,4	36,7	73	44,4	41	41	0,77	0,28	0,167

Borup Sø

Borup Sø

Årsopgørelse TOTAL-N

	Atm. dep. (kg)	Urmålt oplund (kg)	Tilløb (kg)	Fraløb (kg)	"Grund- vand" (kg)	Magasin (kg)	Retention (kg)	Magasin + retention (kg)	Retention %	Magasin + retention (kg)	Retention %	Magasin + retention (kg)	Retention %	Samlet tilførsel (kg/m ² /år)	Samlet fraførsel (kg)	Samlet tilførsel (kg/m ² /år)	Magasin + retention (g/m ² /år)	Vandføringsvægtet indløbskoncentration (mg/l)
1983						13.951		40.0	34.879	20.928	367.15							
1988	131	4.156	5.195	5.391	72	-37	4.200	4.163	44.0	43.6	9.554	5.391	100.56	44.21	121.12	43.82	8.108	
1990	131	6.189	7.736	15.716	3.758	719	1.379	2.098	7,7	11,8	17.814	15.716	14,52	39,77	22,09	8,222		
1991	131	5.383	6.729	11.233	1.046	-487	2.544	2.057	19,1	15,5	13.290	11.233	139,90	26,78	73,38	21,66	7,228	
1992	143	6.058	7.573	10.644	1.086	585	3.631	4.216	24,4	28,4	14.859	10.644	156,41	38,22	104,72	44,37	10,294	
1993	142	8.313	10.391	19.511	758	-621	715	94	3,6	0,5	19.605	19.511	206,37	7,53	20,62	0,99	7,164	
1994	190	8.836	11.044	19.678	564	18	-190	-171	-0,9	-0,9	20.070	20.242	211,26	-2,00	-5,47	-1,80	5,637	
1995	190	4.572	5.715	11.826	989	-459	100	-360	0,9	-3,1	11.466	11.826	120,70	1,05	2,88	-3,79	5,404	
1996	190	1.479	1.848	2.721	853	187	1.463	1.650	33,5	37,8	4.370	2.721	46,00	15,40	42,19	17,37	6,310	
1997	190	1.992	2.490	4.313	1.513	552	1.320	1.872	21,3	30,3	6.186	4.313	65,11	13,90	38,07	19,71	7,857	
1998	143	7.740	9.646	15.698	-179	-267	1.918	1.651	10,9	9,4	17.528	15.877	184,50	20,19	55,31	17,37	8,624	
1999	143	5.640	7.113	10.344	-1.551	-28	1.030	1.001	8,0	7,8	12.896	11.895	135,75	10,84	29,69	10,54	6,129	
2000	143	3.639	4.590	8.464	2.069	-172	2.149	1.977	20,6	18,9	10.441	8.464	109,90	22,62	61,98	20,81	6,018	
2001	143	3465	4370	7911	2442	74	2435	259	23,4	24,1	10.420	7,911	109,68	25,63	70,23	26,41	5,830	

Sommeropgørelse TOTAL-N

	Atm. dep. (kg)	Urmålt oplund (kg)	Tilløb (kg)	Fraløb (kg)	"Grund- vand" (kg)	Magasin (kg)	Retention (kg)	Magasin + retention (kg)	Retention %	Magasin + retention (kg)	Retention %	Magasin + retention (kg)	Retention %	Samlet tilførsel (kg/m ² /år)	Samlet fraførsel (kg)	Samlet tilførsel (kg/m ² /år)	Magasin + retention (g/m ² /år)	Vandføringsvægtet indløbskoncentration (mg/l)
1983						1.359		31,3	4.338	2.979	45,66							
1988	55	258	323	250	-132	-163	-67	843	89,1	946	103	9,96						
1989	55	426	532	868	605	460	290	750	-10,6	39,8	636	383	6,70	-0,71	-1,94	2,67	3,683	
1990	55	548	685	694	164	-118	877	759	17,9	46,3	1.618	868	17,03	3,05	8,36	7,89	7,014	
1991	60	110	138	169	19	-299	457	158	140,0	48,3	52,2	1.452	694	15,29	9,23	25,29	7,99	4,605
1992	60	1.811	2.264	3.625	-442	529	-461	68	-11,2	1,6	4.134	4.067	169	3,44	4,81	13,18	1,66	
1993	80	1.576	1.971	1.781	-925	96	823	920	22,7	25,4	3.627	2.707	38,18	8,67	-13,30	0,71	5,240	
1994	80	188	235	286	-53	-126	289	163	57,6	32,5	502	339	5,29	3,05	-1,94	2,67	3,683	
1995	79	343	429	435	22	-160	598	438	68,5	50,2	873	435	9,19	3,05	8,34	1,72	3,439	
1996	80	73	92	155	250	-50	389	339	78,6	68,6	494	155	5,20	4,09	17,26	4,61	4,198	
1997	80	171	213	216	-19	-286	494	298	111,5	46,9	443	235	4,66	5,20	11,21	3,57	3,738	
1998	60	219	277	438	230	49	298	347	38,0	44,2	786	438	8,27	3,14	2,19	5,451		
1999	60	71	90	190	256	-66	352	286	74,0	60,1	476	190	5,01	3,71	8,61	3,66	4,098	
2000	60	851	1073	984	651	42	1609	1651	61,1	62,7	2.635	984	27,74	16,93	10,15	3,01	4,485	
2001	60															46,39	17,38	

Borup Sø

Årsopgørelse TOTAL-JERN

	Atm. dep. (kg)	Umålt oplund (kg)	Tilløb (kg)	Fraløb (kg)	"Grund- vand" (kg)	Magasin (kg)	Retention + retention (kg)	Magasin (kg)	Retention + retention (kg)	Magasin (kg)	Retention + retention (kg)	Samlet tilførsel (kg)	Samlet fraførsel (kg)	Retention + retention (kg)	Magasin + retention (g/m ² /år)	Retention (mg/m ² /dag)	Magasin + retention (g/m ² /år)	Vandføringsvægtet indløbskoncentration (mg/l)
1983																		
1988																		
1989	0	256	320	504	463	-3	538	51.8	51.4	1.039	504	10.93	5.66	15.51	5.62	0.340		
1990	0	202	252	436	-16	-3	5	2	1.1	0.4	454	452	4.78	0.05	0.14	0.02	0.343	
1991	0	381	476	481	15	29	361	390	41.5	44.8	871	481	9.17	3.80	10.42	4.11	0.328	
1992	0	813	1.016	946	29	-4	916	911	49.3	49.1	1.857	946	19.55	9.64	26.40	9.59	0.518	
1993	0	425	532	578	98	-44	521	477	49.4	45.2	1.055	578	11.10	5.48	15.03	5.02	0.503	
1994	0	72	90	83	45	-1	125	124	60.5	60.1	207	83	2.18	1.32	3.61	1.31	0.307	
1995	0	57	71	87	43	-0	84	84	49.2	49.0	171	87	1.80	0.89	2.43	0.88	0.225	
1996	0	927	1.156	427	31	37	1.650	1.687	78.0	79.8	2.114	427	22.25	17.37	47.58	17.76	1.033	
1997	0	431	544	689	-82	-12	217	204	22.2	21.0	975	771	10.27	2.28	6.25	2.15	0.469	
1998	0	179	225	292	132	6	237	243	44.2	45.4	535	292	5.64	2.49	6.83	2.56	0.295	
1999	0	366	461	346	319	-6	807	800	70.4	69.8	1.146	346	12.07	8.49	23.26	8.43	0.615	

Sommeropgørelse TOTAL-JERN

	Atm. dep. (kg)	Umålt oplund (kg)	Tilløb (kg)	Fraløb (kg)	"Grund- vand" (kg)	Magasin (kg)	Retention + retention (kg)	Magasin (kg)	Retention + retention (kg)	Magasin (kg)	Retention + retention (kg)	Samlet tilførsel (kg)	Samlet fraførsel (kg)	Retention + retention (kg)	Magasin + retention (g/m ² /år)	Retention (mg/m ² /dag)	Magasin + retention (g/m ² /år)	Vandføringsvægtet indløbskoncentration (mg/l)
1983	0	61	76	212	74	30	-31	-1	-14.7	-0.3	211	212	2.22	-0.33	-0.89	-0.01	1.004	
1988	0	5	6	11	-12	101	-113	-12	-1.011.1	-103.4	11	23	0.12	-1.19	-3.25	-0.12	0.216	
1989	0	93	117	99	-32	27	51	79	24.4	37.5	210	131	2.21	0.54	1.48	0.83	0.270	
1990	0	83	103	98	-45	3	40	43	21.2	23.1	186	143	1.96	0.42	1.14	0.45	0.271	
1991	0	13	16	25	-4	-0	-0	-1	-0.9	-2.1	28	29	0.30	-0.00	-0.01	-0.01	0.230	
1992	0	16	21	23	1	-6	21	15	54.1	38.6	38	23	0.40	0.22	0.60	0.16	0.202	
1993	0	6	7	10	7	-6	15	10	76.8	48.2	20	10	0.21	0.16	0.44	0.10	0.299	
1994	0	9	11	5	-0	-8	22	14	112.6	72.8	19	5	0.20	0.23	0.62	0.15	0.272	
1995	0	21	27	21	11	-5	44	38	73.2	64.1	59	21	0.63	0.46	1.25	0.40	0.397	
1996	0	5	6	11	18	-8	26	19	89.2	62.8	30	11	0.31	0.28	0.76	0.20	0.320	
1997	0	117	147	61	-2	297	295	83.5	83.0	356	61	3.74	3.12	8.56	3.11	0.823		

Borup Sø

Bilag 7

Borup Sø - kildeopsplitning af kvælstof (N) og fosfor (P)

Forklaring til kildeopsplitningen:

Naturbidraget er beregnet ved multiplikation af den årlige vandtilførsel til søen og vandføringsvægtede mediankoncentrationer, anbefalet af DMU. De anvendte værdier siden 1989 er vist i tabellen nedenunder:

År	Total-P (mg/l)	Total-N (mg/l)
1989	0,055	1,60
1990	0,055	1,80
1991	0,052	1,50
1992	0,050	1,61
1993	0,052	2,77
1994	0,051	1,60
1995	0,048	1,40
1996	0,048	1,40
1997	0,048	1,40
1998	0,050	1,52
1999	0,054	1,49
2000	0,044	1,35
2001	0,049	1,27

For årene 1989-91 blev antal enkeltejendomme og PE i oplandet til søen opgjort til henholdsvis 19 stk. og 2,6 PE/enkeltejendom. I 1992 blev antallet korrigteret til 21 stk. enkeltejendomme og 2,6 PE/enkeltejendom i forbindelse med kommunernes registrering af enkeltejendomme efter Miljøstyrelsens retningslinjer. Antallet af enkeltejendomme er i 1994 justeret til 25 og 2,0 PE/enkeltejendom.

En mere detaljeret registrering foretaget af kommunerne i foråret 1999 har medført en ny justering af antallet af enkeltejendomme og PE i oplandet til henholdsvis 26 og 62. Siden 1994 er 1 PE ændret i forhold til tidligere:

1 PE = 1,0 kg/P pr. år og 4,4 kg/N pr. år.

Bemærk:

Bidraget fra enkeltejendomme i 1997 er incl. den anslæde fosformængde på 15 kg, der i januar førtes til Borup Bæk via overløb fra kloakledning. Det reelle bidrag fra enkeltejendomme i 1997 er således uændret 26 kg fosfor.

Borup Sø: Kildeopsplittning af Kvælstof (N)
- alle tal i kg

	Enkeltejendomme	Landbrug	Natur	Atm. dep.	Samlet tilførsel
1989	37	154	63	1	256
1990	37	86	118	2	243
1991	37	83	94	1	216
1992	45	-16	70	1	100
1993	45	67	137	2	250
1994	26	252	180	2	460
1995	26	47	100	2	175
1996	26	64	31	2	123
1997	41	33	37	2	112
1998	16	161	101	1	278
1999	15	59	112	1	188
2000	15	32	77	1	124
2001	15	114	88	1	218

Borup Sø: Kildeopsplittning af Kvælstof (N)
- alle tal i kg

	Enkeltejendomme	Landbrug	Natur	Atm. dep.	Samlet tilførsel
1989	92	7.485	1.845	131	9.554
1990	92	13.729	3.862	131	17.814
1991	92	10.346	2.721	131	13.290
1992	132	12.342	2.243	143	14.859
1993	132	12.035	7.295	142	19.605
1994	116	14.121	5.643	190	20.070
1995	116	8.253	2.907	190	11.466
1996	116	3.164	900	190	4.370
1997	116	4.815	1.065	190	6.186
1998	75	14.246	3.064	143	17.528
1999	70	9.583	3.101	143	12.896
2000	70	7.881	2.347	143	10.441
2001	70	7.930	2.277	143	10.420


Borup Sø: Kildeopsplittning af Kvælstof (N)
- alle tal i %

	Enkeltejendomme	Landbrug	Natur	Atm. dep.	Samlet tilførsel
1989		14,5	60,2	24,8	0,6
1990		15,2	35,5	48,5	0,8
1991		17,1	38,5	43,7	0,7
1992		38,8	0,0	60,0	1,2
1993		18,0	26,6	54,7	0,8
1994		5,7	54,8	39,1	0,4
1995		14,9	27,1	56,9	1,1
1996		21,2	52,0	25,2	1,6
1997		36,3	29,5	32,5	1,7
1998		5,8	57,7	36,2	0,3
1999		8,0	31,6	59,9	0,5
2000		12,1	25,7	61,6	0,7
2001		6,9	52,5	40,2	0,4

Borup Sø: Kildeopsplittning af Kvælstof (N)
- alle tal i %


Bilag 8

Tidsvægtede års- og sommermidler							BORUP SØ				
Parameter	ÅR	År 1/1-31/12	Sommer 1/5-30/9	År Max.	År Min.	Sommer Max.	Type Lin. reg.	Periode	Niveau %	Symbol (+/-)	
Total-P mg/l	1983	0.228	0.259	0.082	0.520	0.120	0.520	År	1989-2001	5	..
	1988	0.175	0.282	0.064	0.400	0.130	0.400	Sommer	1989-2001	5	..
	1989	0.143	0.222	0.051	0.310	0.120	0.310				
	1990	0.156	0.255	0.048	0.400	0.180	0.400				
	1991	0.126	0.179	0.042	0.270	0.100	0.270				
	1992	0.174	0.267	0.064	0.370	0.180	0.370				
	1993	0.143	0.229	0.045	0.340	0.120	0.340				
	1994	0.152	0.236	0.045	0.309	0.113	0.309				
	1995	0.156	0.209	0.049	0.284	0.081	0.284				
	1996	0.146	0.138	0.061	0.271	0.061	0.196				
	1997	0.098	0.137	0.033	0.250	0.066	0.250				
	1998	0.122	0.189	0.040	0.274	0.093	0.274				
	1999	0.129	0.176	0.054	0.243	0.093	0.243				
	2000	0.103	0.165	0.042	0.214	0.096	0.214				
	2001	0.111	0.180	0.028	0.309	0.091	0.309				




Tidsvægtede års- og sommermidler BORUP SO							
Parameter	ÅR	År 1/1-31/12	Sommer 15-30/9	År Max.	År Min.	Sommer Max.	Sommer Min.
NO2 + NO3 mg/l	1983	3.202	1.060	0.005	7.200	0.005	3.300
	1988	2.121	0.057	0.005	7.200	0.450	0.450
	1989	2.023	0.232	0.005	6.800	0.005	1.400
	1990	3.560	0.232	0.005	8.700	0.005	0.013
	1991	2.862	0.440	0.005	9.300	0.005	2.600
	1992	3.357	0.183	0.005	13.200	0.005	1.000
	1993	3.812	0.695	0.005	10.200	0.005	4.300
	1994	2.350	0.421	0.005	6.130	0.005	3.460
	1995	1.504	0.138	0.005	6.550	0.005	1.500
	1996	1.343	0.290	0.005	4.290	0.005	0.898
	1997	1.915	0.057	0.005	6.350	0.005	0.308
	1998	3.534	0.254	0.005	9.380	0.005	2.390
	1999	1.863	0.033	0.005	6.620	0.005	0.231
	2000	1.589	0.006	0.005	5.880	0.005	0.008
	2001	2.148	0.160	0.005	5.710	0.005	0.360

Tidsvægtede års- og sommermidler BORUP SO							
Parameter	ÅR	År 1/1-31/12	Sommer 15-30/9	År Max.	År Min.	Sommer Max.	Sommer Min.
NH4-N mg/l	1983	0.103	0.015	0.002	0.580	0.007	0.038
	1988	0.111	0.007	0.004	0.540	0.004	0.012
	1989	0.089	0.011	0.002	0.430	0.002	0.036
	1990	0.051	0.006	0.001	0.180	0.001	0.008
	1991	0.068	0.019	0.001	0.250	0.001	0.033
	1992	0.059	0.007	0.001	0.250	0.001	0.013
	1993	0.070	0.028	0.001	0.280	0.001	0.120
	1994	0.068	0.036	0.005	0.248	0.005	0.248
	1995	0.301	0.073	0.006	1.190	0.008	0.254
	1996	0.381	0.059	0.005	1.570	0.005	0.318
	1997	0.102	0.019	0.005	0.378	0.005	0.079
	1998	0.075	0.063	0.005	0.231	0.005	0.231
	1999	0.050	0.011	0.005	0.253	0.005	0.040
	2000	0.049	0.007	0.005	0.200	0.005	0.016
	2001	0.083	0.038	0.005	0.323	0.005	0.192




Parameter	Tidsvægtede års- og sommermidler BORUP SØ							
Klorofyl a mikrogram/l	År	År Min.	År Max.	Sommer Min.	Sommer Max.	Type Lin. reg.	Periode % Niveau Symbol (+/-)	
1983	83	84	25	240	48	116	År 1989-2001 5 **	
1988	117	148	8	290	95	290	Sommer 1989-2001 5 **	
1989	81	121	16	310	39	310		
1990	58	93	5	210	38	210		
1991	73	106	4	220	74	220		
1992	101	162	9	260	85	260		
1993	62	114	9	200	25	200		
1994	107	164	1	284	63	251		
1995	51	84	4	150	20	150		
1996	62	73	17	195	17	165		
1997	35	59	5	99	19	99		
1998	43	78	1	155	14	155		
1999	68	100	5	202	30	173		
2000	49	83	8	126	28	126		
2001	32	44	2	94	5	94		


Parameter	Tidsvægtede års- og sommermidler BORUP SØ							
pH pH	År	År Min.	År Max.	Sommer Min.	Sommer Max.	Type Lin. reg.	Periode % Niveau Symbol (+/-)	
1983	8.3	8.4	7.8	8.8	7.9	8.7	År 1989-2001 0	
1988	8.3	8.4	7.9	8.7	8.3	8.7		
1989	8.3	8.5	7.7	8.9	8.1	8.9		
1990	8.2	8.5	7.6	8.9	8.0	8.9		
1991	8.2	8.4	7.3	8.7	8.2	8.7		
1992	8.3	8.5	7.9	9.0	8.1	9.0		
1993	7.9	8.2	7.2	8.7	7.4	8.7		
1994	8.3	8.4	7.7	9.0	8.0	8.7		
1995	8.3	8.5	7.8	8.9	8.1	8.9		
1996	8.1	8.4	7.7	8.6	8.2	8.6		
1997	8.2	8.3	7.7	8.5	8.1	8.4		
1998	8.1	8.3	7.5	8.6	8.0	8.6		
1999	8.3	8.4	7.9	8.7	8.3	8.7		
2000	8.3	8.4	8.1	8.7	8.2	8.7		
2001	8.1	8.2	7.8	8.6	8.0	8.6		



Tidsvægtede års- og sommermidler BORUP SØ									
Parameter	ÅR	År	Sommer	År	Summer	Summer	Type	Periode	Niveau
		1/1-31/12	15:30:9	Min.	Max.	Max.	Lin. reg.		Symbol (+/-)
Silicium mg/l	1983	1.273	0.127	0.028	2.900	0.028	0.250	År	1989-2001 1 +++
	1988	2.088	1.427	0.050	4.800	0.050	4.800	Sommer	1989-2001 1 +++
	1989	2.604	1.161	0.040	6.700	0.040	3.900		
	1990	2.635	0.859	0.020	5.300	0.020	4.200		
	1991	1.780	0.822	0.033	4.500	0.033	3.200		
	1992	2.001	0.761	0.040	4.900	0.040	3.700		
	1993	2.403	1.085	0.070	5.000	0.070	3.100		
	1994	2.763	2.582	0.170	6.600	0.310	6.600		
	1995	1.903	0.499	0.030	4.400	0.030	1.700		
	1996	3.129	1.124	0.030	6.700	0.030	2.600		
	1997	2.434	1.666	0.050	5.900	0.050	5.900		
	1998	3.768	3.854	0.030	9.300	0.030	9.300		
	1999	4.340	3.879	0.070	7.800	0.070	7.800		
	2000	4.547	5.581	1.210	11.000	1.210	11.000		
	2001	4.001	2.851	0.770	6.700	0.770	6.200		





Parameter	Tidsvægtede års- og sommermidler										BORUP SØ	
	ÅR	År	Sommer	År	Sommer	År	Sommer	År	Sommer	År	Type	Periode
COD, part.		1/1-31/12	1/5-30/9	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Lin. reg.	Niveau	Symbol (+/-)
	1983	11.9	17.2	4.0	32.0	9.0	32.0	1989-2001		År		
	1988	11.9	16.6	2.7	24.0	12.0	24.0					
	1990	9.8	17.0	1.0	42.0	10.0	42.0					
	1991	10.5	23.5	2.5	49.0	13.0	49.0					
	1992	14.5	21.6	2.1	31.0	4.9	31.0					
	1993	11.8	28.3	1.7	35.0	13.2	35.0					
	1994	16.7	20.9	2.4	37.0	11.0	37.0					
	1995	13.6	17.7	3.4	26.0	9.7	26.0					
	1996	12.7	18.7	3.0	41.0	7.7	41.0					
	1997	14.5										
	1998											
	1999											
	2000											
	2001											



Parameter	Tidsvægtede års- og sommermidler						
	BORUP SO	ÅR	År 1/1-31/12	Sommer 1/5-30/9	År Max.	Sommer Min.	Sommer Max.
Rel. vandstand m		1983					
	ÅR	1988	0.41	0.29	0.15	0.60	0.43
		1989	0.49	0.32	0.17	0.85	0.41
		1990	0.56	0.44	0.28	0.85	0.64
		1991	0.34	0.18	0.02	0.62	0.02
		1992	0.57	0.45	0.19	1.46	0.19
		1993	0.59	0.41	0.20	1.23	0.78
		1994	0.40	0.27	0.08	1.05	0.50
		1995	0.37	0.32	0.15	0.53	0.15
		1996	0.42	0.31	0.15	0.65	0.15
		1997	0.50	0.34	0.30	0.84	0.30
		1998					

Statistik - års- og sommermidler						
Symbol (+/-)	Niveau °	Periode	Type	Lin. reg.	År	År
0	0	1989-2001	Sommer	1989-2001	0	89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01



Grafik

Borup Sø 2001 - vandkemianalyser

Dato	Dybde cm	pH ph	Torsstof, susp.stof mg/l	Glodetab,susp.stof mg/l	Alkalinitet,tot TA mmol/l	Ammonium-N,filt mg/l	Nitrit+nitrat-N,filt mg/l	Nitrogen,tot mg/l	Orthophosphat-P,filt mg/l	Phosphor, total-P mg/l	Jern mg/l	Silicium mg/l	Chlorofyl A mikrogram/l
09-01-2001	80	7,8	6,6	2,8	4,51	0,323	5,71	6,51	0,039	0,063	0,531	5,3	1,7
06-02-2001	10	8,0	3,0	2,8	4,95	0,231	4,89	5,48	0,011	0,049	0,136	4,9	20
06-03-2001	10	8,0	5,4	3,6	6,28	0,009	5,19	5,97	0,006	0,028	0,085	3,9	28
03-04-2001	72	8,2	5,6	3,6	4,50	< 0,005	3,16	4,04	< 0,004	0,049	0,152	2,9	21
19-04-2001	87	8,3	5,5	2,9	4,52	< 0,005	2,19	3,29	0,006	0,049	0,078	2,2	32
30-04-2001	65	8,4	12	7,6	4,52	< 0,005	1,37	2,73	< 0,004	0,054	0,115	1,9	58
15-05-2001	62	8,6	11	7,2	4,26	< 0,005	0,012	1,47	< 0,004	0,091	0,057	0,85	45
29-05-2001	60	8,1	29	20	4,56	0,097	0,018	2,02	0,011	0,239	0,234	0,77	34
13-06-2001	55	8,0	9,4	4,9	4,51	0,192	0,028	1,70	0,018	0,145	0,141	0,97	5,3
26-06-2001	55	8,1	8,3	6,1	4,49	0,008	< 0,005	1,49	0,006	0,134	0,120	3,1	59
10-07-2001	50	8,1	19	13	4,68	< 0,005	0,009	1,60	0,106	0,309	0,149	5,4	94
23-07-2001	45	8,1	11	8,2	4,78	0,018	0,017	1,53	0,083	0,194	0,068	6,2	47
07-08-2001	52	8,1	23	18	4,70	0,013	0,004	1,68	0,080	0,249	0,199	4,7	40
21-08-2001	50	8,2	16	9,5	4,62	0,008	< 0,005	1,37	0,121	0,246	0,022	3,3	31
04-09-2001	57	8,3	15	9,0	4,57	0,013	0,009	1,49	0,079	0,188	0,155	1,5	27
18-09-2001	65	8,2	9,6	5,3	4,45	0,023	0,360	1,85	0,012	0,104	0,092	1,8	52
16-10-2001	65	8,0	3,6	1,9	4,62	0,133	2,65	4,11	0,038	0,098	0,084	6,7	53
13-11-2001	65	8,2	4,0	2,0	5,06	0,089	1,41	2,60	0,037	0,070	0,092	6,6	15,8
11-12-2001	65	8,0	5,5	3,5	5,20	0,127	3,43	4,23	0,039	0,065	0,215	5,7	5,9

Borup Sø 2001 - felsmålinger

Dato	Klokkeslet	Sigtdybde m	Total dybde m	Vandstand lokal m
09-01-2001	1020	1,20	1,90	0,68
24-01-2001	1210			0,53
06-02-2001	1315			0,55
21-02-2001	1200			0,61
06-03-2001	1055			0,54
21-03-2001	1215			0,58
03-04-2001	1030	1,30	1,75	0,60
19-04-2001	1030	1,05	1,75	0,58
30-04-2001	1050	0,80	1,60	0,59
15-05-2001	1035	0,90	1,55	0,50
29-05-2001	1030	0,60	1,50	0,41
13-06-2001	1045	1,10	1,40	0,41
26-06-2001	1030	0,85	1,40	0,37
10-07-2001	1045	0,95	1,30	0,30
23-07-2001	1040	1,00	1,20	0,27
07-08-2001	1025	0,80	1,35	0,26
21-08-2001	1030	0,85	1,30	0,28
04-09-2001	1035	0,85	1,45	0,33
18-09-2001	1040	1,10	1,60	0,49
03-10-2001	1235			0,71
16-10-2001	1030	1,40	1,60	0,53
31-10-2001	1230			0,50
13-11-2001	1035	> 1,60	1,60	0,56
28-11-2001	1255			0,61
11-12-2001	1040	> 1,60	1,60	0,57

Bilag 9

Fytoplanktonbiomasser - tidsvægtede arsgennemsnit

Fytoplanktonbiomasser - %-fordeling arsgennemsnit

	Blaagronalger	Kiselalger	Gronalger	Rekylalger	Furealger	Ojealger	Gulaalger	Stikalger	Ubestemt	Total
	mm3/l	mm3/l	mm3/l	mm3/l	mm3/l	mm3/l	mm3/l	mm3/l	mm3/l	mm3/l
1989	1.4	3.3	1.4	0.5	0.1	0.3	0.0	0.2	7.1	
1990	1.9	5.1	0.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.6	9.8	
1991	2.1	6.9	1.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	11.4	
1992	2.3	13.0	1.2	2.6	0.0	0.0	0.1	0.0	20.4	
1993	3.3	4.6	2.1	1.1	0.0	0.0	0.2	0.3	12.2	
1994	4.8	9.6	1.5	2.8	0.0	0.0	0.0	0.6	19.3	
1995	3.0	4.6	0.4	1.8	0.1	0.0	0.1	0.0	10.4	
1996	7.3	2.8	0.5	2.6	0.2	0.0	0.1	0.3	13.7	
1997	0.2	2.5	1.0	1.4	0.1	0.1	0.2	0.2	6.0	
1998	0.3	5.4	0.6	2.9	0.2	0.1	0.1	0.1	9.7	
1999	3.6	3.8	1.2	1.3	0.2	0.3	0.6	0.1	11.6	
2000	1.5	2.7	0.6	1.2	0.3	0.2	0.1	0.4	6.8	
2001	0.0	1.6	0.5	1.2	0.0	0.1	0.1	0.1	3.8	
Gennemsnit 1989-2000	2.6	5.4	1.0	1.7	0.1	0.1	0.1	0.5	11.5	

Udvikling:
Lineær regressionsanalyse

Signifikansniveau:
Symbol:
0 0 10% ++ 5% + 10% + 0 0 10% ++ 5% + 10% + 0

Fytoplanktonbiomasser - %fordeling sommergennemsnit

	Blaagronalger	Kiselalger	Gronalger	Rekylalger	Furealger	Ojealger	Gulaalger	Stikalger	Ubestemt	Total
	mm3/l	mm3/l	mm3/l	mm3/l	mm3/l	mm3/l	mm3/l	mm3/l	mm3/l	mm3/l
1989	3.2	6.0	2.3	0.4	0.0	0.3	0.0	0.2	12.5	
1990	4.0	7.5	1.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.8	14.9	
1991	4.8	9.1	2.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.9	18.0	
1992	5.4	18.1	2.3	1.8	0.0	0.0	0.2	0.0	29.7	
1993	7.8	7.1	4.5	0.8	0.0	0.0	0.2	0.1	21.8	
1994	11.4	10.5	3.0	3.2	0.0	0.0	0.0	1.2	29.3	
1995	7.1	9.3	0.9	1.7	0.3	0.0	0.3	0.5	20.0	
1996	17.4	6.1	0.7	1.6	0.4	0.0	0.0	0.5	26.7	
1997	0.5	5.8	2.2	1.1	0.0	0.3	0.2	0.1	10.9	
1998	0.6	11.1	1.3	4.5	0.4	0.2	0.2	0.2	18.5	
1999	3.6	7.4	2.8	1.4	0.5	0.8	1.0	0.8	16.3	
2000	3.4	5.0	0.9	1.2	0.6	0.4	0.1	0.6	12.3	
2001	0.0	2.9	0.8	1.2	0.1	0.1	0.4	0.2	5.7	
Gennemsnit 1989-2000	5.8	8.6	2.1	1.6	0.2	0.2	0.0	0.8	19.4	

Udvikling:
Lineær regressionsanalyse

Signifikansniveau:
Symbol:
0 0 1% +++ 10% + 0 0 10% +++ 5% + 1% 0 0 1% +++ 5% + 10%

Fytoplanktonbiomasser - %fordeling sommergennemsnit

	Blaagronalger	Kiselalger	Gronalger	Rekylalger	Furealger	Ojealger	Gulaalger	Stikalger	Ubestemt	Total
	mm3/l	mm3/l	mm3/l	mm3/l	mm3/l	mm3/l	mm3/l	mm3/l	mm3/l	mm3/l
1989	19.6	46.4	19.2	7.2	0.8	3.5	0.7	0.0	2.7	100
1990	18.9	52.1	9.3	13.3	0.0	0.0	0.1	0.0	6.2	100
1991	18.5	60.3	11.1	5.1	0.0	0.0	0.1	0.0	5.1	100
1992	11.1	63.9	5.9	12.7	0.0	0.0	0.4	0.0	6.0	100
1993	26.7	37.2	17.1	8.8	0.0	0.0	1.9	2.8	5.5	100
1994	24.6	49.7	7.8	14.6	0.0	0.0	0.2	0.1	3.0	100
1995	29.2	43.9	4.1	17.8	1.0	0.0	1.1	0.0	2.9	100
1996	52.9	20.2	3.8	18.9	1.7	0.1	0.6	0.0	1.9	100
1997	3.7	41.6	16.3	23.9	0.9	2.1	2.6	3.3	5.7	100
1998	2.7	56.4	5.8	30.0	1.7	0.9	1.0	0.0	1.4	100
1999	31.4	33.1	10.1	10.8	2.0	3.0	5.4	0.6	3.6	100
2000	21.7	39.3	8.9	17.0	3.8	2.5	1.6	0.0	5.2	100
2001	0.2	42.4	12.7	31.4	1.3	1.5	5.1	1.9	3.6	100
Gennemsnit 1989-2000	21.8	45.3	9.9	15.0	1.0	1.0	1.3	0.6	4.1	100

Udvikling:
Lineær regressionsanalyse

Signifikansniveau:
Symbol:
0 0 1% +++ 10% + 0 0 1% +++ 5% + 10%

Dyreplankton biomasser samt græsningsstryk - tidsvægtede års gennemsnit

	Hjuldyr µg TV/l	Vandlopper µg TV/l	Dafnier µg TV/l	Total µg TV/l	Pot. græsningsstryk % af total	Fylo-bio Ic Fylo-bio < Fytoplanktonbiomasse µg C/l	%-små % -store	
1989	190	368	351	909	41.7	142.6	810.6	213.2
1990	99	104	375	578	22.9	60.6	1107.5	338.1
1991	156	221	242	618	24.3	93.6	1240.0	488.6
1992	46	447	172	665	8.7	32.2	2238.8	1060.1
1993	49	166	152	367	7.2	10.6	1346.7	845.8
1994	50	180	129	359	6.1	12.7	2125.8	1368.0
1995	68	167	343	578	44.4	73.4	1148.4	395.1
1996	65	108	55	228	17.7	21.9	1506.8	531.4
1997	25	109	73	207	8.4	12.0	686.8	425.7
1998	38	105	203	346	10.1	21.9	1066.0	513.9
1999	103	84	75	262	10.4	12.2	1278.4	1026.7
2000	46	134	109	290	12.5	32.5	753.3	331.4
2001	42	92	298	433	37.3	44.8	424.2	311.5
Gennemsnit 1989-2000	78	183	190	450	17.9	43.9	1.275.8	628.2

Udvikling:
Lineær regressionsanalyse

Signifikansniveau:
Symbol:

Udvikling:
Lineær regressionsanalyse

Signifikansniveau:
Symbol:

	Hjuldyr µg TV/l	Vandlopper µg TV/l	Dafnier µg TV/l	Total µg TV/l	Pot. græsningsstryk % af total	Fylo-bio Ic Fylo-bio < Fytoplanktonbiomasse µg C/l	%-små % -store	
Gennemsnit 1989-2000	78	183	190	450	17.9	43.9	1.275.8	628.2

	Hjuldyr µg TV/l	Vandlopper µg TV/l	Dafnier µg TV/l	Total µg TV/l	Pot. græsningsstryk % af total	Fylo-bio Ic Fylo-bio < Fytoplanktonbiomasse µg C/l	%-små % -store	
Gennemsnit 1989-2000	78	183	190	450	17.9	43.9	1.275.8	628.2

Udvikling:
Lineær regressionsanalyse

Signifikansniveau:
Symbol:

Dyreplankton biomasser samt græsningsstryk - tidsvægtede sommer gennemsnit

	Hjuldyr µg TV/l	Vandlopper µg TV/l	Dafnier µg TV/l	Total µg TV/l	Pot. græsningsstryk % af total	Fylo-bio Ic Fylo-bio < Fytoplanktonbiomasse µg C/l	%-små % -store	
1989	327	533	691	1551	53.2	225.7	1373.0	272.7
1990	193	213	674	1081	35.5	108.9	1638.5	385.2
1991	180	403	484	1067	33.9	152.9	1975.3	534.7
1992	84	558	357	999	9.0	58.8	3272.4	979.3
1993	110	254	351	715	12.1	18.9	2397.7	1356.5
1994	106	298	204	609	8.2	22.4	3219.8	1759.3
1995	94	277	386	756	24.8	81.7	2205.1	480.6
1996	73	181	357	19.6	29.5	2943.6	629.1	21.4
1997	52	187	193	392	12.5	21.0	1199.2	580.8
1998	75	216	453	744	14.7	39.9	2038.2	896.3
1999	154	157	140	451	9.1	12.7	2032.4	1502.9
2000	58	226	206	489	14.0	58.2	1364.1	422.6
2001	69	134	634	837	62.1	78.7	634.5	389.2
Gennemsnit 1989-2000	126	292	350	768	20.6	69.2	2.138.3	816.7

Udvikling:
Lineær regressionsanalyse





















Signifikansniveau:
Symbol:

Dyreplankton biomasser samt græsningsstryk - tidsvægtede års gennemsnit

	Hjuldyr µg TV/l	Vandlopper µg TV/l	Dafnier µg TV/l	Total µg TV/l	Pot. græsningsstryk % af total	Fylo-bio Ic Fylo-bio < Fytoplanktonbiomasse µg C/l	%-små % -store	
Gennemsnit 1989-2000	126	292	350	768	20.6	69.2	2.138.3	816.7

Udvikling:
Lineær regressionsanalyse

Signifikansniveau:
Symbol:



Bilag 10

Fiskeøkologisk Laboratorium

Fiskeynglen i Borup Sø

Juli 2001



Notat udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium november 2001
Konsulenter : Jens Peter Müller & Helle Jerl Jensen

0. Sammenfatning

Feltundersøgelsen

I forbindelse med Roskilde Amts overvågning af miljøtilstanden i Borup Sø blev fiskeynglen undersøgt i natten mellem d. 4.-5. juli 2001. Undersøgelsen, som ligeledes blev foretaget i 1998, 1999 og 2000, blev udført i overensstemmelse med anvisningen fra DMU med yngeltræk i 5 transekter i littoralen og 5 transekter i pelagiet af 1-2 minutters varighed.

Ynglens tæthed og sammensætning

Der blev konstateret yngel fra 4 arter; skalle, brasen, aborre og regnløje samt etårige regnløjer i fangsten.

Den samlede yngeltæthed (inklusive etårige) var 1,55 pr. m³ i littoralen og 6,45 pr. m³ i pelagiet, hvilket var lidt under tætheden i de foregående år. Vægtmæssigt var tætheden 0,45 g vådvægt pr. m³ i littoralen og 2,54 g pr. m³ i pelagiet. Skalleynglen var svagt antalsmæssigt dominerende i littoralen, mens skaller og abborrer optrådte i omrent samme tæthed i pelagiet. Vægtmæssigt var abborrer dominerende over hele søen.

Sammenlignet med 13 andre danske sører, hvor der er foretaget yngelundersøgelser de fire seneste år, var tætheden af karpefiskeyngel ligesom ved de foregående undersøgelser over middel, mens aborrefiskeynglens tæthed var meget stor, og større end ved de foregående undersøgelser i søen.

Størrelse

Skalleynglen var en smule under middelstørrelse, aborreynghlen var normal, mens de få brasener i fangsten var usædvanlig store på trods af en kold juni.

Årgangsstyrke

Der er generelt store variationer i årgangsstyrken hos de respektive arter, hvoraf især de sent gydende arter som bl.a. brasener er følsomme for klimatiske udsving forår og sommer. I 2001 var middeltætheden af karpefiskeyngel i 14 sører forholdsvis moderat, som i 2000, mens aborreynghlen generelt forekom mere talrigt end i 2000. I Borup Sø er skalleynglen blevet mere talrig end i de to foregående år, og aborreynghlens tæthed var rekordstor. Borup Sø følger således til en hvis grad det generelle mønster.

Fordeling

Ynglens fordeling i de undersøgte sører viste en forkærlighed hos karpefiskeynglen for de lavvandede områder, og kun i de uklare og lavvandede sører fandtes karpefiskeyngel i pelagiet. Aborrefiskeynglen var generelt mere pelagisk, dog med generelt aftagende mængder med øget dybde og sigtdybde. Fiskeynglens sammensætning i Borup Sø i juli 2001 med betydelige tæheder af både skalleyngel og aborreynghlen i pelagiet er således i overensstemmelse med sørens status som lavvandet og uklar.

Påvirkning af dyreplanktonet

Fiskeynglens beregnede konsumptionsrate (inklusive etårige regnløjer) omkring 1.juli var med godt 72 mg tv/m³/d større end ved de foregående undersøgelser og meget betydelig sammenlignet med referencesørerne. Med tanke på sørens mange småfisk udover årsynglen har fiskene antageligt ydet et betydeligt prædationstryk på sørens dyreplankton i sommeren 2001.


1. Baggrund og formål

I foråret 1997 vedtog Styringsgruppen for Ferskvand, at undersøgelser af fiskeyngel fra 1998 skal indgå i det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljøet (NOVA 2003).

Borup Sø er udvalgt som overvågningssø, og som følge heraf blev der i juli 2001 foretaget en undersøgelse af fiskeynglen. Formålet med undersøgelsen har været at belyse årsynglens mængde og sammensætning, for her igennem at vurdere fiskeynglens betydning for søens økologi over sommeren.

2. Materialer og metoder

Fiskeriet fandt sted natten mellem den 4.- 5. juli 2001 i tidsrummet kl.23.05 - 00.40, og blev udført som beskrevet i vejledningen for fiskeyngelundersøgelser i søer fra Danmarks Miljøundersøgelser /1/. Søen blev således inddelt i 5 sektioner, der hver især blev befisket med 1-2 minutter i et transekt i bredzonen og 1-2 minutter i et transekt i pelagiet (fig.1) med et standardyngelnet (hoopnet).



Figur 1. Kort over Borup Sø med angivelse af sektioner og placering af transekter.

Fiskeri med yngelnet

Det anvendte yngelnet var et standardnet som beskrevet i vejledningen, dvs. bestående af en 1 m lang cylindrisk del med en diameter på 40 cm og en maskestørrelse på 2 mm og en 1 m lang konisk del med en maskevidde på 1 mm monteret med en opsamlingsbeholder. Nettet var monteret med et kalibreret flowmeter placeret i nettets åbning.

Nettets centrum blev placeret 0,5 meter under overfladen og bevæget med en hastighed af omkring 1,5-2,5 m/s.

Registrering

Ved de enkelte træk blev starttidspunkt, sluttidspunkt og omdrejningstæller ved start og slutning registreret. Fangsten blev opsamlet i plastikglas og nedkølet til udsortering følgende dag.

Ved registreringen blev fiskene sorteret i arter og opmålt til nærmeste mm., og fangsten af de respektive arter blev for hver transekt vejet til nærmeste 1/10 g.

2.2 Beregninger

Tæthed

For hvert transekt er den gennemsnitlige fangst i antal og i vægt pr. m³ udregnet både for de enkelte arter og for hele årsynglen som fangsten divideret med den filtrerede vandmængde. Herefter er et gennemsnit for de respektive transekter i littoralzonen og i pelagiet med tilhørende varians udregnet. Ved evt. omregning til spritvægt er anvendt en omregningsfaktor på 0,8.

Gennemsnitsvægt

Tilsvarende er de enkelte arters gennemsnitsvægt (vådvægt) beregnet som et gennemsnit af gennemsnitsvægten fundet i de respektive transekter.

Vægtet gennemsnit

I diskussionsafsnittet er anvendt arealvægtede gennemsnit beregnet som middelværdien i de respektive områder ganget med områdets andel af søarealet. Littoralzonen er sat ud til 50 m fra kystlinien dog maksimalt 50 % af søarealet.

Daglig vækstrate

Middelvækstraten pr. dag er beregnet udfra middeltal for den målte længdetilvækst i perioden fra yngelundersøgelse til den efterfølgende fiskeundersøgelse efter normalprogrammet i en række sør (tab.1).

Tabel 1

Den gennemsnitlige målte daglige længdetilvækst (dL) og b fra længdevægtrelationen hos årsyngel og etårige af de respektive fiskearter i sør, hvor der efterfølgende en yngelundersøgelse er foretaget fiskeundersøgelse efter normalprogrammet.

mm/d	Antal sør	Gens.	Min	Max	b
Skalle 0+	11	0,385	0,216	0,570	3,114
Brasen 0+	4	0,456	0,320	0,579	3,292
Regnløje 0+	3	0,142	0,100	0,190	2,671
Rudskalle 0+	1	0,270	0,270	0,270	4,360
Aborre 0+	12	0,443	0,279	0,630	3,033
Sandart 0+	1	0,526	0,526	0,526	2,851
Skalle 1+	3	0,355	0,190	0,668	3,027
Regnløje 1+	2	0,131	0,110	0,152	3,717

Den daglige vækstrate omkring undersøgelsestidspunktet (G_t) er herefter beregnet som :

$$G_t = b \ln((L_t + dL)/(L_t))$$

hvor L_t er den målte middellængde ved undersøgelsen og dL og b er henholdsvis den gennemsnitlige længdetilvækst og b fra længdevægtrelatio-

nen.

Konsumptionsrate

Den daglige konsumptionsrate på prøvetidspunktet er beregnet i mg tv/m³/d som:

$$K = 1000 (G_t B_t)$$

hvor B_t er den beregnede arealvægtede biomassetæthed på prøvetagningstids punktet.

Årgangsstyrke

Årgangsstyrken hos de respektive arter er vurderet udfra undersøgelserne foretaget i perioden 1998-2001.

*Sammenlignings-
grundlag*

De beregnede værdier er så vidt muligt sammenholdt med tilsvarende størrelser fra 58 undersøgelser fra i alt 14 andre danske sører, hvor yngelundersøgelsesprogrammet har været anvendt i 1998, 1999, 2000 og 2001.

3. Resultater

3.1 Arealtæthed

Der er ved undersøgelsen konstateret årsyngel fra skalle, brasen, aborre og regnløje samt enårlige regnløjer. Den beregnede arealtæthed af de respektive arter i littoralen og i pelagiet og de respektive arters numeriske andel af årsynglen er givet i tabel 2, mens samme data fordelt på karpefisk (inklusive etårsfisk), aborrefisk, laksefisk og øvrige fisk er givet i tabel 3.

Tabel 2

Den beregnede tæthed af fiskeynglen hos de respektive arter i littoralzonen og i pelagiet i Borup Sø juli 2001.

Antal/m ³			Procent	
	Littoralen	Pelagiet	Littoralen	Pelagiet
Skalle 0+	0,858	3,099	55	48
Brasen 0+		0,037	0	1
Regnløje 0+	0,109	0,171	7	3
Regnløje 1+	0,027	0,037	2	1
Aborre 0+	0,558	3,111	36	48

Tabel 3

Den beregnede tæthed af fiskeynglen hos de respektive grupper i littoralzonen og i pelagiet i Borup Sø juli 2001.

Antal/m ³			Procent	
	Littoralen	Pelagiet	Littoralen	Pelagiet
Karpefisk	0,994	3,342	64	52
Aborrefisk	0,558	3,111	36	48
Laksefisk	0,000	0,000	0	0
Andre	0,000	0,000	0	0
Total	1,552	6,453	100	100

Fangsten af årsyngel var domineret af skaller og aborrer, hvoraf begge arter optrådte med klart største tæthed i pelagiet. Modsat i de foregående år var regnløjer kun sparsomt repræsenteret i fangsten. Karpefiskeynglen var dog svagt antalsmæssigt dominerende både i littoralen og på søens åbne områder.

Biomassetæthed

Biomassetæthed var domineret af aborrer både i littoralen og især i pelagiet, som følge af en betydelig middelvægt. Samlet udgjorde aborrefisk således 2/3 af ynglens biomasse i littoralen og knap 80 % i pelagiet (tab.4 og 5).

Tabel 4

Den beregnede biomassetæthed af fiskeynglen hos de respektive arter i littoralzonen og i pelagiet i Borup Sø juli 2001.


Vådvægt/m ³ (g)			Procent	
	Littoralen	Pelagiet	Littoralen	Pelagiet
Skalle 0+	0,121	0,470	27	19
Brasen 0+		0,021	0	1
Regnløje 0+	0,007	0,015	2	1
Regnløje 1+	0,025	0,028	5	1
Aborre 0+	0,299	2,004	66	79

Tabel 5

Den beregnede biomassetæthed af fiskeynglen hos de respektive grupper i littoralzonen og i pelagiet i Borup Sø juli 2001.


Vådvægt/m ³ (g)	Littoralen	Pelagiet	Procent Littoralen	Procent Pelagiet
Karpefisk	0,152	0,534	34	21
Aborre-fisk	0,299	2,004	66	79
Laksefisk	0,000	0,000	0	0
Andre	0,000	0,000	0	0
Total	0,452	2,538	100	100

Sammenlignet med andre sører, hvor der er foretaget undersøgelser af fiskeynglen, var karpefiskeynglens tæthed i juli 2001 beskeden i littoralen, men betydelig i pelagiet, og samlet var karpefiskeynglens tæthed omrent som i de foregående to år, men betydeligt under tætheden fundet i 1998 (fig.2).




Figur 2. Tætheden af karpefiskeyngel i Borup Sø i 1998-2001 i littoralzonen, pelagiet og i hele søen sammenlignet med tætheden fundet i andre danske sører.

Aborre-fiskeynglens tæthed var over medianen i littoralen og meget stor i pelagiet sammenlignet med de øvrige undersøgte sører, og samlet var aborrenglens tæthed blandt de mest betydelige (fig.3). Sammenlignet med de tidligere år var aborrenglens tæthed øget væsentligt ikke mindst i forhold til årene 1998 og 2000.




Figur 3. Tæthedens af aborrefiskeyngel i Borup Sø i 1998-2001 i littoralzonen, pelagiet og i hele søen sammenlignet med tæthedens fundet i andre danske sører.

Den samlede tæthed af fiskeyngel har generelt været aftagende i littoralen siden 1998, men stigende i pelagiet siden 1999. Middeltæthedens af fiskeyngel i søen var større end i de foregående to år, og mindre end i 1998, men stadig meget betydelig sammenlignet med tæthedens fundet i de fleste af de øvrige sører (fig.4).



Figur 4. Tæthedens af fiskeyngel i Borup Sø i littoralzonen, pelagiet og i hele søen i 1998-2001 sammenlignet med tæthedens fundet i andre danske sører.


Den samlede biomassetæthed var ligesom i 1999 meget betydelig sammenlignet med referencesørerne, og væsentligt større end i 2000 (fig.5).



Figur 5. Biomassetæthedens af fiskeyngel i Borup Sø i 1998-2001 i littoralzonen, pelagiet og i hele søen sammenlignet med tætheden fundet i andre danske søer.

Størrelsesfordeling

Størrelsesfordelingen af fangsten af skalle, aborre og brasen fremgår af figur 6. Middelvægten hos skalleårsynglen var forholdsvis beskeden for tidspunktet, hvilket dog har været tilfældet i flere af årets undersøgelser, hvor en kold juni måned har bevirket en langsom opvækst i de fleste undersøgte søer. Aborrernes middelvægt var som forventet, mens de forholdsvis få brasener i fangsten var usædvanligt store i forhold til middelvægten fundet hos ynglen på samme tidspunkt i de øvrige undersøgte søer (fig.7).




Figur 6. Længdefordelingen af de respektive arter i fangsten i Borup Sø juli 2001.

Hos skalle er der en tydelig forøgelse af middelvægten gennem juli måned i de respektive søer, hvilket kun i mindre omfang kan konstateres hos aborreynghen og brasenynghen. Der må dog forventes en meget stor spredning i ynglens størrelse på et givent tidspunkt i de respektive søer, på grund af morfometriske forskelle, som bl.a. påvirker gydetidspunkt og

tilvækst som følge af den meget forskellige hastighed hvormed opvarmningen af sørvet foregår gennem forsommeren.


Middelvægt



Figur 7. Middelvægten af skalle-, aborre- og brasenynglen på undersøgelsesidspunktet i Borup Sø juli 2001 (stjerne) sammenlignet med årets øvrige undersøgelser (sort markering) og tidligere undersøgte danske søer.

4. Vurderinger

Selvom søers fiskebestande oftest udviser variationer som kan relateres til søernes morfologi og næringsniveau, er forholdene vedrørende årsynglen mere komplekse. Der vil således i alle sør og hos de fleste arter forekomme meget betydelige år til år variationer i ynglens mængde, idet de klimatiske forhold om foråret og gennem sommeren påvirker henholdsvis gydetidspunkt og vækst og overlevelse hos den spæde yngel. Dette fremgår tydeligt af figur 8, som viser procentafvigelsen fra gennemsnittet af årgangsstyrken hos abborer, brasen og skalle i perioden 1989-98, vurderet udfra fangsten af etårige- og ældre fisk ved fiskeundersøgelser efter normalprogrammet, og i årene 1999- 2001 vurderet udfra yngelundersøgelserne.




Figur 8. Den gennemsnitlige årgangsstyrke i en række danske sør målt som afvigelse fra middel i perioden 1989-2001 hos aborre, brasen og skalle samt middeltemperaturens afvigelse fra normalen i april-maj og i juni-juli i samme periode /2/.

Som figuren viser er der især hos brasener en negativ sammenhæng mellem et varmt forår efterfulgt af en kold sommer og årgangsstyrken i de respektive år. Generelt er der især hos de relativt sent gydende arter herunder brasen, rudskalle, suder og karusse ofte meget store variationer i ynglens mængde i sensommeren, antageligt bl.a. på grund af afhængigheden af en korrekt timing mellem ynglens fremkomst og et rimeligt fødegrundlag. Dette synes især at være gældende i klarvandede sør, hvor årsynglen ligeledes er utsat for rov fra abborer, og hvor svigende rekruttering er regelen mere end undtagelsen hos de nævnte arter.

I perioden 1998-2000 var foråret forholdsvis varmt, men kun i 1999 var sommeren tilsvarende varm, hvilket antageligt kan forklare den ringe gennemsnitlige rekruttering hos brasener i årene 1998 og 2000 og den gode rekruttering i 1999. I 2001 var forårstemperaturen normal, mens hovedparten af juni måned var kold, men sidst i juni og først i juli var vejret sommerligt. Samlet har temperaturen indtil undersøgelsestidspunktet været tæt på normalen, og middelrekrutteringen hos brasener og abborer har tilsyneladende været tilsvarende tæt på normalen. Skallernes rekrutteringsmønster har været noget afvigende i de senere år med ringeste middelrekruttering i 1999, mens 1998 og 2000 har været normale eller gode rekrutteringsår, og skallernes rekruttering i 2001 har generelt har været over normalen.


Sammenlignes tætheden af fiskeyngel i 14 undersøgte sør i årene 1998-2001 ses i de lavvandede sør en stor middeltæthed af karpefisk i 1998 og i 1999 og en mindre tæthed i 2000 og 2001, mens tætheden af aborrefisk var lav i 2000 og forholdsvis ens i de øvrige år (fig.9). I de dybe sør har karpefiskeynglens rekruttering derimod været ringest i 1999 og 2001, og hos aborrefiskene har rekrutteringen kun været god i 1999.



Figur 9. Fiskeynglens gennemsnitlige tæthed i 8 lavvandede (< 3 m) og 7 dybere (> 3 m) sør i 1998-2001.

Med en betydelig rekruttering hos karpefiskene i de seneste fire år, men dog klart størst i 1998 og med en god rekruttering i 1999 og i 2001 hos aborrefiskene følger Borup Sø i rimelig grad mønsteret fra de øvrige lavvandede sør.


I Borup Sø er der kun registreret små mængder brasen yngel ved yngelundersøgelsene siden 1998, men de løbende fiskeundersøgelser i sensommeren har dog vist, at i hvert fald 1998 og 1999 generationen var betydelig. Skalleynglens tæthed har været betydelig i 1998 og 2001 og meget beskedent i 1999 og 2000 (fig.10). Borup Sø har været karakteriseret ved en stor tæthed af regnløjer i perioden 1998-2000 som i 2001 næsten var væk, og abborerne har kun haft succes i 1999 og i 2001.




Figur 10. Fiskeynglens tæthed i Borup Sø 1998-2001.

ynglen i stigende grad foretrækker bredzonen med øget sigtdybde i de undersøgte søer. Hos aborrenglen, som generelt er mere pelagisk, ses dette mønster ikke (fig.11). Generelt var der dog meget lidt fiskeyngel i pelagiet i søer med sigtdybder større end 2 m.

Middeldybden synes ligeledes at påvirke fiskeynglens mængde i bredzonen og i pelagiet. Således aftager mængden af karpefiskeyngel i pelagiet voldsomt med øget middeldybde i de undersøgte søer, hvorimod karpefiskeglens mængde i littoralen kun aftog mere moderat med dybden (fig.12). Hos aborrefiskene var der ingen væsentlig forskydning mellem pelagiet og bredzonen ved øget middeldybde.



Figur 11. Fiskeynglens arealtæthed i littoralen og i pelagiet i søer med forskellig sigtdybde.



Figur 12. Fiskeynglens arealtæthed i littoralen og i pelagiet i søer med forskellig middeldybde.

Det generelle billede er således, at karpefiskeyngel er tæt knyttet til de lavvandede områder i juli måned, og kun i de uklare, lavvandede søer findes karpefiskeynglen i pelagiet i nævneværdigt omfang. Aborrefiskeynglen har ikke samme præference for bredzonen, men tætheden aftager dog tilsyneladende generelt med øget sigtdybde.

Fiskeynglens fordeling i juli 2001 i Borup Sø passer godt ind i det generelle billede i en lavvandet uklar sø med en stor tæthed af både karpefisk og aborrer i pelagiet.


Påvirkning af dyreplankton

Fiskeynglens potentielle påvirkning af dyreplanktonet afhænger af såvel ynglens daglige fødebehov, som igen afhænger af deres specifikke vækstrate og af udnyttelsen af føden, og af dyreplanktonets produktivitet.

Vækstraten hos fiskeyngel aftager generelt med størrelsen, hvorimod længdetilvæksten pr. tidsenhed tilnærmelsesvis er konstant, såfremt forholdene ikke ændres væsentligt. Af samme grund er der ved beregningen af ynglens specifikke vækstrater taget udgangspunkt i en konstant længdetilvækst i perioden fra yngelundersøgelserne til fiskeundersøgelserne i sensommeren. Vækstforholdene er dog kraftigt afhængig af både fødeudbud og vandtemperatur, hvoraf sidstnævnte forhold ligeført påvirker fødens udnyttelsesgrad.


Endelig er fiskeynglens potentielle påvirkning af dyreplanktonet ikke synonymt med fiskebestandens påvirkning af samme, da etårige- og ældre fisk ofte yder et meget betydeligt prædationstryk på dyreplanktonet.

I figur 13 er vist fiskeynglens (inklusive etårige regnløjer) skønnede daglige konsumption i de undersøgte søer. I Borup Sø var karpefiskeynglens samlede prædationstryk i juli 2001 knap 17 mg tv/m³/d, hvilket, som i de foregående år var betydeligt over medianen blandt de undersøgte søer. Aborrefiskeynglens beregnede prædationstryk var med godt 55 mg tv/m³/d tredjehøjst blandt referencesøerne og betydeligt over niveauet fra de foregående år. Totalt var yngelprædationen med 72 mg tv/m³/d meget højt og væsentligt over niveauet i de foregående år.



Figur 13. Fiskeynglens konsumptionsrate i Borup Sø 1998-2001 sammenlignet med konsumptionsraten fundet i andre danske søer.

Fiskeynglens skønnede konsumptionsrate er forskellig i de forskellige søtyper (fig.14). I de uklare søer er både karpefiskenes og aborrefiskenes konsumption størst, hvilket antageligt hænger sammen med en større produktion af dyreplankton, og fiskeynglens konsumption falder i søer med middeldybde større end 2 m. I de næringsbegrænsede søer (tot-P sommerringensnit < 100 µg/l) er fiskeynglens konsumption normalt beskeden.



Figur 14. Fiskeynglens konsumptionsrate i littoralen og i pelagiet i søer med forskellig sigtdybde, middeldybde og tot-P koncentration over sommeren (1/5-30/9).

Med Borup Sø's aktuelle status som en lavvandet, uklar og middelnæringsrig sø er konsumptionsrater hos fiskeynglen mellem 15-50 mg tv/m³/d forventeligt, og prædationstrykket var i 1998-2000 i dette niveau, mens dette års meget høje prædationstryk på 72 tv/m³/d var større end forventet.

Ved yngelundersøgelserne registreres ikke ældre fisk, og Borup Sø har ved de senere års undersøgelser i alle årene rummet mange etårige- og ældre fisk. Det samlede prædationstryk på dyreplanktonet må derfor antages at være væsentligt større end ynglens prædation.

Der forligger endnu ikke tal for dyreplanktonet i 2001, men i de seneste år har dyreplanktonets sommernemsnitlige biomasse varieret omkring mellem 400-800 mg tv/m³, hvilket svarer til en maksimal daglig middelproduktion på 80-160 mg tv/m³/d ved en turn-over på 5 dage.

Selvom fiskeynglens prædation alene måske ikke har været begrænsende for dyreplanktonbiomassen i starten af juli 2001, må fiskenes samlede prædationstryk på dyreplanktonet antages at have været meget betydelig i sommeren 2001.

5. Referencer

- 1/ Lauridsen T.L. (1998). Fiskeyngelundersøgelser i søer.
- Danmarks Miljøundersøgelser. Teknisk anvisning fra DMU.
- 2/ Fiskeøkologisk Laboratorium (1998). Recruitment, growth and mortality of Bream (*Abramis brama L.*) in danish lakes. (in prep.)
- 3/ Fiskeøkologisk Laboratorium (1998). Fiskeynglen i Borup Sø juli 1998.
- Notat til Roskilde Amt.
- 5/ Fiskeøkologisk Laboratorium (1998). Fiskeynglen i Gundsømagle Sø juli 1998.
- Notat til Roskilde Amt.
- 6/ Fiskeøkologisk Laboratorium (1998). Fiskeynglen i Magle Sø juli 1998.
- Notat til Vestsjællands Amt.
- 7/ Fiskeøkologisk Laboratorium (1998). Fiskeynglen i Tystrup Sø juli 1998.
- Notat til Vestsjællands Amt.
- 8/ Fiskeøkologisk Laboratorium (1998). Fiskeynglen i Tissø juli 1998.
- Notat til Vestsjællands Amt.
- 9/ Fiskeøkologisk Laboratorium (1998). Fiskeynglen i Bastrup Sø juli 1998.
- Notat til Frederiksborg Amt.
- 10/ Fiskeøkologisk Laboratorium (1998). Fiskeynglen i Arresø juli 1998.
- Notat til Frederiksborg Amt.
- 11/ Fiskeøkologisk Laboratorium (1998). Bestemmelser af fiskeynglen i Furesø's dybe bassin og i Store Kalv og i Bagsværd Sø juli 1998.
- Notat til Københavns Amt.
- 12/ Fiskeøkologisk Laboratorium (1998). Fiskeynglen i St. Søgård Sø juli 1998.
- Notat til Sønderjyllands Amt.
- 13/ Fiskeøkologisk Laboratorium (1998). Fiskeynglen i Ketting Nor juli 1998.
- Notat til Sønderjyllands Amt.
- 14/ Fiskeøkologisk Laboratorium (1999). Fiskeynglen i Gundsømagle Sø juli 1999.
- Notat til Roskilde Amt.
- 15/ Fiskeøkologisk Laboratorium (1999). Fiskeynglen i Magle Sø juli 1999.
- Notat til Vestsjællands Amt.
- 16/ Fiskeøkologisk Laboratorium (1999). Fiskeynglen i Tystrup Sø juli 1999.
- Notat til Vestsjællands Amt.
- 17/ Fiskeøkologisk Laboratorium (1999). Fiskeynglen i Tissø juli 1999.
- Notat til Vestsjællands Amt.
- 18/ Fiskeøkologisk Laboratorium (1999). Fiskeynglen i Bastrup Sø juli 1999.
- Notat til Frederiksborg Amt.
- 19/ Fiskeøkologisk Laboratorium (1999). Fiskeynglen i Arresø juli 1999.
- Notat til Frederiksborg Amt.

- 20/ Fiskeøkologisk Laboratorium (1999). Bestemmelser af fiskeynglen i Furesø's dybe bassin og i Store Kalv og i Bagsværd Sø juli 1999.
- Notat til Københavns Amt.
- 21/ Fiskeøkologisk Laboratorium (1999). Fiskeynglen i St. Søgård Sø juli 1999.
- Notat til Sønderjyllands Amt.
- 22/ Vejle Amt (1999). Data vedrørende fiskeyngel i Søgård Sø juli 1999.
- Tilsendt materiale.
- 23/ Fyns Amt (1999). Data vedrørende fiskeyngel i Arreskov Sø og Søgård Sø juli 1999.
- Tilsendt materiale.
- 24/ Fiskeøkologisk Laboratorium (2000). Fiskeynglen i Borup Sø juli 2000.
- Notat til Roskilde Amt.
- 25/ Fiskeøkologisk Laboratorium (2000). Fiskeynglen i Gundsømagle Sø juli 2000.
- Notat til Roskilde Amt.
- 26/ Fiskeøkologisk Laboratorium (2000). Fiskeynglen i Magle Sø juli 2000.
- Notat til Vestsjællands Amt.
- 27/ Fiskeøkologisk Laboratorium (2000). Fiskeynglen i Tystrup Sø juli 2000.
- Notat til Vestsjællands Amt.
- 28/ Fiskeøkologisk Laboratorium (2000). Fiskeynglen i Tissø juli 2000.
- Notat til Vestsjællands Amt.
- 29/ Fiskeøkologisk Laboratorium (2000). Fiskeynglen i Bastrup Sø juli 2000.
- Notat til Frederiksborg Amt.
- 30/ Fiskeøkologisk Laboratorium (2000). Fiskeynglen i Arresø juli 2000.
- Notat til Frederiksborg Amt.
- 31/ Fiskeøkologisk Laboratorium (2000). Fiskeynglen i Furesø's dybe bassin og i Store Kalv juli 2000.
- Notat til Københavns Amt.
- 32/ Fiskeøkologisk Laboratorium (2000). Fiskeynglen i Bagsværd Sø juli 2000.
- Notat til Københavns Amt.
- 33/ Fiskeøkologisk Laboratorium (2000). Fiskeynglen i St. Søgård Sø juli 2000.
- Notat til Sønderjyllands Amt.
- 34/ Vejle Amt (2000). Fiskeynglen i Søgård Sø juli 2000.
- Notat til Vejle Amt
- 35/ Fiskeøkologisk Laboratorium (2000). Fiskeynglen i Bagsværd Sø juli 2001.
- Notat til Københavns Amt.
- 36/ Fiskeøkologisk Laboratorium (2000). Fiskeynglen i Gundsømagle Sø juli 2001.
- Notat til Roskilde Amt.
- 37/ Fiskeøkologisk Laboratorium (2000). Fiskeynglen i Magle Sø juli 2001.
- Notat til Vestsjællands Amt.
- 38/ Fiskeøkologisk Laboratorium (2000). Fiskeynglen i Tystrup Sø juli 2001.
- Notat til Vestsjællands Amt.

39/ Fiskeøkologisk Laboratorium (2000). Fiskeynglen i Tissø juli 2001.
- Notat til Vestsjællands Amt.

40/ Fiskeøkologisk Laboratorium (2000). Fiskeynglen i Bastrup Sø juli 2001.
- Notat til Frederiksborg Amt.

41/ Fiskeøkologisk Laboratorium (2000). Fiskeynglen i Arresø juli 2001.
- Notat til Frederiksborg Amt.

42/ Fiskeøkologisk Laboratorium (2000). Fiskeynglen i Furesø's dybe bassin og i
Store Kalv juli 2001.
- Notat til Københavns Amt.

43/ Vejle Amt (2000). Fiskeynglen i Søgård Sø juli 2001.
- Notat til Vejle Amt

Bilag 11

Beregnehede CPUE-værdier for fiskebestanden i 2001 med tilhørende 95% konfidensgrænser samt de gennemsnitlige garnfangster i littoralzonen og på det åbne vand.

Tabel 2a

Beregnehede CPUE-værdier i antal for fisk < 10 cm ved garn- og elfiskeriet i Borup Sø 2001 med angivelse af 95% konfidensgrænser.

Antal < 10 cm	Garn	Min.	Max.	El	Min.	Max.
SKALLE	19,8	6,4	61,7	44,0	2,2	889,4
ABORRE	112,8	37,2	342,0	27,6	9,8	77,8
BRASEN	1,9	0,7	4,9	0,0	0,0	0,0
HORK	0,3	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
REGNLØJE	24,8	10,5	58,4	44,4	3,7	535,9
RUDSKALLE	0,1	0,1	0,1	0,8	0,4	1,7
GEDDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BRxSK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUDER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUM	159,7	56,1	454,1	116,8	20,4	668,6

Tabel 2b

Beregnehede CPUE-værdier i antal for fisk > 10 cm ved garn- og elfiskeriet i Borup Sø 2001 med angivelse af 95% konfidensgrænser.

Antal > 10 cm	Garn	Min.	Max.	El	Min.	Max.
SKALLE	18,7	12,0	29,3	0,2	0,1	0,3
ABORRE	45,8	22,1	94,9	23,2	10,8	49,7
BRASEN	4,9	2,8	8,8	0,0	0,0	0,0
HORK	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
REGNLØJE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RUDSKALLE	2,5	1,1	6,0	0,8	0,4	1,7
GEDDE	0,5	0,5	0,6	1,0	0,4	2,4
BRxSK	0,5	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0
ÅL	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3
SUDER	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
SUM	73,3	41,6	129,4	25,4	12,4	52,2

Tabel 2c

Beregnehede CPUE-værdier i vægt for fisk < 10 cm ved garn- og elfiskeriet i Borup Sø 2001 med angivelse af 95% konfidensgrænser.

Vægt < 10 cm (g)	Garn	Min.	Max.	El	Min.	Max.
SKALLE	174	55	557	25	2	355
ABORRE	375	128	1101	80	26	246
BRASEN	5	1	20	0	0	0
HORK	2	1	5	0	0	0
REGNLØJE	53	21	134	50	4	688
RUDSKALLE	0	0	1	4	1	23
GEDDE	0	0	0	0	0	0
BRxSK	0	0	0	0	0	0
ÅL	0	0	0	0	0	0
SUDER	0	0	0	0	0	0
SUM	609	212	1753	159	41	620

Tabel 2d

Beregnehede CPUE-værdier i vægt for fisk > 10 cm ved garn- og elfiskeriet i Borup Sø 2001 med angivelse af 95% konfidensgrænser.

Vægt > 10 cm (g)	Garn	Min.	Max.	El	Min.	Max.
SKALLE	1230	700	2160	23	2	316
ABORRE	1808	767	4262	704	310	1597
BRASEN	1702	1094	2647	0	0	0
HORK	5	1	35	0	0	0
REGNLØJE	0	0	0	0	0	0
RUDSKALLE	273	11	6926	84	2	2998
GEDDE	278	95	815	956	9	101001
BRxSK	87	6	1189	0	0	0
ÅL	0	0	0	15	1	159
SUDER	88	3	2577	0	0	0
SUM	5471	3491	8573	1781	457	6942

Bilag 12

Tungmetaller Borup Sø - 2001

	13.06	26.06	10.07	23.07	21.08	18.09
Tørstof, suspenderet stof (mg/l)	8,3	11,6	19	11	13	9,7
Glødetab af susp. stof (mg/l)	4,3	6,7	15	8,2	7,6	5,3

Tungmetaller	13.06	26.06	10.07	23.07	21.08	18.09
Arsen (As)	0,3	0,62	0,5	0,7	1,4	1
Bly (Pb)	0,4	0,3	0,7	0,4	0,6	0,2
Cadmium (Cd)	<0,01	0,01	<0,004	0,015	<0,01	<0,01
Chrom (Cr)	0,3	0,2	0,27	0,16	0,1	0,3
Kobber (Cu)	0,7	0,9	0,4	0,4	0,3	0,7
Kviksølv (Hg)		0,01	0,0017	0,0007	<0,0005	<0,0005
Nikkel (Ni)	<0,6	1	0,6	0,6	1,2	1
Zink (Zn)	<1	<1	2	2	1,8	<3

Tungmetaller, filtrerede	13.06	26.06	10.07	23.07	21.08	18.09
Arsen, filt	0,29		0,46	0,66	0,8	0,25
Bly, filt	0,5		0,43	0,27	0,1	0,28
Cadmium, filt	0,02		0,01	0,005	<0,004	<0,004
Chrom, filt	0,1		0,09	0,05	0,07	0,08
Kobber, filt	0,31		0,15	0,28	0,3	0,5
Nikkel, filt	0,9		0,5	0,6	0,5	0,43
Zink, filt	<1					4

Miljøfremmede stoffer Borup Sø - 2001

Bilag 13

Oversigt over udførte undersøgelser i Borup Sø i overvågningsperioden


	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Vandkemi i sø	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vandkemi i tilløb	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vandkemi i afløb	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Planteplankton	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dyreplankton	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fiskeundersøgelse*			x			x	x	x	x	x	x	x	x
Bundfauna og littoralfauna	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x
Sediment		x						x	x				
Miljøfremmede stoffer									x		x	x	x
Fiskeyngelundersøgelse									x	x	x	x	x

* Fiskeundersøgelse efter det standardiserede program gennemført 1. gang i 1988. Fiskeundersøgelsene i 1996-99 samt 2001 er udført efter et reduceret normalprogram i forbindelse med biomanipulationsprojekt.

Oversigt over udførte undersøgelser i Borup Sø før 1989

- 1973: Vandkemi (1 vandprøve udtaget 11. september)
- 1980: Vandkemi (1 vandprøve udtaget 16. juni)
Bundfauna
Floraliste (planter langs bredden)
- 1983: Vandkemi i tilløb og afløb (x 12) samt sø (x 11); stofbalanceberegnning
Bundfauna
Planteplankton
Floraliste (planter langs bredden)
Fugle
- 1988: Vandkemi i tilløb og afløb (x 16) samt sø (x 13); stofbalanceberegnning
Fiskeundersøgelse (standardiseret program)

Undesøgelserne i perioden 1973-83 er rapporteret i "Forundersøgelser af de mindre søer i Roskilde Amtskommune" (Roskilde Amt, 1984). Undersøgelserne i 1988 (samt 1983) er rapporteret i Overvågningsrapporterne vedrørende Borup Sø.



Roskilde Amt . Køgevej 80 . 4000 Roskilde . Tlf. 46 32 32 32