

**Roskilde Amt**

**Maj 2004**

---

**VANDMILJØovervågning**

**Gundsømagle Sø**

**1989-2003**

**Titel:** VANDMILJØovervågning. Gundsømagle Sø 1989-2003

**Udarbejdet af:** Roskilde Amt, Teknisk Forvaltning

**Tekst og figurer:** Per Helmgaard

**Kortmateriale:** Udsnit af kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med copyright Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/KD.86.1035.

**Tryk:** 1. oplag

**ISBN:** 87-7800-606-6

**Købes hos:** Roskilde Amt, Biblioteket, Køgevej 80, 4000 Roskilde, tlf.: 46 30 35 09

**Pris:** 50 kr.

**Internet:** Rapporten kan også læses på [www.ra.dk](http://www.ra.dk).

# **Indholdsfortegnelse**

- 1. Sammenfatning 5**
- 2. Indledning 8**
- 3. Klimatiske forhold 9**
- 4. Sø- og oplandsbeskrivelse samt målsætning 11**
- 5. Søtilløb - vandføring og stofkoncentrationer 13**
  - 5.1 Vandføring 13
  - 5.2 Fosfor 13
  - 5.3 Kvælstof 14
- 6. Vandbalance 15**
- 7. Stofbalance 17**
  - 7.1 Fosfor 17
  - 7.2 Kvælstof 18
  - 7.3 Jern 20
- 8. Fysisk-kemiske målinger i søen 21**
  - 8.1 Næringsstoffer 21
  - 8.2 Øvrige målinger i svovandet 24
- 9. Biologiske målinger i søen 26**
  - 9.1 Plantoplankton 26
  - 9.2 Dyreplankton 27
  - 9.3 Fiskebestand 29
  - 9.4 Samspillet mellem stofkoncentrationer, plankton og fiskebestand 30
- 10. Konklusion 31**
- 11. Referencer 32**
- 12. Bilagsfortegnelse 33**

## Forord

I 1987 vedtog Folketinget Vandmiljøplanen, hvis formål er at reducere udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet. For at kunne følge effekterne af de reguleringer og investeringer, som er gennemført i forbindelse med Vandmiljøplanen, blev der i efteråret 1988 iværksat et intensivt overvågningsprogram af grundvand, spildevand, overfladevand og atmosfæren.

Som en del af dette program blev 37 sører udpeget som overvåningssøer. Søerne blev udvalgt således, at de er repræsentative for de øvrige danske sører. I Roskilde Amt er udvalgt to overvåningssøer, Gundsømagle Sø og Borup Sø. Antallet af overvåningssøer er senere reduceret til 31.

Ved revisionen af overvågningsprogrammet i 1998 ændredes overvågningen fra specifikt at være rettet mod at opgøre effekterne af de reduktionsmål, der bl.a. blev opstillet i Vandmiljøplanen, til at omfatte vandmiljøets tilstand i en bredere forstand. Eksempelvis er overvågningen af tungmetaller og miljøfremmede stoffer nu integreret i overvågningsprogrammet. Samtidig ændrede overvågningsprogrammet navn fra "Vandmiljøplanens Overvågningsprogram" til "Nationalt Program for Overvågning af Vandmiljøet 1998-2003", i daglig tale blot NOVA-2003. Hele NOVA 2003 overvågningsprogrammet er beskrevet i /1/.

Fra 1. januar 2004 er NOVA overvågningsprogrammet afløst af NOVANA overvågningsprogrammet, der er tilpasset de forpligtigelser, der er stillet i Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet. NOVANA overvågningsprogrammet er beskrevet i /2/.

Det nye overvågningsprogram for sører adskiller sig væsentligt fra det foregående. Antallet af intensivt overvågede sører er reduceret til 23, mens et stort antal sører/vandhuller nu skal overvåges mere ekstensivt.

Gundsømagle Sø fortsætter også i det nye program som en intensivt overvåget sø, mens Borup Sø fra og med 1. januar 2004 er overgået fra at være én af de intensivt undersøgte sører til en udpegning som en ekstensivt undersøgt sø. Det betyder, at Borup Sø fremover kun vil blive undersøgt hvert tredje år efter et reduceret undersøgelsesprogram.

Som regionale myndigheder er det amternes opgave at føre tilsynet med overvåningssøerne. Amterne behandler de indsamlede data og udgiver årligt rapporter om tilstanden og udviklingen i de enkelte overvågningssøer.

De indsamlede data overføres endvidere til DMU, der på baggrund af disse data og amternes rapporter sammenfatter resultaterne fra alle sørerne i en årlig statusrapport.

# 1. Sammenfatning

Med en gennemsnitstemperatur lokalt på 8,4 °C var 2003 noget over normalen på 7,9 °C. Især juli og august var varmere end normalt, men også i årets to sidste måneder var middeltemperaturen højere end normalt.

Nedbørsmæssigt faldt der lokalt 532 mm regn mod normalens 586 mm. Især februar og marts var usædvanlig nedbørsfattige, men faktisk var nedbøren fra oktober og året ud markant under normalen. Omvendt var januar, april-maj og september ganske regnfulde.

Trods et relativt tørt år var vandtilførslen på 7,5 mill. m<sup>3</sup> tæt på gennemsnittet for 1989-2002.

Vandets opholdstid var på årsbasis i gennemsnit 19 dage hvilket svarer til gennemsnittet for perioden 1989-2002. I sommerperioden var middelopholdstiden i søen 64 dage, hvilket er i niveau med medianen for 1989-2002.

Fosfortilførslen var med knap 1,4 ton væsentlig mindre end i 2002, men i niveau med tilførslen i 1998-2001.

Fosfortilførslen er i dag langt mindre end i starten af overvågningsperioden, hvor fosfortilførslen lå omkring 8-12 ton. Årsagen til det meget store fald i fosfortilførslen er en kraftig reduktion i fosforudledningen fra punktkilder i oplandet. Som følge af en centralisering af spildevandsrensningen i oplandet, er Kallerup Renseanlæg nu det eneste tilbageværende renseanlæg i oplandet til søen. Renseanlægget er i perioden ombygget og fungerer nu med udvidet biologisk rensning samt rensning for såvel fosfor som kvælstof.

Til og med 1991 tilbageholdte søen anselige fosformængder hvert år, men efter den kraftige reduktion i fosfortilførslen i 1992, har fraførslen typisk været større end tilførslen. Der har imidlertid været en klart aftagende tendens i nettoraførslen og i 2001 tilbageholdte søen igen fosfor. Dette var også tilfældet i 2003, hvor søen tilbageholdte knap 100 kg fosfor.

Kvælstoftilførslen var med 39 ton langt under gennemsnittet for 1989-2002 på 62 ton. Kvælstoftilførslen har varieret meget fra år til år og der kan derfor ikke påvises en reduktion i kvælstoftilførslen til søen. Der er dog sket et markant fald i kvælstofkoncentrationen i indløbet i overvågningsperioden.

Både års- og sommermiddelkoncentrationen af totalfosfor i svovandet har været signifikant faldende i perioden 1989-2003. I 2003 steg årsmidlen imidlertid for første gang siden 1989 og var med 0,267

mg P/l derfor lidt højere end i 2002. Sammenlignet med årsmidlen i 1989 er der dog tale om et fald i års middelkoncentrationen på omkring 85%. Sommermiddelkoncentrationen udviser ikke helt samme markante fald som følge af den årligt tilbagevendende fosforfravigelse fra sedimentet i sommerperioden, men er dog faldet fra 1,314 mg P/l i 1989 til 0,378 mg P/l i 2003. Årsagen til det faldende fosforniveau i søen er den kraftige reduktion i fosfortilførslen, men efterfølgende har fosforfravigelsen fra sedimentet fået større og større betydning for svovandets indhold af fosfor i sommerperioden.

Års middelkoncentrationen af kvælstof i svovandet i 2003 var med 3,32 mg N/l overvågningsperiodens hidtil laveste. Sommermiddelkoncentrationen af kvælstof var med 3,12 mg N/l lidt højere end i 2002, men i niveau med de foregående fire år.

Som det har været tilfældet i samtlige overvågningsår var sommermiddelsigtdybden også i 2003 med 0,44 m meget ringe. Den faldende svovdkoncentration af fosfor har således endnu ikke ført til en markant forbedring af sigtdybden.

Årets sommermiddelbiomasse af planteplankton var med 30,7 mm<sup>3</sup>/l i niveau med middelbiomassen i de foregående par år.

I takt med at næringsstoftilførslen til søen er blevet reduceret er søens algesamfund som forventet gået fra grønalge- til blågrønalgedominans. Også i 2003 dominerede blågrønalgerne i søen.

Sommermiddelbiomassen af dyreplankton var med 821 µg tv/l lidt større end i 2002, men stadig overvågningsperiodens anden laveste.

De senere års lave dyreplanktonbiomasser sammenlignet med biomasserne i starten af 1990'erne skyldes primært en kraftig nedgang i dafniebiomassen, antagelig først og fremmest som følge af blågrønalgernes fremgang i søen.

Den kortvarige stigning i dafniernes forekomst der kunne iagttares i 1999 faldt således sammen med dette års mindre forekomst af blågrønalger. Gennem overvågningsperioden har der været en signifikant negativ sammenhæng mellem blågrønalgerne og dafniernes forekomst i søen.

Tætheden af fiskeyngel har siden 1998 generelt været stigende og fiskeynglen er i teorien i stand til at lægge et betydeligt prædationstryk på dyreplanktonet.

Fiskeynglens beregnede konsumptionsrate (inklusive etårige fisk) omkring 1. juli var med 41 mg

tv/m<sup>3</sup>/d i niveau med konsumptionsraten i 2002 og dermed lidt mindre end i de foregående par år.

Søens samlede fiskebestand er ikke undersøgt i 2003, men en fiskeundersøgelse i 2001 viste bl.a., at rørsumpsfiskenes rekruttering har været ringe de senere år. Dette i kombination med søens store geddebestand, der til en vis grad er i stand til at holde mængden af fredfisk nede i søen, har antagelig medført et formindsket prædationstryk på dyreplanktonet fra de større fisk's side i de senere år.

Selv om fiskebestanden samlet set påvirker dyreplanktonet gennem et betydeligt prædationstryk, er fiskebestanden næppe hovedansvarlig for nedgangen i dyreplanktonets mængde gennem årene, der snarere skyldes skiftet fra grønalgedominans til blågrønalgedominans.

Før sværvandsfosforkoncentration yderligere reduceres markant vil søens planterplankton være domineret af blågrønalger, og vandets sigtbarhed vil ikke forbedres væsentligt.

Den afgørende betingelse for, at søen kan komme ned på et lavere fosforniveau afhænger alene af indløbskoncentrationen af fosfor i søens tilløb og dermed af en tilstrækkelig reduktion af den eksterne fosfortilførsel. Hvornår øen derefter kommer ned på det nødvendige lave fosforniveau i sværvandet, afhænger af hvor hurtigt den potentielt frigivelige fosforpulje i søsedimentet bliver reduceret.

Udviklingen gennem hele overvågningsperioden for udvalgte nøgleparametre er summarisk angivet i tabel 1. Eventuelle udviklingstendenser *for hele perioden 1989-2003* er undersøgt ved hjælp af lineær regressionsanalyse og resultaterne af denne analyse er angivet ved hjælp af symboler. Det skal bemærkes, at da den foretagne analyse som nævnt er baseret på hele overvågningsperioden, vil en eventuel ny udvikling inden for de sidst par år ikke nødvendigvis statistisk slå igennem.

**Tabel 1.** Nøgleparametre i 2003, gennemsnit for 1989-2002 samt udvikling i 1989-2003 i belastningsforhold, vandkemi og biologiske parametre. Evt. statistisk signifikante ændringer er undersøgt vha. lineær regressionsanalyse. +/-, +/−/−, +/+−− og +/++/−− svarer til en stigning/reduktion på henholdsvis 10%, 5%, 1% og 0,1% signifikansniveau. 0 angiver, at der ikke har været nogen signifikant ændring.

Parameter	Enhed	2003	Gns. 1989-2002	Udvikling
Opholdstid	år	0,052	0,081	0
Fosforbelastning	t/år	1,373	3,193	---
	mg/m <sup>2</sup> /dag	11,76	27,33	---
Indløbskoncentration (Q-vægtet)	mg P/l	0,188	0,657	---
P-retention (excl. magasin)	mg/m <sup>2</sup> /dag	0,822	3,348	--
	%	7,0	-17,7	0
Kvælstofbelastning	t/år	38,992	61,838	0
	mg/m <sup>2</sup> /dag	333,8	529,4	0
Indløbskoncentration (Q-vægtet)	mg N/l	5,02	8,67	----
N-retention (excl. magasin)	mg/m <sup>2</sup> /dag	92,14	144,24	--
	%	27,6	29,8	0
Sediment PTOT (0-2 cm dybde)	mg P/g tv			
Sediment NTOT (0-2 cm dybde)	mg N/g tv			
Fe:P (0-2 cm dybde)				
P total år	mg P/l	0,267	0,617	----
P total sommer	mg P/l	0,378	0,783	----
PO4-P år	mg P/l	0,076	0,298	----
PO4-P sommer	mg P/l	0,085	0,294	----
N total år	mg N/l	3,32	5,06	---
N total sommer	mg N/l	3,12	3,62	---
Uorganisk N år	mg N/l	1,304	2,478	0
Uorganisk N sommer	mg N/l	0,136	0,224	0
pH år		8,3	8,5	----
pH sommer		8,5	8,9	----
Sigtdybde år	m	0,77	0,71	+++
Sigtdybde sommer	m	0,44	0,42	+
Klorofyl år	µg/l	89	169	----
Klorofyl sommer	µg/l	146	238	--
Suspenderet stof år	mg SS/l	20,5	26,9	---
Suspenderet stof sommer	mg SS/l	31,5	40,2	--
Planteplanktonbiomasse år	mm <sup>3</sup> /l	24,5	22,9	0
Planteplanktonbiomasse sommer	mm <sup>3</sup> /l	30,7	36,4	0
% blågrønalger sommer	%	75,5	45,3	+++
% kiselalger sommer	%	2,8	6,0	0
% grønalger sommer	%	12,6	40,8	----
Dyreplanktonbiomasse år	µg TV/l	709	890	---
Dyreplanktonbiomasse sommer	µg TV/l	821	1547	---
% hjuldyr sommer	%	6,1	4,4	0
% vandlopper sommer	%	81,1	56,7	+
% cladoceer sommer	%	12,8	38,8	-
% Daphnia af cladoceer	%			
Græsningstryk sommer				
Pot. græsning				
% af planteplanktonbiomasse	%	4,8	15,6	0
% af planteplanktonbiomasse < 50 µm	%	18,8	22,7	0
Fisk				
Total antal (CPUE-garn)	stk.			
Total vægt (CPUE-garn)	kg			
% rovfisk i antal (CPUE-garn)	%			
% rovfisk i vægt (CPUE-garn)	%			
Fiskeyngel i littoralen	stk./m <sup>3</sup>	5,821		
Fiskeyngel i pelagiet	stk./m <sup>3</sup>	4,513		

## **2. Indledning**

Gundsømagle Sø indgår under det nationale overvågningsprogram af vandmiljøet (NOVA) og er udvalgt som repræsentant for den type af søer, hvor næringsstofbelastningen primært stammer fra større punktkilder i oplandet i form af kommunale renseanlæg. Desuden tilføres søen spildevand fra regnbetingede udløb og ukloakerede enkeltejendomme i oplandet.

Den mangeårige spildevandstilførsel har bevirket, at søen er blevet overgødslet med næringsstoffer. Dette har givet søens bestand af planterplankton så gode vækstforhold, at svavandet blev stadig mere uklart. Dette medførte allerede sidst i 1960'erne, at de sidste rester af søens tidligere artsrike bestand af undervandsplanter forsvandt /3/. Ligeledes forsvandt store dele af søens tidligere rige fugleliv /4/.

Nærværende rapport omhandler resultaterne fra overvågningen af Gundsømagle Sø i 2003 samt udviklingen siden 1989. I overensstemmelse med paradigmaet /5/ er der i år tale om en normalrapportering.

Der er i rapporten generelt fokuseret på eventuelle udviklingstendenser i perioden 1989-2003 samt på sammenhænge mellem de fysisk-kemiske og biologiske parametre.

Samtlige data fra tilsynet i 2003 er videresendt til DMU, hvor de vil indgå i den nationale rapportering af miljøtilstanden i overvågningssøerne.

### 3. Klimatiske forhold

Klimatiske forhold påvirker både direkte og indirekte de vandkemiske og biologiske forhold i en sø. Store nedbørsmængder, specielt i vinterhalvåret, betyder eksempelvis generelt en større udvaskning af næringsstoffer fra dyrkede arealer og dermed en tilsvarende større transport af disse næringsstoffer til søen.


På samme måde spiller temperaturen eksempelvis en rolle for udviklingen af plante- og dyreplanktonet over året og for de forskellige fiskearters gydesucces. Derfor er klimatiske forskelle fra år til år af væsentlig betydning for tolkningen af årets målereultater.

I det følgende beskrives de klimatiske forhold i 2003 og der sammenlignes med "normaler" forstået som gennemsnit for en længere årrække. I erkendelse af, at eksempelvis nedbørsmængderne varierer betragteligt fra landsdel til landsdel, er der for flere af parametrene anvendt data fra søens nære opland. Dette opland svarer typisk til et område på  $20 \times 20 \text{ km}^2$ , for nedbørens vedkommende dog  $10 \times 10 \text{ km}^2$ .

Års- og månedsmidler for temperatur, nedbør, fordampning, solskinstimer, indstråling og vindstyrke findes i bilag 1.

#### Temperatur

Med en gennemsnitstemperatur på  $8,4^\circ\text{C}$  i området omkring søen var 2003 ikke helt så varm som 2002, men stadig noget over normalen for 1961-90 på  $7,9^\circ\text{C}$ . Set for hele landet var middeltemperaturen på  $8,7^\circ\text{C}$  den 11. højest registrerede siden målingerne begyndte i 1874.



Figur 1. Gennemsnitlig månedstemperatur i 2003 sammenlignet med perioden 1961-90 (data fra DMI  $20 \times 20 \text{ km}^2$  grid 20155).


Især i juli og august var middeltemperaturen markant højere end normalen, men også årets sidste to måneder var væsentligt varmere end normalt. I de øvrige måneder var temperaturen enten omkring normalen eller derover på nærfør februar og oktober, der var koldere end normalt (figur 1).

#### Solskinstimer

Antallet af solskinstimer i 2003 opgjort ved målestasjonen ved Kbhs Lufthavn var 2.120 mod normalt 1.754 (gennemsnit for perioden 1961-90). Også i sommerperioden maj - september var antallet af solskinstimer med 1.368 større end normalens 1.143 timer.

Som det fremgår af figur 2, var især perioderne marts-april og juni-september meget solrige, mens der i januar og november omvendt var færre solskinstimer end normalt. På landsplan blev året det anden mest solrige år siden målingerne startede i 1920.

#### Solskinstimer (Kbh. Lufthavn)




Figur 2. Antallet af solskinstimer pr. måned i 2003 sammenlignet med perioden 1961-90 (data fra Kbhs Lufthavn).

#### Nedbør

Den samlede årsnedbør ved søen i 2003 var med 532 mm noget under de 586 mm, der er gennemsnittet ved søen for perioden 1961-90. Også på landsplan var 2003 et relativt tørt år.

Som det fremgår af figur 3, var både februar og marts usædvanlig nedbørsfattige, mens januar, april-maj og september omvendt var ganske regnfulde. Fra oktober og året ud var nedbørmængden igen markant under normalen.




**Figur 3.** Månedsnedbør i 2003 sammenlignet med gennemsnittet for perioden 1961-90 (data fra DMI 10x10 km<sup>2</sup> grid 10547).

### Vindstyrke

Dage med blæst kan have stor betydning for de kemisk/fysiske og biologiske forhold i sørerne. I større sører kan lagdeling af vandmasserne brydes op, men også i de mindre, lavvandede sører kan dage med blæst påvirke forholdene. Eksempelvis ses ofte masseopblomstringer af blågrønalger i varme og vindstille perioder især i sensommeren. Dage med hård vind kan også forårsage ophvirving af bundmateriale og dermed uklart vand samt en transport af næringsstoffer fra sedimentet og op i vandfasen.

I figur 4 er vist i hvor stort omfang der i de enkelte måneder er forekommet vindstyrker på hård vind eller derover i 2003 sammenlignet med normalen for 1989-98. Som det fremgår af figuren, var der markant færre dage med kraftig blæst i årets første tre måneder sammenlignet med perioden 1989-98, mens der for sommeren generelt var lidt flere dage med blæst.



**Figur 4.** Forekomsten af perioder med hård vind i 2003 sammenlignet med gennemsnittet for 1989-98 (data fra DMI, målestation Ledreborg allé).

## 4. Sø- og oplandsbeskrivelse samt målsætning

I dette afsnit er søen og dens opland kort beskrevet. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til tidligere rapporter. Søen og dens historie er desuden udførligt beskrevet af Thorkild Høy og Jørgen Dahl i 3. bind af serien om Danmarks søer /6/.

Gundsømagle Sø er beliggende i Gundsø Kommune nordøst for Roskilde. Søen er med et areal på ca. 32 ha og en middeldybde på ca. 1,2 m en mindre og lavvandet sø, omgivet af et af Østdanmarks største rørkovsområder.

Kort over søen og dens opland samt placeringen af de anvendte målestationer er vist i figur 5. De vigtigste morfometriske data vedrørende søens dybdeforhold og morfometri er vist i tabel 2. Mere udførlige data findes i bilag 2.

**Tabel 2. Morfometriske data for Gundsømagle Sø.**

Overfladeareal	32 ha
Max. vanddybde	1,9 m
Gns. vanddybde	1,2 m
Vandvolumen	375.000 m <sup>3</sup>

Søen ligger i det topografiske opland til vandløbet Hove Å, der gennemstrømmer søen og derefter har udløb i Roskilde Fjord. Størstedelen af søens opland på ca. 66 km<sup>2</sup> ligger i Høje Tåstrup, Ledøje-Smørum og Gundsø kommuner. Ca. 88% af oplandet består af dyrkede arealer, hvor jordtypen domineres af sandblandet lerjord og lerjord. Desuden består 7% af oplandet af bebyggede arealer.


Grunddata vedrørende søens topografiske opland og arealanvendelse findes i bilag 3.

I forbindelse med NOVA programmet skal der i perioden 1998-2003 ske en løbende indsamling af oplandsdata fra de 31 søoplande. Det overordnede formål med at indsamle data vedrørende eksempelvis oplandsafgrænsning, jordbundsforhold og arealanvendelse er, at opnå en større viden om vand- og næringstransporten i de forskellige søoplande. Ud fra oplandsanalyserne er det målet, at opstille modeller der mere præcist kan simulere betydningen af forskellige tiltag overfor kvælstof- og fosforbelastningen samt dokumentere og forklare udviklingen heri /7/.


I oplandet til Gundsømagle Sø er der ved udgangen af 2000 registreret godt 2000 enkeltejendomme, hvoraf langt hovedparten er sommerhuse eller kolonihavehuse. Den samlede belastning fra enkeltejendomme er i 2003 opgjort til 325 kg fosfor og 1430 kg kvælstof.

Gundsømagle Sø er tildelt en generel målsætning (B) svarende til en vandkvalitet, der er upåvirket/svagt påvirket af menneskelige aktiviteter. For at opfylde denne målsætning skal følgende krav være opfyldt:

- Sigtdybden skal være over 1 meter og total-fosforkoncentrationen mindre end 150 µg P/l. Begge parametre målt som sommernemsnit.
- Der skal sikres en alsidig og varieret fiskefauna, uden masseforekomst af fredsfisk og med et indslag af større rovfisk.
- Der skal være en undervandsvegetation, hvor dybdeudbredelsen mindst svarer til gennemsnittet for sommersigtdybden.



Innægningen af herudspids vidergneisse mod Stensværd  
vind (antiklinal) jævnt som oveni beskrivningerne,  
er foretaget på grundlag af en speciel lufttegning fra  
9. juli 1981 kombineret med markovervættene. Det skal  
dog bemærkes, at udpræsninger mod vest af Roskilde-  
havets nivålinje er belægget med en betydelig  
ujævnhed især mod nordvest, idet højdeniveau her  
har en væsentlig større udstrækning.



**Figur 5.** Kort over Gundsømagle Sø med topografisk opland (indenfor Roskilde Amt) og angivelse af målestationer samt kort over søen med angivelse af dybdegrænser.

## 5. Søtilløb - vandføring og stofkoncentrationer

Målinger af vandføring og stofkoncentration er foretaget på station 777 i Hove Å. Ud af det samlede opland til søen på 66,09 km<sup>2</sup>, dækker målestasjonen et opland på 54,66 km<sup>2</sup>, svarende til en fordeling af målt og umålt opland på henholdsvis 82,7% og 17,3%.

Vandføringen måles kontinuerligt på stationen, mens vandrøver til bestemmelse af stofkoncentrationer er udtaget 26 gange årligt.

Samleskema for års- og sommermiddelværdier i tilløbet på station 777 for henholdsvis vandføring, fosfor- og kvælstofkoncentrationer findes i bilag 4.


### 5.1 Vandføring

Figur 6 viser vandføringen i Hove Å på station 777 i perioden 1989-2003 angivet som tidsvægtede års- og sommermidler.

Årsmiddelvandføringen i 2003 var med 196 l/s lidt under gennemsnittet for 1989-2002 på 209 l/s (median 210 l/s).

Sommermiddelvandføringen var med 151 l/s derimod markant større end middelvandføringen i 1989-2002 på 78 l/s (median 73 l/s).


Vandføringen i Hove Å, st. 777



Figur 6. Års- og sommermiddelvandføring i Hove Å, st. 777, i perioden 1989-2003.

Vandføringen i tilløbet varierer normalt karakteristisk over året, med en høj vandføring i vinterperioden og en lav vandføring i sommerperioden som det fremgår af figur 7, der viser månedsvandføringen i 2003 samt for den foregående periode 1989-2002. Som det ses på figuren, var vandføringen især i januar og maj meget stor i forhold til normalen, men faktisk var vandføringen i hele sommerperioden på nær august større end normalt.

Vandføringen i Hove Å, st. 777



Figur 7. Vandføringen i Hove Å, st. 777, angivet som månedsmidler for 2003 og som medianværdier for perioden 1989-2002.

### 5.2 Fosfor


Fosforkoncentrationen i tilløbet var i starten af overvågningsperioden meget høj, med årsmiddelkoncentrationer omkring 4-5 mg P/l og sommermiddelkoncentrationer omkring 6-7 mg P/l. De høje fosforkoncentrationer i tilløbet skyldtes tilledningen af store fosformængder fra mekanisk/biologisk renset spildevand i oplandet. Forskellen i års- og sommermiddelkoncentrationen skyldtes, at det tilledte spildevand ikke blev fornyet i samme grad i sommerperioden som følge af den naturligt lavere vandføring i sommerhalvåret.

I takt med at spildevandsrensningen i oplandet er blevet forbedret, er fosforkoncentrationen i tilløbet gradvist blevet reduceret og har i de seneste år ligget omkring 0,15 - 0,22 mg P/l svarende til en reduktion i forhold til i 1989 på omkring 95% på både års- og sommermiddelkoncentrationen. Det meget store fald i fosforkoncentrationen i tilløbet skyldes primært en centralisering og forbedring af spildevandsrensningen i oplandet i form af en nedlæggelse af 5 renseanlæg samtidig med at det eneste tilbageværende renseanlæg, Kallerup Renseanlæg, er blevet fuldt udbygget med kvælstof- og fosforgjernelse.

Figur 8 viser den vandføringsvægtede koncentration af totalfosfor og opløst fosfat beregnet som årsmidler for perioden 1989-2003. Som følge af den forbedrede spildevandsrensning i oplandet, er den vandføringsvægtede årsmiddelkoncentration af totalfosfor i Hove Å faldet fra 3,840 mg P/l i 1989 til et niveau typisk under 0,2 mg P/l. Den vandføringsvægtede årsmiddel i 2003 var med 0,188 mg P/l lidt højere end i 2002 og et godt stykke fra den hidtil laveste årsmiddel fra 2000 på 0,144 mg P/l.

Tilsvarende er den vandføringsvægtede årsmiddelkoncentration af opløst fosfat faldet fra 3,100 mg P/l i 1989 til et niveau omkring 0,02 - 0,09 mg P/l. Årsmidlen i 2003 var med 0,047 mg P/l ligeledes lidt højere end i 2002, hvor årsmidlen med 0,021 mg P/l var overvågningsperiodens hidtil laveste.

Som det fremgår af figuren, fandt langt den største reduktion sted i den første halvdel af overvågningsperioden. De vandføringsvægtede årsmidler har således været relativ konstante siden 1994.



**Figur 8.** Udviklingen i den vandføringsvægtede årsmiddelkoncentration af totalfosfor og opløst fosfat i Hove Å, st. 777, i perioden 1989-2003.


Faldet i den vandføringsvægtede årsmiddelkoncentration af såvel totalfosfor som opløst fosfat i perioden 1989-2003 er statistisk signifikant (lineær regressionsanalyse,  $P < 0,001$ ).

### 5.3 Kvælstof

Kvælstofkoncentrationen i tilløbet var i starten af perioden høj, med en årsmiddelkoncentration omkring 13-14 mg N/l. Efter etableringen af kvælstofrensning på Kallerup Renseanlæg i 1993-94 er kvælstofkoncentrationen i tilløbet faldet markant til et niveau omkring 4-7 mg N/l.

Figur 9 viser den vandføringsvægtede årsmiddelkoncentration af kvælstof i tilløbet på målestation 777. I perioden 1989-92 lå den vandføringsvægtede årsmiddelkoncentration stabilt omkring 12-13 mg N/l. Efter ovennævnte etablering af kvælstofrensning på Kallerup Renseanlæg i 1993 og efterfølgende driftsoptimering på anlægget faldt årsmidlen støt de følgende år.

Laveste årsmiddelkoncentration på 4,42 mg N/l blev registreret i 1996, der var et meget nedbørsfærdigt år. I de næste par år steg årsmiddelkoncentrationen atter og nåede i 1998 op på 8,65 mg N/l, men har så siden igen været faldende.



**Figur 9.** Udviklingen i den vandføringsvægtede årsmiddelkoncentration af totalkvælstof i Hove Å, st. 777, i perioden 1989-2003.

I 2003 var den vandføringsvægtede årsmiddelkoncentration med 5,02 mg N/l periodens næstlaveste.

Faldet i den vandføringsvægtede årsmiddelkoncentration af totalkvælstof i perioden 1989-2003 er statistisk signifikant (lineær regressionsanalyse,  $P < 0,001$ ).

## 6. Vandbalance

### Beregningsgrundlag

Vandbalancerne for 1989-97 er beregnet vha. EDB-programmet STOQ-sømodul, vers. 3.30, mens der for 1998-2001 er anvendt STOQ-sømodul windows vers. 4.0 til 4.6. Fra og med 2002 er anvendt STOQ SQL-server sømodul vers. 2.07.

De beregnede vandbalancer fra 2003 opdelt på månedsbasis findes i bilag 5. Års- og sommerværdier for 1989-2003 findes i bilag 6.

Vandføringen er målt kontinuerligt i tilløbet (st.777) og afløbet (st. 787) vha. Q/H målere. I 1989-92 blev vandføringen i det mindre tilløb Østrup Bæk, st. 783, målt med vingemåler i forbindelse med udtagning af vandkemiprøver. Ved at foretage en Q/Q-korrelation mellem enkeltmålinger af vandføringen i Østrup Bæk ( $Q_{783}$ ) og de målte døgnmiddelvandføringer i Hove Å, st. 777 ( $Q_{777}$ ) for perioden 1989-92 fandtes følgende sammenhæng udtrykt ved ligningen:

$$Q_{783}(\text{l/s}) = (8,08 \times 10^{-3} \times Q_{777})(\text{l/s}) + (1,32 \times 10^{-2})(\text{l/s})$$

Q/Q-korrelationen blev efterfølgende benyttet til beregning af døgnmiddelvandføringen i Østrup Bæk i 1989-92. Fra og med 1993 ophørte overvågningen af Østrup Bæk, st. 783 i forbindelse med en revision af overvågningsprogrammet.

Den anvendte beregning af vandtilførslen fra det umålte opland findes i bilag 7.

I STOQ-sømodul opstilles vandbalancen på baggrund af det målte bidrag fra tilløbet, det beregnede bidrag fra umålte opland, den målte fraførsel i afløbet, nedbør og fordampning samt magasineringen i søen som følge af vandstandsændringerne. Vandbalancen afstemmes herefter som tilført overfladevand minus fraført overfladevand, hvor den eventuelt resterende positive eller negative vandmængde henregnes som udveksling med grundvandet, henholdsvis som grundvandsindsivning eller som udsivning til grundvandet.

I forbindelse med rapporteringen i 1995 /8/ blev det vurderet, at den grundvandsindsivning, som er beregnet i STOQ, næppe er korrekt. Langt mere sandsynligt er det, at den beregnede grundvandsindsivning stammer fra usikkerhed på vandbalancen, herunder primært magasinændringerne.

### Årlige til- og fraførsler

Vandbalanceberegningen for 2003 samt gennemsnits- og medianværdier for 1989-2002 fremgår af tabel 3.

Den samlede vandtilførsel i 2003 var med godt 7,5 mill. m<sup>3</sup> meget tæt på gennemsnittet for perioden 1989-2002.


Den beregnede grundvandsindsivning var i 2003 på 1,2 mill. m<sup>3</sup> svarende til ca. 16% af den samlede vandtilførsel. Som nævnt er der næppe tale om en reel grundvandsindsivning, men derimod om en usikkerhed på vandbalancen.

Tabel 3. Til- og fraførte vandmængder i 1000 m<sup>3</sup>.

	År 2003	Gns. 1989-2002	Median 1989-2002
Nedbør	197	221	224
Fordampning	209	190	194
Målt opland	6.185	6.616	6.614
Umålt opland	147	161	169
Afløb	7.464	7.522	7.749
Magasin	-13	-1	-4
Ind-/udsivning	1.222	725	785
Samlet tilførsel	7.543	7.597	7.770
Samlet fraførsel	7.464	7.582	7.756

Vandtilførslen varierer ganske meget fra år til år afhængig af nedbørsmængden og fordelingen af nedbøren over året. Den hidtil størst målte vandtilførsel i 2002 var således mere end 7 gange større end vandtilførslen i 1997, der var et meget tørt år (figur 10).

Tilførte vandmængder 1989-2003




Figur 10. Tilførte vandmængder i 1989-2003. De angivne vandmængder er incl. den beregnede grundvandsindsivning.

## Hydraulisk opholdstid

Den hydrauliske opholdstid for sværvandet afhænger af vandføringen i tilløbet og dermed i høj grad af nedbørsmængden. I år med en stor nedbørs-mængde er opholdstiden derfor normalt kort og omvendt lang i nedbørsfattige år.

Figur 11 viser den gennemsnitlige opholdstid på års- og sommerbasis for overvågningsperioden. I 2003 var den gennemsnitlige opholdstid på årsbasis med 19 dage identisk med gennemsnittet for perioden 1989-2002 (median ligeledes 19 dage).



**Figur 11.** Års- og sommernavnemsnitlig opholdstid i perioden 1989-2003.

Som følge af den karakteristiske årstidsvariation i vandføringen er den gennemsnitlige opholdstid i sommerperioden normalt væsentligt længere end opholdstiden på årsbasis. I 2003 var opholdstiden i sommerperioden 64 dage, hvilket er markant kortere end gennemsnittet for 1989-2002 på 128 dage. Betragtes medianen for samme periode er denne dog med 57 dage langt kortere.

Sommeropholdstiden har, som det kan ses på figuren, varieret overordentligt meget gennem overvågningsperioden, fra et teoretisk maksimum i 1989 på 525 dage til 37 dage i 2001.

## 7. Stofbalance

### Beregningsgrundlag

Stofbalanceberegningerne for 1989-97 er foretaget vha. STOQ-sømodul, vers. 3.30, mens der for 1998-2001 er anvendt STOQ-sømodul windows vers. 4.0 til 4.6. Fra og med 2002 er anvendt STOQ SQL-server sømodul vers. 2.07. Stofbalanceberegningerne omfatter totalfosfor, totalkvælstof og totaljern.

Stofbalancerne for 2003 på månedsbasis findes i bilag 5. Årlige stofmængder for 1989-2003 samt vandføringsvægtede indløbskoncentrationer for de nævnte parametre findes i bilag 6.

Den anvendte beregning af stoftilførslen fra det umålte opland, herunder stoftransporten fra ind- og udsivende grundvand, er beskrevet i bilag 7.

### 7.1 Fosfor

#### Årlige til- og fraførsler samt tilbageholdelse

Den samlede til- og fraførsel samt den beregnede tilbageholdelse af fosfor i 2003 er vist i tabel 4. Søen blev tilført knap 1,4 ton fosfor, hvilket er væsentligt mindre end i 2002, men i niveau med tilførslen i 1998-2001.

Tabel 4. Til- og fraført samt tilbageholdt fosfor i kg.


	År 2003	Gns. 1989-2002	Median 1989-2002
Atmosfærisk dep.	4	5	5
Målt opland	1.140	2.864	1.706
Umålt opland	52	52	53
Afløb	1.246	2.649	2.138
Ind-/udsivning	178	75	-75
Magasin	32	-32	-26
Retention	96	391	-193
Samlet tilførsel	1.373	3.193	1.879
Samlet fraførsel	1.246	2.833	2.360

I årene før 1992 var fosfortilførslen meget stor, mellem 8 og 12 ton fosfor om året (figur 12). Fra og med 1992 faldt fosfortilførslen til søen markant som følge af en kraftig reduktion i fosfortilførslen fra punktkilder. I perioden 1992-95 lå fosfortilførslen mellem 2 og 4 ton om året og i de tørre år 1996-97 nåede fosfortilførslen helt ned omkring 500 kg om året. Efterfølgende har fosfortilførslen ligget omkring 1,2 - 1,6 ton om året, men var i 2002 noget større som følge af dette års usædvanligt store

nedbørsmængder, der resulterede i en rekordstor vandtilførsel til søen.

Betratges fosfortilførslen til søen i hele perioden 1989-2003 har der været et signifikant fald i tilførslen (lineær regressionsanalyse,  $P < 0,01$ ).

#### Fosforbalance 1986 og 1988-2003



Figur 12. Til- og fraførsel af fosfor i 1986 og 1988-2003.


Til og med 1991 tilbageholdte søen hvert år en betydelig fosformængde og søens interne fosforpulje voksede dermed støt. I perioden 1989-91 tilbageholdte søen således i gennemsnit 35% af den tilførte fosformængde, svarende til omkring 9,2 ton. Efter den markante reduktion i fosfortilførslen i 1992, har tilbageholdelsen hvert år indtil 2001 været negativ, idet den fraførte fosformængde har været større end den tilførte fosformængde. I 2003 tilbageholdte søen knap 100 kg fosfor.

I perioden 1992-2003 er søsedimentets fosforpulje ud fra stofbalanceberegningerne således blevet reduceret med knap 4 ton fosfor. Selv om fosforfraførslen således har været ganske stor siden 1992, skal størrelsen dog ses i forhold til tidligere tiders fosfortilbageholdelse i søen. Alene for årene 1989-91 tilbageholdte søen som ovenfor nævnt omkring 9,2 ton fosfor.

Udviklingen i fosfortilbageholdelsen i perioden 1989-2003 er vist i figur 13. I 1989 var den beregnede fosfortilbageholdelse omkring 4,8 ton svarende til godt 15 g P m<sup>2</sup>/år. I de følgende par år faldt fosfortilbageholdelsen og i perioden 1992-2003 er der sket en nettofraførsel af fosfor ud af søen hvert år pånær i 2001 og 2003.

Nettofraførslen af fosfor har varieret mellem 0,1 og 1,1 ton årligt, svarende til mellem 0,4 og 3,5 g P m<sup>2</sup> søbund/år. Som det fremgår af figuren, fandt den største transport af fosfor ud af søen sted i 1994,

hvorefter nettofraførslen faldt jævnt i de efterfølgende år. Fra og med 2001 har søen vekslet mellem at fraføre og tilbageholde fosfor.




**Figur 13.** Den beregnede fosfortilbageholdelse (excl. magasinering) i kg for perioden 1989-2003.

### Kildeopsplitning


Den årlige fosfortilførsel i 1989-2003 opdelt på belastningskilder findes i bilag 8, der endvidere indeholder den anvendte beregningsmetode.

I figur 14 er vist de enkelte kilders bidrag til fosfortilførslen i 2003. Landbrugsbidraget udgjorde med knap 29% den største andel efterfulgt af naturbidraget og bidraget fra enkeltejendomme med henholdsvis godt 26% og knap 24%. Bidraget fra regnbetingede udløb (11%) og renseanlæg (9%) udgjorde stort set resten.



**Figur 14.** Kildeopsplitning af fosfortilførslen 2003.

I figur 15 er vist udviklingen i de enkelte kilders bidrag i perioden 1989-2003. I perioden 1989-91 var fosfortilførslen fra punktkilder med mellem 5 og 10 ton fosfor meget stor og bidraget herfra udgjorde i disse år op mod 90% af den samlede fosfortilførsel. Årsagen til den store reduktion i punktkildebidraget er en centralisering og udbygning af spildevandsrensningen i oplandet siden 1989.



**Figur 15.** Fosfortilførslen i 1989-2003 fordelt på belastningskilder.

Af de oprindelige 6 renseanlæg i oplandet i starten af 1989 er kun Kallerup Renseanlæg tilbage. Dette anlæg blev i starten af 1990'erne udbygget og har siden 1993 fungeret med udvidet biologisk rensning samt rensning for såvel fosfor som kvælstof.

Efter planen skulle punktkildebidraget fra Kallerup Renseanlæg fra og med 1997 reduceres yderligere til 250-300 kg P/år. Dette mål blev nået i 1996. I 2003 var fosforudledningen fra Kallerup Renseanlæg med 126 kg den hidtil lavest registrerede.

Fosforudledningen fra Kallerup Renseanlæg har i perioden 1997-2003 gennemsnitligt været ca. 240 kg P/år, med de største fosformængder i 1999 og 2002, der var meget nedbørsrige år. I disse 2 år var den udledte fosformængde fra anlægget på henholdsvis 344 og 366 kg. Omvendt er fosforudledningen væsentligt under de nævnte 250-300 kg P/år i tørre år som eksempelvis 2003.

I takt med den meget store reduktion i bidraget fra renseanlæg er den relative betydning af de øvrige belastningskilder steget. Regnbetingede udløb, der i starten af overvågningsperioden kun udgjorde omkring 2-3% af fosfortilførslen har siden 1995 udgjort 9-20% af fosfortilførslen. På samme måde er andelen af enkeltejendommenes bidrag steget fra knap 10% til typisk omkring 15-25%.

Regnet i kilogram er bidraget fra enkeltejendomme dog faldet til knap det halve i forhold til i 1989, bl.a. som følge af en afskæring/forbedret rensning af en del af dette spildevand.

### 7.2 Kvælstof

#### Årlige til- og fraførsler samt tilbageholdelse


Den samlede til- og fraførsel samt den beregnede tilbageholdelse af kvælstof i 2003 er vist i tabel 5. Kvælstoftilførslen var med 39 ton langt under gennemsnittet for 1989-2002 på 62 ton.

**Tabel 5.** Til- og fraført samt tilbageholdt kvælstof i ton.

	År 2003	Gns. 1989-2002	Median 1989-2002
Atmosfærisk dep.	480	518	480
Målt opland	29.478	52.714	56.316
Umålt opland	2.317	2.256	2.338
Afløb	28.628	44.307	42.357
Ind-/udsivning	6.717	5.546	7.082
Magasin	-397	-65	-72
Retention	10.762	16.848	16.841
Samlet tilførsel	38.992	61.838	67.318
Samlet fraførsel	28.628	45.056	42.357

Den samlede tilførsel har som det fremgår af figur 16 varieret meget, fra 108 ton i 1994, hvor kvælstofudvaskningen fra de dyrkede arealer var meget stor, til 13 ton i 1996, hvor udvaskningen omvendt var usædvanlig lav som følge af den megen tørke.

### Kvælstofbalance 1986 og 1988-2003




**Figur 16.** Til- og fraførsel af kvælstof i 1986 og 1988-2003.

Variationen i kvælstoftilførslen er således i høj grad styret af klimatiske forhold og statistisk er det derfor heller ikke muligt at påvise en eventuel reduktion i kvælstoftilførslen for perioden 1989-2003. Som nævnt i afsnit 5 er der dog sket et markant fald i den vandføringsvægtede kvælstofkoncentration i tilløbet.

I figur 17 er vist den beregnede årlige kvælstoftilbageholdelse i 1989-2003. Som det fremgår af figuren, varierer tilbageholdelsen ganske betydeligt fra år til år. Dette hænger primært sammen med, at tilførslen også varierer betragteligt fra år til år.

Kvælstoftilbageholdelsen var i 2003 med knap 11 ton noget under gennemsnittet for 1989-2002 på knap 17 ton.

### Kvælstoftilbageholdelse 1989-2003



**Figur 17.** Den beregnede kvælstoftilbageholdelse (excl. magasinering) i kg for perioden 1989-2003.


Tilbageholdelsen har i procent af den tilførte mængde kvælstof i gennemsnit for perioden 1989-2003 varieret mellem 14 og 65%, med den største tilbageholdelse i de nedbørsfattige år og omvendt den laveste tilbageholdelse i de mest regnfulde år. I de nedbørsmæssigt mere normale år har tilbageholdelsen som regel været omkring 30%.

I 2003 tilbageholdte søen ca. 28% af den tilførte kvælstof hvilket er tæt på gennemsnittet for 1989-2002 på 30%.

### Kildeopsplitning

Fordelingen af den tilførte kvælstof i 2003 på belastningskilder er vist i figur 18. Langt den overvejende del (65%) stammer fra landbrugsområder. Af den resterende del udgjorde naturbidraget, punktkilder og enkelteejendomme henholdsvis 23%, 7% og 4%.


### Kildeopsplitning af kvælstof



**Figur 18.** Kildeopsplitning af kvælstoftilførslen i 2003.

I figur 19 er vist udviklingen i de enkelte kilders bidrag i perioden 1989-2003. Siden 1993 er punktkildebidraget faldet markant (jf. afsnit 7.1), fra årlige tilførsler mellem 20 og 35 ton, til årlige tilførsler

efter 1993 på mellem 3 og 8 ton pr. år. Dermed er den relative betydning af de øvrige belastningskilder steget.



**Figur 19.** Udviklingen i kvælstoftilførslen i 1989-2003 fordelt på belastningskilder.

### 7.3 Jern

#### Årlige til- og fraførsler samt tilbageholdelse

Til- og fraførslen samt den beregnede tilbageholdelse af jern i 2003 er vist i tabel 6. Tilførslen var med 13,6 ton overvågningsperiodens hidtil største.


**Tabel 6.** Til- og fraført samt tilbageholdt jern i kg.

	År 2003	Gns. 1989-2002	Median 1989-2002
Atmosfærisk dep.	0	0	0
Målt opland	10.778	5.386	4.749
Umålt opland	26	25	25
Afløb	2.282	2.257	1.819
Ind-/udsivning	2.828	724	494
Magasin	105	10	11
Retention	11.245	3.869	3.527
Samlet tilførsel	13.632	6.187	5.601
Samlet fraførsel	2.282	2.308	1.819

Årsagen til den meget store jerntilførsel i 2003 var primært et meget højt jernindhold i tilløbet. Koncentrationen af jern i tilløbet har været signifikant stigende gennem hele overvågningsperioden. Ikke mindst i de sidste 3 år har indløbskoncentrationen generelt været meget høj.

Jerntilførslen har varieret betydeligt fra år til år bl.a. afhængig af vandtilførslen, fra 13,6 ton i 2003 til 1,8 ton i 1997 (figur 20).


#### Jernbalance 1989-2003



**Figur 20.** Til- og fraførsel af jern i 1990 og 1992-2003. Der er ikke opstillet jernbalancer for 1989 og -91, hvor der ikke blev målt for jernindhold i tilløbet.

Søen har i alle årene tilbageholdt en stor del af den tilførte jern (figur 21). Den beregnede tilbageholdelse i 2003 var med godt 11 ton langt over gennemsnittet på 3,9 ton for perioden 1989-2002. I procent tilbageholdte søen 83% af den tilførte jern, hvilket er overvågningsperiodens højeste tilbageholdelsesprocent. Som gennemsnit for perioden 1992-2002 har søen tilbageholdt 63% af den tilførte jernmængde.

#### Jerntilbageholdelse 1989-2003



**Figur 21.** Den beregnede jerntilbageholdelse (excl. magasinering) i kg for 1990 og 1992-2003.

Jern-fosforforholdet i de øverste 2 cm af sedimentet er i 2001 beregnet til ca. 3:1, hvilket er uændret i forhold til i 1996 og lidt højere end i 1992, hvor forholdet blev beregnet til ca. 2:1. Selv om søen i dag tilbageholder langt mere jern end fosfor, er der stadig lang vej op til det jern-fosforforhold på mindst 15:1, hvor jernindholdet i sedimentet kan spille en væsentlig rolle for fosforfrigivelsen /9/.

## 8. Fysisk-kemiske målinger i søen

I dette afsnit præsenteres nogle af de målte parametre i svøvandet i 2003 og en eventuel udvikling i perioden 1989-2003 er vurderet. Års- og sommermidler for samtlige målte parametre i svøvandet samt figurer over udviklingsforløb findes i bilag 9.


### 8.1 Næringsstoffer

#### Total fosfor

Fosforkoncentrationen i søen er karakteriseret ved relativ lave værdier i vinterperioden, hvor svøvandskoncentrationen stort set er identisk med indløbskoncentrationen som følge af den korte opholdstid. I sommerperioden er vandføringen i tilløbet lavere og opholdstiden længere hvilket i kombination med en betydelig fosforfrigivelse fra søsedimentet resulterer i en markant stigning i svøvandskoncentrationen.

Figur 22 viser denne udvikling i fosforkoncentrationen i svøvandet over året. Som følge af den stærkt reducerede fosfortilførsel til søen siden starten af overvågningsperioden har svøvandskoncentrationen gennem hele perioden været faldende.


2003 var ingen undtagelse fra denne regel og i samtlige måneder lå svøvandskoncentrationen langt under gennemsnittet for 1989-2002. Selv om fosforkoncentrationen således er faldet meget markant i søen, er niveauet dog stadig højt som det også fremgår af figuren.



**Figur 22.** Koncentrationen af fosfor i svøvandet i 2003 samt månedsgennemsnittet for 1989-2002 incl. 90-10% og 75-25% fraktiler.

Det generelle fald i fosforniveauet ses tydeligt på figur 23, der viser års- og sommermidlerne af fosfor i svøvandet i hele perioden 1989-2003. Årsmiddelkoncentrationen af totalfosfor i svøvandet har siden 1989 og frem til 2002 været konstant faldende. Den overordnede baggrund herfor er som tidligere nævnt den markante reduktion i fosfortilførslen, der har fundet sted gennem perioden.

#### Totalfosfor, - års- og sommermidler



**Figur 23.** Den tidsvægtede års- og sommermiddelkoncentration af totalfosfor i svøvandet 1980, 1986 og 1989-2003.


Denne udvikling fortsatte ikke i 2003, hvor årsmiddelkoncentrationen af totalfosfor i svøvandet med 0,267 mg P/l steg for første gang siden 1989. Sammenlignet med årsmiddelkoncentrationen i 1989 på 1,481 mg P/l er årsmiddelkoncentrationen af totalfosfor i 2003 reduceret med omkring 85%.

Sommermiddelkoncentrationen af totalfosfor har ligeledes været faldende siden 1989. I 1989 var sommermidlen således 1,314 mg P/l mod 0,378 mg P/l i 2003. Også sommermiddelkoncentrationen af totalfosfor steg lidt i forhold til i 2002. Udviklingen i sommermiddelkoncentrationen af totalfosfor i svøvandet har, som det kan ses på figuren, ikke været helt så jævn som udviklingen i årsmiddelkoncentrationen.

Set for hele perioden 1989-2003 kan der konstateres et signifikant fald i både års- og sommermiddelkoncentrationen af fosfor (lineær regressionsanalyse,  $P < 0,001$ ).

#### Opløst fosfat

Søvandets indhold af opløst fosfat ( $\text{PO}_4\text{-P}$ ) i 2003 samt gennemsnittet for 1989-2002 er vist i figur 24. Indholdet af fosfat i svøvandet har fulgt samme udvikling som for totalfosfor. Selv om fosfatkoncentrationen er faldet markant i overvågningsperioden, er fosfatindholdet i svøvandet endnu ikke faldet så meget, at fosfat er blevet en direkte begrænsende faktor for planteplanktonet i sommerperioden. Fosfatkoncentrationen har dog i enkelte år kortvarigt i foråret været under detektionsgrænsen og dermed en potentiel begrænsende faktor for algernes vækst. Dette var også tilfældet i 2003 i en kort periode af april.




**Figur 24.** Koncentrationen af fosfat i søvandet i 2003 samt månedsgennemsnittet for 1989-2002 incl. 90-10% og 75-25% fraktiler.

Den tidsvægtede års- og sommermiddelkoncentration af fosfat i søvandet 1980, 1986 samt 1989-2003 er vist i figur 25. Årsmiddelkoncentrationen af opløst fosfat har siden 1989 været faldende. I 2003 var årsmidlen med 0,076 mg P/l dog noget højere end i 2002, der med 0,048 mg P/l var overvågningsperiodens hidtil absolut laveste.

Sammenlignet med årsmidlen i 1989 på 0,996 mg P/l, er årsmiddelkoncentrationen i søvandet reduceret med mere end 90%.

#### Opløst fosfat, års- og sommermidler



**Figur 25.** Den tidsvægtede års- og sommermiddelkoncentration af fosfat i søvandet 1980, 1986 og 1989-2003.

Samme tydelige fald kan ikke spores i sommertidsgennemsnittet af opløst fosfat. Her faldt søvandskoncentrationen markant fra 1989 til 1992, men steg herefter igen de følgende to år. I 1995 og 1996 faldt søvandskoncentrationen dog igen markant, for herefter igen at stige i 1997 og 1998.


Sommertidsgennemsnittet har i de senere år igen været faldende og nåede i 2002 ned på 0,062 mg P/l, hvilket var overvågningsperiodens hidtil

absolut laveste. I 2003 var sommermiddelkoncentrationen med 0,085 mg P/l igen steget lidt.

Set over hele perioden 1989-2003 er der sket et signifikant fald i både års- og sommermiddelkoncentrationen af fosfat (lineær regressionsanalyse,  $P < 0,001$ ).

#### Total kvælstof

Modsat fosforkoncentrationen er kvælstofkoncentrationen i søvandet sædvanligvis højest i vinterperioden som følge af de høje kvælstofkoncentrationer i tilløbet i denne periode. Kvælstofkoncentrationen i søvandet i 2003 samt gennemsnittet for 1989-2002 er vist i figur 26.



**Figur 26.** Koncentrationen af kvælstof i søvandet i 2003 samt månedsgennemsnittet for 1989-2002 incl. 90-10% og 75-25% fraktiler.


Kvælstofkoncentrationerne lå i 2003 generelt noget under gennemsnittet for 1989-2002 på nærmest i august-september, hvor koncentrationen var lidt over gennemsnittet.

Den tidsvægtede års- og sommermiddelkoncentration af totalkvælstof i søvandet 1980, 1986 samt 1989-2003 er vist i figur 27.

Årsmiddelkoncentrationen af kvælstof i søvandet har i perioden efter 1993 generelt været lavere i søen bl.a. som følge af den tidligere nævnte reduktion i indløbskoncentrationen i forbindelse med etableringen af kvælstoffjernelse på Kallerup Renseanlæg. Årsmiddelkoncentrationen i 2003 på 3,32 mg N/l var overvågningsperiodens hidtil laveste.

Den tidsvægtede sommermiddelkoncentration af kvælstof i søvandet lå i perioden 1989-93 meget stabilt omkring 4 mg N/l, men faldt herefter i 1994 og 1995 til omkring 3 mg N/l som følge af markant lavere indløbskoncentrationer. I 1996 og 1997 steg sommermiddelkoncentrationen til de højeste værdier i perioden, omkring 4,6 - 5,0 mg N/l, hvilket bl.a. skyldtes disse to års meget massive blå-

grønalgeoplomstringer i sensommeren. Med knap så voldsomme blågrønalgeoplomstringer i de senere år er sommermiddelkoncentrationen af kvælstof igen tilbage omkring 3 mg N/l. Sommermiddelkoncentrationen af kvælstof i 2003 var med 3,12 mg N/l lidt højere end i 2002.



**Figur 27.** Den tidsvægtede års- og sommermiddelkoncentration af totalkvælstof i søvandet 1980, 1986 og 1989-2003.

Set for hele perioden 1989-2003 har både års- og sommermiddelkoncentrationer af kvælstof i søvandet været faldende (lineær regressionsanalyse,  $P < 0,01$ ).

#### Opløst uorganisk kvælstof


Langt hovedparten af den kvælstofmængde der tilføres søen, er på nitratform og stammer fra dyrkede arealer. Koncentrationen af uorganisk kvælstof i søen er derfor sædvanligvis høj i vinterperioden, hvor udvaskningen fra de dyrkede arealer er størst. I sommerperioden falder koncentrationen af uorganisk kvælstof i søvandet dels som følge af en lav tilførsel og dels som følge af denitriifikation samt algernes optag.

I figur 28 og 29 er vist søvandskoncentrationerne af henholdsvis nitrit-nitrat kvælstof og ammonium kvælstof. For begge gælder, at koncentrationerne i 2003 generelt var lave sammenlignet med gennemsnittet for de foregående år.


Koncentrationen af nitrat faldt i midten af juni til under detektionsgrænsen, hvor den forblev indtil slutningen af september.

Koncentrationen af ammonium faldt allerede i starten af marts ned under detektionsgrænsen, hvor den forblev indtil udgangen af november.

Uorganisk kvælstof var således også i 2003 potentielt begrænsende for algevæksten i store perioder af sommeren.



**Figur 28.** Koncentrationen af nitrit-nitrat kvælstof i søvandet i 2003 samt månedsgennemsnittet for 1989-2002 inkl. 90-10% og 75-25% fraktiler.




**Figur 29.** Koncentrationen af ammonium kvælstof i søvandet i 2003 samt månedsgennemsnittet for 1989-2002 inkl. 90-10% og 75-25% fraktiler.

Den gennemsnitlige års- og sommermiddelkoncentrationen af uorganisk kvælstof i perioden 1989-2003 er vist i figur 30. Årsmidlen steg kraftigt i starten af perioden for herefter at inndeude et ligeså kraftigt fald efter 1993, hvor der blev etableret kvælstofrensning på Kallerup renseanlæg.

I 1996 og 1997 nåede årsmidlerne ned på de hidtil laveste i overvågningsperioden, hvilket hovedsagelig skyldtes den lave kvælstofudvaskning som følge af de små nedbørsmængder i disse to år. I 1998 steg årsmiddelkoncentrationen igen som følge af en stor kvælstofudvaskning dette år. Siden 1998 har årsmiddelkoncentrationen igen været faldende og med omkring 2 mg N/l i niveau med midlen for 1995.

I 2003 var årsmiddelkoncentrationen af uorganisk kvælstof med 1,304 mg N/l noget lavere end i 2002, mens sommermiddelkoncentrationen med 0,136 mg N/l var i niveau med 2002.

## Uorganisk-N, års- og sommermidler




**Figur 30.** Den tidsvægtede års- og sommermiddelkoncentration af uorganisk kvælstof i søvandet 1989-2003.

Set for hele perioden 1989-2003 kan der ikke statistisk påvises en udvikling i hverken års- eller sommermiddelkoncentrationen af uorganisk kvælstof.

## 8.2 Øvrige målinger i søvandet

### Klorofyl

Søvandets indhold af klorofyl i 2003 sammenlignet med gennemsnittet for 1989-2002 er vist i figur 31. Klorofylindholdet i søvandet i 2003 var gennem hele året under gennemsnittet for 1989-2002.




**Figur 31.** Klorofylindholdet i søvandet i 2003 samt månedsgennemsnittet for 1989-2002 incl. 90-10% og 75-25% fraktiler.

Søvandets sommerindhold af klorofyl i 1980, 1986 og 1989-2003 er vist i figur 32. Det sommernemsnitlige klorofylindhold steg fra de første målinger i 1980 støt indtil 1992, hvor et foreløbigt maksimum på 400 µg/l blev nået. De følgende år faldt det sommernemsnitlige klorofylindhold i søvandet sammenfaldende med reduktionen i fosfor- og kvælstoftilførslen og nåede i 1994-95 ned på

omkring 150 µg/l, - eller mindre end en tredjedel af niveauet i 1992.

## Klorofyl-a, sommermidler



**Figur 32.** Den tidsvægtede sommermiddelkoncentration af klorofyl a i søvandet i 1980, 1986 og 1989-2003.

I de tørre år 1996 og 1997 var vandudskiftningen meget langsom i søen i sommerperioden og dette i kombination med nogle varme perioder skabte basis for nogle ekstremt store blågrønalgeoplomstringer i sensommeren i disse år. Det sommernemsnitlige klorofylindhold steg derfor pånår meget markant helt op til 381 µg/l i 1997. Siden 1998 har klorofylindholdet igen været i niveau med klorofylindholdet i 1994-95.

Det sommernemsnitlige klorofylindhold i 2003 på 146 µg/l var lidt lavere end klorofylindholdet i 2002.

Betrages perioden 1989-2003 kan der konstateres et signifikant fald i sommermidlen (lineær regressionsanalyse,  $P < 0,05$ ).


### Sigtdybde

Figur 33 viser udviklingen i sigtdybden i 2003 sammenlignet med månedsgennemsnittet for 1989-2002.

Sigtdybden var frem til midten af maj tæt på normalen, men steg herefter til 0,6 meter i juni, hvilket er noget bedre end normalt. Sigtdybden faldt herefter støt og nåede i august ned under 0,3 meter, hvor den holdt sig indtil udgangen af september. I oktober steg sigtdybden efter og nåede i midten af måneden op på 1 meter.


Den gennemsnitlige sommersigtdybde i 1980, 1986 og 1989-2003 er vist i figur 34.

Sommermiddelsigtdybden lå i perioden fra 1980-93 ret konstant omkring 0,35-0,45 m, men steg i 1994-95 til ca. 0,5 m.



**Figur 33.** Udviklingen i sigtdybden i 2003 samt månedsgennemsnittet for 1989-2002 incl. 90-10% og 75-25% fraktiler.

Som følge af de massive blågrønalgeoplomstrin- ger i sensomrene 1996 og 1997 faldt sommermid- delsigtdybden efter til mindre end 0,40 m. I perio- den 1998-2003 har sommersigtdybden ligget relativ konstant omkring 0,45 m. Sommersigtdybden i 2003 var med 0,44 meter stort set identisk med året før.



**Figur 34.** Den gennemsnitlige sommersigtdybde i 1983 og 1988-2003.

Samlet for perioden kan siges, at sigtdybden alle årene har været ringe. Statistisk kan der dog påvises en svagt signifikant stigning i sommersigtdybden i overvågningsperioden (lineær regresionsanalyse,  $P < 0,10$ ).

Selv om sigtdybden primært afspejler mængden af planteplankton er dette ikke den eneste faktor, der påvirker sigtdybden. Resuspension som følge af hård vind kan i perioder også påvirke sigtdybden.

## 9. Biologiske målinger i søen

I dette afsnit præsenteres resultaterne af de biologiske undersøgelser i 2003 samt udviklingen i perioden siden 1989.

Søens plante- og dyreplankton er siden 1989 undersøgt efter Miljøstyrelsens retningslinier /10,11/. Hvert års undersøgelser med artslister, volumenberegninger osv. er udarbejdet som interne rapporter. Vigtige nøgletal for planktonet findes i bilag 10.

Årstidsvariationer indenfor plante- og dyreplanktonets biomasser og artssammensætning er detaljeret beskrevet i tidligere rapporter. I det følgende er der derfor primært fokuseret på markante ændringer i perioden 1989-2003. Til vurderingen af hvorvidt der er sket signifikante ændringer, er anvendt lineær regressionsanalyse mellem tiden (år) og års- og sommernemsnit af planktonbiomassen og planktonsammensætningen.

Søens fiskebestand er undersøgt i 1990, 1996 og 2001 efter retningslinierne angivet i vejledningen for fiskeundersøgelser fra DMU /12/. Undersøgelserne er særskilt rapporteret i /13,14,15/. De vigtigste resultater vedrørende fiskeundersøgelserne er diskuteret i rapporterne /16,17/. Endelig er søens fiskeyngel hvert år siden 1998 undersøgt efter retningslinierne i vejledningen for fiskeyngelundersøgelser fra DMU /18/. Resultaterne fra fiskeyngelundersøgelsen i 2003 findes i bilag 11.

### 9.1 Planteplankton

#### Udvikling i biomasse og artssammensætning


Sommermiddelbiomassen af planteplankton lå i perioden 1989-93 ret stabilt omkring 30-45 mm<sup>3</sup>/l, men faldt så i 1994 til 20 mm<sup>3</sup>/l, der var periodens hidtil laveste sommermiddelbiomasse (figur 35).

I 1995 steg sommermiddelbiomassen atter til samme niveau som i de tidligere år som følge af en rekordstor blågrønalgeoplombomstring i august måned. Endnu værre blev det i 1996, hvor to meget store blågrønalgeoplombomstringer i henholdsvis juli og september resulterede i en ekstrem sommermiddelbiomasse på 87,5 mm<sup>3</sup>/l.

I 1997 og 1998 var algebiomassen påny i et normalt niveau for søen, men i 1999 faldt biomassen markant til 16,7 mm<sup>3</sup>/l, det laveste i perioden hidtil.

I 2000 og 2001 steg sommermiddelbiomassen atter til henholdsvis 22,7 mm<sup>3</sup>/l og 33,1 mm<sup>3</sup>/l. I 2002 var sommermiddelbiomassen med 28,6 mm<sup>3</sup>/l i niveau med midlen i de foregående par år, hvilket også var tilfældet med midlen i 2003 på 30,7 mm<sup>3</sup>/l.

Som det fremgår af figur 35, kan år til år variationerne i planteplanktonbiomassen siden starten af 1990'erne primært tilskrives udsving i blågrønalgebiomassen.




Figur 35. Tidsvægtede sommermiddelbiomasser af planteplankton 1989-2003.

Set over hele perioden 1989-2003 kan der statistisk ikke påvises en udvikling i sommermiddelbiomassen af planteplankton.

Betrages de enkelte algegrupper, har der imidlertid været tale om markante ændringer gennem perioden. Ændringen i algesammensætningen er illustreret i figur 36, der viser de enkelte algegruppers procentandel af sommermiddelbiomassen i perioden 1989-2003.

I begyndelsen af perioden var grønalgerne helt dominerende med omkring 85% af den samlede sommermiddelbiomasse. Denne dominans var svagt aftagende indtil 1993, hvor grønalernes tilbagegang for alvor tog fart sammenfaldende med, at næringsstofbelastningen til søen blev reduceret kraftigt. I stedet tog blågrønalgerne gradvist over og udgjorde mere end 70% af sommermiddelbiomassen fra 1996-98.

I 1999 skete et forbigående skifte imod dominans af grønalger, idet grønalger dette år udgjorde 51% af algebiomassen, mens blågrønalernes andel sideløbende faldt fra 73% i 1998 til kun 22% i 1999. At blågrønalgerne ikke dominerede planteplanktonbiomassen dette år hang antagelig sammen med en meget regnfuld august måned med deraffølgende hurtig vandudskiftning i søen i sensommeren, hvor blågrønalgerne normalt opbygger den største biomasse.



**Figur 36.** De enkelte algegruppers procentandel af planteplanktonbiomassen i sommerperioden 1989-2003.

I 2000 steg blågrønalgernes andel igen og med 52% af biomassen var denne algegruppe igen dominerende i søen. Samtidig faldt grønalgernes andel til 31%. Denne udvikling fortsatte i 2001, hvor blågrønalgerne dominans med knap 75% var endnu mere udtalt. I 2002 udgjorde blågrønalgerne 72% af sommermiddelbiomassen, mens grønalgernes andel af biomassen var faldet til 9%, svarende til en halvering i forhold til året før. I 2003 er blågrønalgernes andel med 75,5% næsten uændret i forhold til de sidste par år, mens grønalgernes andel med 12,6% er en lille stigning i forhold til året før.

Betrages hele perioden 1989-2003 er blågrønalgernes andel af sommerbiomassen steget signifikant, mens det omvendte er tilfældet for grønalgerne (lineær regressionsanalyse,  $P < 0,01$  henholdsvis  $P < 0,001$ ).

### Status 2003


Udviklingen i planteplanktonbiomassen i 2003 er vist i figur 37.

Biomassen var relativ lav i april og maj, hvor forskellige algegrupper, primært rekylalger, stilkalger, kiselalger og grønalger, skiftedes til at dominere.

Stilkalgen *Chrysochromulina parva* dominerede i midten af april, hvor denne alge udgjorde 47% af planteplanktonbiomassen. *Chrysochromulina parva* regnes for potentelt toksisk for fisk og er i masseforekomst sat i forbindelse med fiskedød /19/.

I juni begyndte biomassen at stige og nåede en foreløbig top i midten af måneden, hvor grønalger af slægten *Scenedesmus* dominerede. Herefter steg planteplanktonbiomassen kraftigt som følge af en opblomstring af blågrønalger, der kulminerede i august, hvor biomassen nåede helt op på 65  $\text{mm}^3/\text{l}$ . Herefter klingede biomassen af og var i

midten af oktober nede på 9  $\text{mm}^3/\text{l}$ . Biomassen steg herefter lidt igen i udgangen af oktober til 15  $\text{mm}^3/\text{l}$ .



**Figur 37.** Udviklingen i planteplanktonbiomassen i 2003.

Blandt blågrønalgerne dominerede den trådformede *Planktothrix agardhii*, der i sensommeren tegnede sig for 90% af den samlede planteplanktonbiomasse. *Planktothrix agardhii* forekom også i 2002 i næsten renkultur i søen og har også i tidligere år forekommet i meget betydelig mængde. Udover *Planktothrix agardhii* forekom andre trådformede blågrønalger tilhørende slægten *Anabaena* ligeledes i betydelige mængder.

Efter den store blågrønalgeopblomstring tog kiselalgerne over. Toppen her var domineret af centriske kiselalger af slægten *Stephanodiscus*.

### 9.2 Dyreplankton


#### Udvikling i biomasse og artssammensætning

Den sommernavnsmængde dyreplanktonbiomasse i perioden 1989-2003 er vist i figur 38.

Sommermiddelbiomassen var med 821  $\mu\text{g tv/l}$  lidt større end i 2002, men stadig overvågningsperiodes anden laveste. Selv om biomassen, som det fremgår af figuren, har varieret en del fra år til år, er der en tydelig tendens til faldende biomasser. Statistisk kan der da også påvises et signifikant fald i biomassen fra 1989 til 2003 (lineær regressionsanalyse,  $P < 0,01$ ).

Betrages de enkelte dyreplanktongrupper, er der sket markante ændringer i dyreplanktonsammensætningen. I begyndelsen af perioden bestod dyreplanktonets således helt overvejende af dafnier, men fra 1991 og frem til 1996 faldt dafniers biomasse markant, mens vandloppernes biomasse var nogenlunde uændret. Fra 1993 til 1996 bestod søens dyreplankton samfund således hovedsagligt af vandlopper.


Fra 1997 og til 1999 steg dafniernes biomasse igen, men er herefter igen generelt faldet. I 2003 er dafniernes biomasse mere end halveret i forhold til året før og med blot 105 µg tv/l overvågningsperiodes anden laveste.



**Figur 38.** Udviklingen i den sommernemsnitlige dyreplanktonbiomasse i 1989-2003.

Vandloppernes biomasse har siden 1998 generelt været lavere end i perioden 1991-1997. I 2003 var vandloppernes biomasse med 666 µg tv/l dog lidt større end i 2002. Hjuldyrene udgjorde i 2003 i lighed med de foregående år en meget lille del af dyreplanktonbiomassen.

Ændringerne i dyreplanktongruppernes andele af sommermiddelbiomassen fremgår af figur 39. Fra at have udgjort omkring 75% af sommermiddelbiomassen i 1989-90, var dafniernes andel af den samlede sommermiddelbiomasse nede på 7-15% i årene 1995-97. Samtidig øgedes vandloppernes andel fra 23% til mere end 80% i samme periode. Som følge af stigningen i dafniebiomassen 1997-99 steg dafniernes andel til 63% i 1999, mens vandloppernes andel tilsvarende faldt til 36%.




**Figur 39.** Udviklingen i de enkelte dyreplanktongruppers procentandel af sommermiddelbiomassen 1989-2003.

Siden 1999 er dafniernes andel generelt faldet igen og med en andel i 2003 på 13% er dafniernes andel tilbage i samme lave niveau som i perioden 1995-97.

Som i de foregående år var hjuldyrenes andel også i 2003 meget beskeden.

### Status 2003

Udviklingen i dyreplanktonbiomassen over året i 2003 er vist i figur 40. Udviklingen i biomassen var kendtegnet ved fire toppe i henholdsvis april, juni, august og september.



**Figur 40.** Udviklingen i dyreplanktonbiomassen i 2003.

Vandlopperne var stort set dominerende gennem hele perioden. Biomassen af vandlopper bestod næsten udelukkende af cyclopoide vandlopper, idet calanoide vandlopper kun forekom fåtalligt i midten af maj.

Blandt vandlopperne var den store *Cyclops vicinus* dominerende i foråret, mens den lille *Mesocyclops leuckarti* dominerede i sommerperioden. I efteråret dominerede skiftevis *Mesocyclops leuckarti* og *Acanthocyclops robustus*.

Dafniernes største biomasse forekom i slutningen af juni, hvor den lille snabeldafnie *Bosmina longirostris* udgjorde 43% af dyreplanktonbiomassen. *Bosmina longirostris* var som i de fleste foregående år den helt dominerende art blandt dafnierne.


Hjuldyrenes største biomasse forekom i midten af juni og slutningen af juli. I juni dominerede *Brachionus angularis*, *Keratella quadrata* og *Polyarthra dolichoptera*, mens *Keratella quadrata*, *Polyarthra dolichoptera* og *Polyarthra remata* dominerede i juli. I den resterende periode var biomassen af hjuldyr lav.

## Fødebegrensning

Mængden af umiddelbart tilgængelig føde for dyreplanktonet (alger mindre end 50 µm) var generelt høj gennem hele 2003 og dyreplanktonet var næppe på noget tidspunkt fødebegrænset.

## Græsning


Udviklingen i mængden af planteplankton og dyreplanktonets græsningstryk på planteplanktonet i 2003 er vist i figur 41. Planteplanktonet er på figuren opsplittet i alger mindre end 50 µm, der er den del af algerne som umiddelbart er spiselige for dyreplanktonet, og alger større end 50 µm.



**Figur 41.** Græsning (mg C/l/d) og mængden af planteplankton (mg C/l) i 2003.

Græsningstrykket på de små algeformer var generelt lavt gennem hele perioden og kun i april, juni og september, hvor græsningstrykket lå på 38-47%, kan dyreplanktonet have haft en mindre regulerende effekt på planteplanktonet. I den øvrige del af perioden var græsningstrykket meget lavt (< 18%).

Udviklingen i dyreplanktonets potentielle græsningstryk på planteplanktonet i perioden 1989-2003 er vist i figur 42.



**Figur 42.** Udviklingen i det sommernemsnitlige græsningstryk 1989-2003.

På figuren er dels angivet det potentielle græsningstryk på hele planteplanktonet og dels det potentielle græsningstryk på den del af algerne, der er umiddelbart spiselige for dyreplanktonet (alger mindre end 50 µm). De viste værdier på figuren er sommermidler for de enkelte år.

Som det fremgår af figuren, har det sommernemsnitlige græsningstryk været lavt gennem hele perioden og dyreplanktonets evne til at regulere planteplanktonet i søen har således i alle årene formodentlig været ret begrænset.

Det potentielle græsningstryk i 2003 på hele planteplanktonet var med 4,8% overvågningsperiodens hidtil laveste, mens det potentielle græsningstryk på alger mindre end 50 µm med 18,8% var mere gennemsnitligt.

Græsningstrykket udviser ingen entydig udvikling gennem perioden.

## 9.3 Fiskebestand

### Fiskeyngel

Søens fiskeyngel blev undersøgt i juli 2003 efter det standardiserede fiskeyngelundersøgelsesprogram /18/. Resultaterne er medtaget i bilag 11.

Der blev konstateret årsyngel fra tre arter; skalle, regnløje og aborre, hvortil kommer etårige regnløjer.

Den samlede yngeltæthed (inklusive etårige regnløjer) var 5,82 pr. m<sup>3</sup> i littoralen og 4,51 pr. m<sup>3</sup> i pelagiet (tabel 7), hvilket samlet set var markant mindre end i 2002. Tætheden af fiskeyngel er dog generelt steget i forhold til de første undersøgelsesår.

**Tabel 7.** Den beregnede tæthed af fiskeynglen i littoralen og pelagiet i juli 2003.

	Antal m <sup>3</sup>		Procent	
	Littora-len	Pelagiet	Littora-len	Pelagiet
Karpefisk	5,726	4,398	98	97
Aborre-fisk	0,095	0,115	2	3
Laksefisk	0	0	0	0
Andre	0	0	0	0
Total	5,821	4,513	100	100

Hovedparten af fangsten var regnløjer, der forekom i en høj tæthed over hele søen. Skalleynglen fandtes ligeledes i betydelige tætheder, især i littoralen. Samlet udgjorde regnløjer og skaller over 97% af fangsten, mens aborer kun udgjorde knap 3%.

Vægtmæssigt var tætheden 3,17 g vådvægt pr. m<sup>3</sup> i littoralen og 3,07 g vådvægt pr. m<sup>3</sup> i pelagiet (tabel 8), hvilket var lidt mere end i 2002.

**Tabel 8.** Den beregnede biomassetæthed af fiskeynglen i littoralen og pelagiet i juli 2003.

	Vådvægt g/ m <sup>3</sup>		Procent	
	Littora- len	Pelagiet	Littoralen	Pelagiet
Karpefisk	3,042	2,944	96	96
Abborrefisk	0,130	0,121	4	4
Laksefisk	0	0	0	0
Andre	0	0	0	0
Total	3,173	3,066	100	100

Sammenlignet med 16 andre danske søer, hvor der er foretaget yngelundersøgelser siden 1998, var tætheden af karpefiskeyngel meget høj, mens abborrefiskeynglens mængde var mere gennemsnitlig.

Fiskeynglens beregnede konsumptionsrate (inklusive etårige fisk) omkring 1. juli var med 41 mg tv/m<sup>3</sup>/d omkrent som i 2002 og fiskeynglen har næppe alene kunnet begrænse søens dyreplankton.

#### 9.4 Samspillet mellem stofkoncentrationer, plante- og dyreplankton samt fiskebestand

Samspillet mellem svovlrets næringsstofindhold, plankton og fisk er indgående diskuteret i rapporten fra 1997 /20/ samt forrige års rapport /17/. Der henvises derfor til disse for en mere indgående belysning af emnet. I dette afsnit er der lagt vægt på den seneste udvikling i perioden, hvor de vigtigste styrende faktorer kort er resumeret.

Selv om næringsniveauer i søen er reduceret markant gennem de seneste år, er svovlrets koncentrationer af både fosfor og kvælstof stadig så høje, at plantepunktonets sjældent er næringsbegrænset. Som følge af det faldende næringsniveau er der imidlertid sket et skifte i plantepunktonsammensætningen, fra en dominans af grønalger til en dominans af blågrønalger.

Både grønalger og blågrønalger trives erfaringsmæssigt ved det aktuelle næringsniveau, men hvor grønalger gennemgående er mere næringskrævende er de fleste blågrønalgerarter mere følsomme overfor turbulens, som følge blandt andet af en langsommere vækst. Den grønalgedominans der kunne iagttaes i 1999, var således sandsynligvis klimatisk bestemt og allerede i 2000 var blågrønalgerne tilbage i rollen som den dominerende algegruppe.

Samtidig med at blågrønalgerne er blevet mere og mere betydnende i søen, er dafniernes biomasse faldet markant. Dette hænger antagelig primært sammen med, at blågrønalger generelt udgør et dårligt fødegrundlag for dafnierne. Der er således en signifikant negativ sammenhæng mellem forekomsten af blågrønalger og dafnier i søen /21/.

Dyreplanktonets græsningstryk på algerne var også i 2003 lavt og dyreplanktonet har næppe spillet nogen særlig rolle i reguleringen af alger i søen.

Blandt dafnierne dominerer den lille snabeldafnie *Bosmina longirostris* helt og forekomsten af større dafnier af slægten *Daphnia* er som regel beskedent. Denne sammensætning indikerer et højt prædationstryk på dyreplanktonet fra fiskene.

Antallet af fiskeyngel i juli måned har generelt været stigende siden den første yngelundersøgelse i 1998. Dette har medført en tilsvarende stigning i fiskeynglens konsumptionsrate. I 2003 er den beregnede konsumptionsrate i samme størrelse som i 2002 og betydelig sammenlignet med de øvrige søer, hvor der er foretaget tilsvarende undersøgelser af fiskeynglen. Fiskeynglen er dermed teoretisk i stand til at lægge et kraftigt prædationstryk på dyreplanktonet.

Undersøgelsen i 2001 af hele søens fiskebestand viste bl.a., at rørsumpsfiskenes rekruttering har været ringe de senere år. Dette i kombination med søens store geddebestand, der til en vis grad er i stand til at holde mængden af fredsfisk nede i søen, har antagelig medført et formindsket prædationstryk på dyreplanktonet fra de større fisk's side i de senere år.

Selv om fiskebestanden samlet set påvirker dyreplanktonet gennem et formodentlig betydeligt prædationstryk, er fiskebestanden næppe hovedansvarlig for nedgangen i dyreplanktonets mængde gennem årene, der snarere skyldes skiftet fra grønalgedominans til blågrønalgedominans.

Sammenfattende har reduktionen i svovlrets indhold af næringsstoffer endnu ikke været stor nok til, at plantepunktonet i søen er blevet tilstrækkeligt næringsbegrænset. De kommende år vil derfor antagelig igen byde på nye massive blågrønalgeopblomstringer i søen og dette må forventes at fortsætte indtil fosforkoncentrationen i svovlretet når ned under de 150 µg P/l, der er målsætningen. Før dette sker vil dyreplanktonet næppe heller være i stand til at kontrollere plantepunktonet.

## 10. Konklusion

Set for perioden 1989-2003 er der sket en markant udvikling i fosfortilførslen, der i de seneste år har været 5-10% af tilførslen i 1989. Årsagen til den kraftige reduktion i fosfortilførslen er en forbedret spildevandsrensning i oplandet. I samme periode er kvælstoftilførslen fra punktkilder reduceret fra et niveau i starten af perioden omkring 20-35 ton til omkring 3-8 ton.

I takt med den faldende næringsstofkoncentration i søvandet skete der som forventet et skifte i søens planteplankton fra en dominans af grønalger til de lidt mindre næringskrævende blågrønalger. Blågrønalger har således, pånær i 1999, domineret i søen siden 1995.

Med mindre fosforniveauet reduceres ned til 0,15 mg P/l, der er kravet i henhold til søens målsætning, vil søen i de kommende år formodentlig fortsat få opblomstringer af blågrønalger om sommeren.

Den afgørende betingelse for, at søen kan komme ned på dette fosforniveau afhænger af indløbskoncentrationen af fosfor i søens tilløb og dermed af en yderligere reduktion af den eksterne fosfortilførsel. Hvornår søen herefter kommer ned på det nødvendige, lave fosforniveau i søvandet, afhænger af hvor hurtigt den potentielt frigivelige fosforpulje i søsedimentet bliver reduceret.

I takt med at den eksterne fosfortilførsel til søen er blevet reduceret, er den interne frigivelse af fosfor fra sedimentet blevet af større betydning for oprettholdelsen af et højt fosforniveau i søvandet. Gennem sommerperioden er det således overvejende denne fosforfrigivelse fra sedimentet, der betinger søvandets høje fosforindhold.

Søens indsvingningsperiode, dvs. perioden fra den eksterne tilførsel er reduceret tilstrækkeligt og indtil søens sediment har aflastet sin overskydende fosforpulje, er i 1993 beregnet til 20-25 år ved anvendelse af en computerbaseret dynamisk sømodel. Den faldende fosforfraførsel taget i betragtning vil denne tidshorisont næppe blive væsentligt kortere.

## 11. Referencer

- 1/ Miljøstyrelsen (2000). NOVA 2003. Programbeskrivelse for det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003. Redegørelse fra Miljøstyrelsen nr. 1.
- 2/ Danmarks Miljøundersøgelser (2004). Det NAtionale program for Overvågning af VAndmiljøet og NAturen. Programbeskrivelse del 1 og 2. [www.dmu.dk](http://www.dmu.dk).
- 3/ Københavns Amt, Frederiksborg Amt, Roskilde Amt (1989). Økologisk baggrundstilstand og udviklingshistorie. Søllerød Sø, Vejle Sø, Gundsømagle Sø, Sjælsø, Hornbæk Sø. Rapport udarbejdet af COWIconsult A/S, 1989.
- 4/ Roskilde Amtskommune (1982). Østrup-Gundsømagle Sø 1979-80. Rapport udarbejdet af Roskilde Amtskommunes miljøsektion for Hovedstadsrådet, oktober 1982.
- 5/ Danmarks Miljøundersøgelser (2003). Paradigma 2003. [www.dmu.dk](http://www.dmu.dk).
- 6/ Høy, T. og J. Dahl (1995). Danmarks søer. Søerne i Roskilde Amt, Københavns Kommune og Københavns Amt. Strandbergs Forlag.
- 7/ Danmarks Miljøundersøgelser (1999). Oplandsanalyse af vandløbs- og søoplante 1998-2003. Vandløb og søer. Teknisk anvisning fra DMU nr. 15.
- 8/ Roskilde Amt (1995). Vandmiljøovervågning. Gundsømagle Sø 1989-94.
- 9/ Kristensen, P., Jensen, J.P. & E. Jeppesen (1990). Eutrofieringsmodeller for søer. NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, nr. C9.
- 10/ Olrik, K. (1991). Plantoplankton-metoder. Prøvetagning, bearbejdning og rapportering ved undersøgelser af plantoplankton i søer og marine områder. Miljøprojekt nr. 187. Miljøstyrelsen.
- 11/ Hansen, A.-M., E. Jeppesen, S. Bosselmann & P. Andersen (1992). Zooplankton i søer - metoder og artslistes. Miljøprojekt 205. Miljøstyrelsen.
- 12/ Mortensen, E., H.J. Jensen, J.P. Müller & M. Timmermann (1990). Fiskeundersøgelser i søer. Undersøgelsesprogram, fiske-redskaber og metoder. Danmarks Miljøundersøgelser. Teknisk anvisning fra DMU, nr. 3.
- 13/ Roskilde Amt (1990). Fiskebestanden i Gundsømagle Sø, september 1990. Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium for Roskilde Amt.
- 14/ Roskilde Amt (1997). Fiskebestanden i Gundsømagle Sø, september 1996. Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium for Roskilde Amt.
- 15/ Roskilde Amt (2002). Fiskebestanden i Gundsømagle Sø, september 2001. Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium for Roskilde Amt.
- 16/ Roskilde Amt (1998). Vandmiljøovervågning. Gundsømagle Sø 1989-97.
- 17/ Roskilde Amt (2002). Vandmiljøovervågning. Gundsømagle Sø 1989-2001.
- 18/ Lauridsen T.L. (1998). Fiskeyngelundersøgelser i søer. Danmarks Miljøundersøgelser. Teknisk anvisning fra DMU.
- 19/ Hansen, L.R., J. Kristiansen & J.V. Rasmussen (1994). Potential toxicity of the freshwater *Chrysotrichomulina* species *C. parva* (Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157-159.
- 20/ Roskilde Amt (1997). Vandmiljøovervågning. Overvågning af søer 1996 samt temarapportering regionale søer. Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium for Roskilde Amt.
- 21/ Roskilde Amt (2000). Vandmiljøovervågning. Gundsømagle Sø 1989-99.

## **12. Bilagsfortegnelse**

1. Klimadata
2. Søkort og morfometriske data.
3. Oplandsstørrelse, areal- og jordtypefordeling.
4. Samleskema for vandføring og stofkoncentrationer i tilløbet Hove Å, station 777, i perioden 1989-2003.
5. Vand- og stofbalanceberegninger for 2003 opgjort på månedsbasis.
6. Samleskemaer for vand og stof 1989-2003. Års- og sommerværdier.
7. Beregningsmetode for vand- og stoftilførslen.
8. Kildeopsplitning.
9. Samleskema for fysisk-kemiske målinger 1989-2003.
10. Plankton.
11. Fiskeyngel 2003.
12. Oversigt over udførte undersøgelser i søen.



## Bilag 1

# KLIMADATA - Gundsømagle Sø

## Temperatur (grader C)

Måned	Normal 1961-90	2003
Jan	-0,4	-0,2
Feb	-0,3	-1,9
Mar	2,1	3,1
Apr	6	6,5
Maj	11,3	11,7
Jun	15,1	15,7
Jul	16,5	18,2
Aug	16,3	17,9
Sep	12,9	13,9
Okt	9,2	5,8
Nov	4,6	6,6
Dec	1,3	3,5
År	7,9	8,4
Sommer	14,4	15,5

## Solskinstimer

Målestation: Københavns Lufthavn

Måned	Normal 1961-90	2003
Jan	43	33
Feb	68	84
Mar	117	186
Apr	185	249
Maj	249	261
Jun	259	292
Jul	244	295
Aug	233	304
Sep	158	216
Okt	103	125
Nov	57	27
Dec	38	48
År	1754	2120
Sommer	1143	1368

## Globalindstråling (MJ/m<sup>2</sup>)

Måned	Normal	2003
Jan		49
Feb		120
Mar		325
Apr		480
Maj		557
Jun		633
Jul		594
Aug		526
Sep		361
Okt		205
Nov		53
Dec		36
År		3940
Sommer		2671

## Hård vind målt ved Ledreborg Alle

(DMI 30421 Ledreborg Alle II)

% vindhastigheder lig med eller over 10,8 m/s

Måned	Normal 1989 - 98	2003
jan	5,7	4,1
feb	5,2	1,3
mar	5,2	2,2
apr	1,6	2,3
maj	0,5	0,6
jun	0,2	1,1
jul	0,0	0,1
aug	0,1	0,6
sep	0,3	0,2
okt	1,2	1,4
nov	1,3	0,7
dec	2,0	2,0

## Potentiel fordampning (mm)


Måned	Normal 1961-90	2003
Jan	5	6
Feb	11	13
Mar	29	42
Apr	55	69
Maj	86	92
Jun	101	114
Jul	103	112
Aug	82	99
Sep	50	63
Okt	26	29
Nov	10	8
Dec	4	5
År	562	651
Sommer	422	480

## Nedbør (mm)

Måned	Normal 1961-90	2003
Jan	45	57
Feb	28	4
Mar	37	10
Apr	36	49
Maj	42	69
Jun	50	52
Jul	65	60
Aug	62	46
Sep	57	63
Okt	53	40
Nov	57	39
Dec	54	42
År	586	532
Sommer	276	290

## Bilag 2

Indtegningen af rørsumps ydergrænse mod åbent vand (prælinie) såvel som øvrige begrænsningslinier, er foretaget på grundlag af en speciel luftfotoatfering 9. juli 1981 kombineret med markinventering. Det skal dog bemærkes, at afgrensningerne mod land af rørsump/hængesæk-arealerne er behæftet med en betydelig usikkerhed især mod nordvest, idet tagrørshætet her har en væsentlig større udstrækning.



Ekkolodning foretaget sep. 1981  
ved vandspejl 3.9m over DNN (GJ)  
Publiceret okt. 1981 af landinspektør  
Th. Høy for Hovedstadsrådet.

1:5000



## Gundsømagle Sø

Morfometriske data bestemt efter kort i 1:5000 udarbejdet af Thorkild Høy i 1981.

Alle beregninger er foretaget ud fra en vandstand ved 3,900 m over DNN.

Ved beregning af søareal, volumen og middeldybde forudsættes vanddybden 0 m at findes på rørsump/hængesækkens afgrænsning mod søen.

Søareal	
- Fri vandflade:	ca. 26 ha
- Fri vandflade + rørsump:	ca. 32 ha
- Fri vandflade + rørsump + hængesæk:	ca. 207 ha
Vanddybde	
- Middeldybde:	1,20 m
- Max. dybde:	1,90 m
Vandvolumen:	ca. 375.000 m <sup>3</sup>
Vandstandskoter iflg. regulativ (m over DNN)	
- 1/10 - 15/3:	4,076 - 4,232
- 15/3 - 1/10:	3,866 - 4,023
Kystlængde	
- Afgrænsning af rørsump/hængesæk mod sø:	ca. 3.600 m
- Afgrænsning af rørsump mod sø:	ca. 3.400 m



## Bilag 3

Gundsømagle Sø. Topografisk opland, jordtypefordeling og arealudnyttelse.						
OPLAND TIL:	Hove Å, st. 777		Deloplund direkte til sø		Samlet opland	
ENHED:	km <sup>2</sup>	%	km <sup>2</sup>	%	km <sup>2</sup>	%
TOTAL AREAL:	54,66	100	11,43	100	66,09	100
<b>JORDTYPEFORDELING:</b>						
1) Grovsandet jord	-	-	-	-	-	-
2) Finsandet jord	-	-	-	-	-	-
3) Lerblændet sandjord	6,45	11,8	1,10	9,6	7,55	11,4
4) Sandblændet lerjord	18,78	34,4	6,85	60,0	25,63	38,8
5) Lerjord	15,19	27,8	1,56	13,7	16,75	25,4
6) Svær lerjord	-	-	-	-	-	-
7) Humus	6,33	11,5	1,61	14,1	7,94	12,0
8) Kalkrig jord	-	-	-	-	-	-
Ikke klassificeret	7,92	14,5	0,30	2,6	8,22	12,4
<b>AREALUDNYTTELSE:</b>						
Åben bebyggelse	4,79	8,8	-	-	4,79	7,2
Sommerhuse	-	-	0,07	0,6	0,07	0,1
Industri og handel	0,07	0,1	-	-	0,07	0,1
Råstofgrave	0,80	1,5	-	-	0,80	1,2
Dyrket land	35,81	65,5	9,16	80,1	44,98	68,1
Frugt- og bærplantager	0,39	0,7	-	-	0,39	0,6
Blandet landbrug og natur	8,86	16,2	0,31	2,7	9,17	13,9
Løvskov	2,24	4,1	-	-	2,24	3,4
Blandet kratskov	1,40	2,6	-	-	1,40	2,1
Ferske enge	-	-	1,63	14,3	1,63	2,5
Mose og kær	0,29	0,5	-	-	0,29	0,4
Søer	-	-	0,26	2,3	0,26	0,4

Det samlede opland til Gundsømagle Sø er defineret som:

Det målte opland til Hove Å, st. 787, Gundsøgård (Corine opmålt)

excl:

- det målte opland til Gundsømagle Rende (kvl. 124).
- det målte direkte opland til Hove Å fra søudløb (st. 6981 m i avl. nr. 1 Hove Å) til Hove Å, st. 787, Gundsøgård.

## Bilag 4

Hove Å station 777

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Vandføring															
Årsmiddel (l/s)	86,2	113,5	156,6	140,7	236,7	409,9	309,4	81,7	68,5	226,8	244,2	211,5	207,4	438,4	196,1
Sommermiddel (l/s)	29,5	22,1	36,1	75,6	117,4	121,9	62,3		49,7	70,3	86,2	46,7	96,0	183,0	150,6
Total-P															
Års middelkoncentration (mg/l)	4,862	4,130	1,910	0,849	1,636	0,312	0,216	0,210	0,210	0,171	0,178	0,153	0,216	0,167	0,190
Sommermiddelkoncentration (mg/l)	6,047	6,882	2,628	1,017	3,326	0,471	0,270	0,250	0,255	0,212	0,218	0,157	0,221	0,192	0,191
Vandføringsvægtet års middelkonz. (mg/l)	3,480	1,960	1,410	0,520	0,400	0,193	0,145	0,196	0,179	0,147	0,144	0,139	0,213	0,144	0,184
Opløst fosfatfosfor															
Års middelkoncentration (mg/l)	4,451	3,758	1,733	0,700	1,412	0,208	0,119	0,100	0,101	0,077	0,066	0,053	0,061	0,071	0,062
Sommermiddelkoncentration (mg/l)	5,610	6,271	2,423	0,863	2,954	0,347	0,164	0,114	0,140	0,113	0,090	0,064	0,076	0,098	0,071
Vandføringsvægtet års middelkonz. (mg/l)	3,100	1,770	1,250	0,380	0,310	0,114	0,067	0,084	0,086	0,053	0,050	0,043	0,044	0,021	0,047
Part-P															
Års middelkoncentration (mg/l)	0,411	0,372	0,177	0,149	0,224	0,104	0,097	0,110	0,109	0,094	0,112	0,100	0,155	0,096	0,128
Sommermiddelkoncentration (mg/l)	0,437	0,611	0,205	0,154	0,372	0,124	0,106	0,136	0,125	0,099	0,128	0,093	0,145	0,094	0,120
Vandføringsvægtet års middelkonz. (mg/l)	0,380	0,190	0,160	0,140	0,100	0,079	0,078	0,113	0,094	0,094	0,094	0,096	0,168	0,123	0,137
Total-N															
Års middelkoncentration (mg/l)	13,028	13,876	12,240	14,049	10,234	5,336	4,669	3,964	4,571	6,669	5,594	5,210	4,912	4,817	4,251
Sommermiddelkoncentration (mg/l)	11,930	14,969	12,519	13,719	9,532	3,185	3,268	2,659	3,081	3,767	4,417	3,809	4,014	3,897	3,875
Vandføringsvægtet års middelkonz. (mg/l)	12,921	13,150	12,227	13,012	9,987	7,440	6,777	4,430	6,103	8,652	6,969	5,760	5,633	4,766	

## Bilag 5

## Vandbalance Gundsømagle Sø 2003

Alle værdier i 1000m<sup>3</sup>

	Nedbør x søareal	Fordampn. x søareal	Direkte tilførsel	Målt tilløb	Umråbt oplund	Samlet ekstern tilførsel (i seafløb)	Fraførsel	Magasin	"Grundvand" (+ indsvinng - udsivning)	Samlet tilførsel (ekstern + indsvinng)	Samlet fraførsel (seafløb + udsivning)
Jan	21	2	0	1.461	37	1.517	1.911	3	421	1.938	1.911
Feb	1	4	0	784	20	801	1.008	-22	197	998	1.008
Mar	4	13	0	641	16	647	1.084	-44	402	1.050	1.084
Apr	18	22	0	413	11	419	442	12	42	461	442
Maj	26	29	0	1.053	27	1.075	1.100	-21	20	1.095	1.100
Jun	19	37	0	302	8	292	319	-11	21	313	319
Jul	22	36	0	279	7	273	317	2	51	324	317
Aug	17	32	0	99	3	88	74	-9	-21	88	95
Sep	23	20	0	259	7	268	211	25	-29	268	240
Okt	15	9	0	222	6	233	30	25	-176	233	205
Nov	15	3	0	267	7	286	332	4	54	340	332
Dec	16	2	0	407	0	421	638	23	240	661	638
År	197	209	0	6.185	147	6.320	7.464	-13	1.222	7.768	7.690
Sommer	108	154	0	1.991	51	1.996	2.021	-14	42	2.088	2.070

## Stofbalance Gundsømagle Sø 2003

TOTAL FOSFOR

Alle værdier i kg

	Atm. deposition (kg)	Umråbt oplund (kg)	Målt tilløb (kg)	Fraløb (kg)	"Grundvand" (kg)	Magasin (kg)	Retention (kg)	Magasin + retention (kg)
Jan	0	9	201	205	66	-15	86	71
Feb	0	7	146	88	44	-3	112	110
Mar	0	4	153	107	98	8	141	149
Apr	0	3	80	60	8	40	-9	31
Maj	0	8	231	243	4	-3	3	0
Jun	0	3	62	65	4	31	-28	4
Jul	0	4	61	116	11	32	-72	-40
Aug	0	2	16	29	-12	102	-125	-23
Sep	0	4	42	137	-19	-16	-94	-110
Okt	0	4	34	13	-76	-87	37	-50
Nov	0	2	52	77	11	-45	33	-12
Dec	0	3	63	106	38	-13	10	-2
År	4	52	1.140	1.246	178	32	96	128
Sommer	2	20	411	591	-11	146	-315	-169

## Stofbalance Gundsømagle Sø 2003

TOTAL KVÆLSTOF

Alle værdier i kg

	Atm. deposition (kg)	Umråbt oplund (kg)	Målt tilløb (kg)	Fraløb (kg)	"Grundvand" (kg)	Magasin (kg)	Retention (kg)	Magasin + retention (kg)
Jan	40	617	8.117	9.772	2.285	67	1.220	1.287
Feb	40	310	4.861	5.589	1.197	-997	1.815	818
Mar	40	223	3.119	3.545	1.954	-599	2.388	1.790
Apr	40	108	1.561	967	158	-240	1.139	899
Maj	40	355	4.518	2.925	84	198	1.874	2.072
Jun	40	151	1.130	765	77	-188	822	634
Jul	40	148	1.137	1.201	207	254	76	330
Aug	40	35	339	513	-86	436	-620	-184
Sep	40	83	1.068	825	-119	-391	638	246
Okt	40	49	794	101	-303	-478	957	479
Nov	40	89	960	629	194	228	425	653
Dec	40	150	1.875	1.795	1.071	1.313	29	1.341
År	480	2.317	29.478	28.628	6.717	-397	10.762	10.364
Sommer	200	772	8.192	6.229	163	308	2.789	3.097

## Stofbalance Gundsømagle Sø 2003

JERN

Alle værdier i kg

	Atm. deposition (kg)	Umråbt oplund (kg)	Målt tilløb (kg)	Fraløb (kg)	"Grundvand" (kg)	Magasin (kg)	Retention (kg)	Magasin + retention (kg)
Jan	0	7	1.887	758	631	-56	1.823	1.766
Feb	0	3	1.524	424	479	-39	1.621	1.582
Mar	0	2	1.705	292	1.100	128	2.389	2.516
Apr	0	2	943	83	95	-26	983	957
Maj	0	6	2.311	379	44	-47	2.029	1.982
Jun	0	2	488	86	33	-16	453	437
Jul	0	2	486	57	87	-2	520	517
Aug	0	0	107	9	-7	-77	168	91
Sep	0	1	154	24	-6	-19	144	125
Okt	0	1	339	4	-26	36	273	309
Nov	0	1	236	61	45	-67	288	221
Dec	0	1	598	106	352	291	554	846
År	0	26	10.778	2.282	2.828	105	11.245	11.350
Sommer	0	11	3.545	555	151	-161	3.313	3.152

## Bilag 6

Arsopgørelse TOTAL-P

Punkt-kilder (kg)	Atm.- dep. (kg)	Umält oplænd (kg)	Tillob (kg)	Fralob (kg)	"Grund- vand" (kg)	Magasin (kg)	Retention Magasin + retention (kg)	Magasin %	Retention Magasin + retention (kg)	Magasin %	Samlet tilførsel (kg)	Samlet fraførsel (kg)	Retention Magasin + retention (kg/m2/år)	Magasin + retention (g/m2/år)	Gundsømagle Sø indløbskoncentration (mg/l)	
1980																
1986	29	5	21	9.461	3.106	-1.224	319	4.866	51,1	5.400	45,5	11.880	6.400	37,13	1.616	
1988	28	5	16	7.026	5.845	1.644	-370	3.243	2.873	1.900	20,4	9.300	29,06	37,13	1.590	
1989	29	5	16	5	6.980	7.048	1.180	-122	1.275	1.153	54,5	9.516	4.330	29,74	5,94	
1990	28	6	20	5	2.338	2.709	-61	-320	-371	-13,3	14,1	8.718	5.845	27,24	10,13	
1991	16	5	20	6	7.048	1.180	-122	-320	-371	-13,3	2.399	8.201	7.048	25,63	3,98	
1992	25	6	30	5	3.004	3.121	-252	-171	-108	-27,9	-51,4	2.399	2.770	7,50	-1,00	
1993	10	5	76	98	2.489	3.399	-351	-8	-1.123	-1.131	-42,9	3.094	3.373	9,67	-0,34	
1994	25	6	76	1.416	2.271	-91	92	-93,1	-839	-61,2	-55,1	2.619	2.619	8,19	-3,51	
1995	24	6	21	506	1.123	-154	-38	-683	-720	-122,6	-129,3	1.523	2.362	4,76	-2,91	
1996	23	6	20	387	698	-90	-51	-316	-367	-75,2	-87,3	557	1.277	1,74	-2,13	
1997	7	6	4	59	1.051	1.546	116	-32	-286	-318	-23,3	421	788	1,31	-0,99	
1998	0	4	62	1.111	1.494	147	-5	-165	-170	-12,4	-25,8	1.229	1.546	3,84	-2,45	
1999	0	4	54	932	1.434	348	28	-124	-124	-12,8	-12,8	1.324	1.494	4,14	-0,51	
2000	0	4	53	1.391	1.292	-21	368	-96	-9,3	-7,2	-1.337	1.434	4,18	-0,39		
2001	0	4	120	1.996	2.004	-354	-16	-222	-239	-22,4	-21,2	1.639	1.292	5,12	-1,15	
2002	0	4	52	1.140	1.246	178	32	96	128	7,0	9,3	1.373	1.246	4,29	0,30	
2003	0	2	20	411	591	-315	-11	-169	-72,7	-39,1	-39,1	433	602	0,40	0,40	
<b>Sommeropgørelse TOTAL-P</b>																
Punkt-kilder (kg)	Atm.- dep. (kg)	Umält oplænd (kg)	Tillob (kg)	Fralob (kg)	"Grund- vand" (kg)	Magasin (kg)	Retention Magasin + retention (kg)	Magasin %	Retention Magasin + retention (kg)	Magasin %	Samlet tilførsel (kg)	Samlet fraførsel (kg)	Retention Magasin + retention (kg/m2/år)	Magasin + retention (g/m2/år)	Gundsømagle Sø indløbskoncentration (mg/l)	
1980																
1986	12	2	2	2.321	167	-308	475	1.385	1.861	59,3	79,6	2.336	476	7,30	4,33	
1988	12	2	1	1.805	394	-126	250	1.050	1.299	57,7	71,4	1.820	520	5,69	3,28	
1989	7	2	2	2.614	2.011	226	155	683	838	24,0	29,4	2.850	2.011	8,90	2,13	
1990	11	3	10	381	253	-164	80	-93	-13	-22,9	-3,1	404	417	1,26	-0,29	
1991	11	3	15	1.340	716	-351	-77	371	294	27,3	21,6	1.361	1.066	4,25	-0,79	
1992	4	2	15	668	978	-464	98	-841	-743	-120,3	-106,3	699	1.442	2,18	-2,13	
1993	11	3	18	419	764	-192	174	-683	-509	-152,8	-113,9	447	956	1,40	-0,99	
1994	11	3	15	419	764	-40	236	-317	-81	-141,8	-36,1	224	304	0,70	-0,99	
1995	10	3	8	204	43	-78	56	-194	-138	-103,8	-73,8	187	326	0,59	-0,79	
1996	10	3	8	204	43	-78	56	-194	-138	-103,8	-73,8	187	326	0,59	-0,79	
1997	3	3	7	175	248	-78	151	-31	-247	-197,7	-122,8	201	448	0,63	-1,24	
1998	0	2	10	189	417	-31	151	-398	-841	-743	-120,3	699	1.442	2,18	-2,63	
1999	0	2	13	255	610	47	111	-405	-294	-128,3	-93,2	315	610	0,99	-1,59	
2000	0	2	8	99	484	43	-323	-280	-158,4	-137,3	204	484	0,64	-1,01		
2001	0	2	15	293	527	-9	99	-326	-227	-105,4	-73,4	309	536	0,97	-1,02	
2002	0	2	30	482	772	-87	90	-435	-346	-84,8	-67,4	513	859	1,60	-1,36	
2003	0	2	20	411	591	-11	146	-315	-169	-72,7	-39,1	433	602	1,35	-0,98	
<b>Gundsømagle Sø</b>																
Punkt-kilder (kg)	Atm.- dep. (kg)	Umält oplænd (kg)	Tillob (kg)	Fralob (kg)	"Grund- vand" (kg)	Magasin (kg)	Retention Magasin + retention (kg)	Magasin %	Retention Magasin + retention (kg)	Magasin %	Samlet tilførsel (kg)	Samlet fraførsel (kg)	Retention Magasin + retention (kg/m2/år)	Magasin + retention (g/m2/år)	Gundsømagle Sø indløbskoncentration (mg/l)	
1980																
1986	12	2	1	2.321	167	-308	475	1.385	1.861	59,3	79,6	2.336	476	7,30	4,33	
1988	12	2	1	1.805	394	-126	250	1.050	1.299	57,7	71,4	1.820	520	5,69	3,28	
1989	7	2	2	2.614	2.011	226	155	683	838	24,0	29,4	2.850	2.011	8,90	2,13	
1990	11	3	10	381	253	-164	80	-93	-13	-22,9	-3,1	404	417	1,26	-0,29	
1991	11	3	15	1.340	716	-351	-77	371	294	27,3	21,6	1.361	1.066	4,25	-0,79	
1992	4	2	15	668	978	-464	98	-841	-743	-120,3	-106,3	699	1.442	2,18	-2,63	
1993	11	3	18	419	764	-192	174	-683	-509	-152,8	-113,9	447	956	1,40	-0,99	
1994	11	3	15	419	764	-40	236	-317	-81	-141,8	-36,1	224	304	0,70	-0,99	
1995	10	3	8	204	43	-78	56	-194	-138	-103,8	-73,8	187	326	0,59	-0,79	
1996	10	3	8	204	43	-78	56	-194	-138	-103,8	-73,8	187	326	0,59	-0,79	
1997	3	3	7	175	248	-78	151	-31	-247	-197,7	-122,8	201	448	0,63	-1,24	
1998	0	2	10	189	417	-31	151	-398	-841	-743	-120,3	699	1.442	2,18	-2,63	
1999	0	2	13	255	610	47	111	-405	-294	-128,3	-93,2	315	610	0,99	-1,59	
2000	0	2	8	99	484	43	-323	-280	-158,4	-137,3	204	484	0,64	-1,01		
2001	0	2	15	293	527	-9	99	-326	-227	-105,4	-73,4	309	536	0,97	-1,02	
2002	0	2	30	482	772	-87	90	-435	-346	-84,8	-67,4	513	859	1,60	-1,36	
2003	0	2	20	411	591	-11	146	-315	-169	-72,7	-39,1	433	602	1,35	-0,98	
<b>Gundsømagle Sø</b>																
Punkt-kilder (kg)	Atm.- dep. (kg)	Umält oplænd (kg)	Tillob (kg)	Fralob (kg)	"Grund- vand" (kg)	Magasin (kg)	Retention Magasin + retention (kg)	Magasin %	Retention Magasin + retention (kg)	Magasin %	Samlet tilførsel (kg)	Samlet fraførsel (kg)	Retention Magasin + retention (kg/m2/år)	Magasin + retention (g/m2/år)	Gundsømagle Sø indløbskoncentration (mg/l)	
1980																
1986	12	2	1	2.321	167	-308	475	1.385	1.861	59,3	79,6	2.336	476	7,30	4,33	
1988	12	2	1	1.805	394	-126	250	1.050	1.299	57,7	71,4	1.820	520	5,69	3,28	
1989	7	2	2	2.614	2.011	226	155	683	838	24,0	29,4	2.850	2.011	8,90	2,13	
1990	11	3	10	381	253	-164	80	-93	-13	-22,9	-3,1	404	417	1,26	-0,29	
1991	11	3	15	1.340	716	-351	-77	371	294	27,3	21,6	1.361	1.066	4,25	-0,79	
1992	4	2	15	668	978	-464	98	-841	-743	-120,3	-106,3	699	1.442	2,18	-2,63	
1993	11	3	18	419	764	-192	174	-683	-509	-152,8	-113,9	447	956	1,40	-0,99	
1994	11	3	15	419	764	-40	236	-317	-81	-141,8	-36,1	224	304	0,70	-0,99	
1995	10	3	8	204	43	-78	56	-194	-138	-103,8	-73,8	187	326	0,59	-0,79	
1996	10	3	8	204	43	-78	56	-194	-138	-103,8	-73,8	187	326	0,59	-0,79	
1997	3	3	7	175	248	-78	151	-31	-247	-197,7	-122,8	201	448	0,63	-1,24	
1998	0	2	10	189	417	-31	151	-398	-841	-743	-120,3	699	1.442	2,18	-2,63	
1999	0	2	13	255	610	47	111	-405	-294	-128,3	-93,2	315	610	0,99	-1,59	
2000	0	2	8	99	484	43	-323	-280	-158,4	-137,3	204	484	0,64	-1,01		
2001	0	2	15	293	527	-9	99	-326	-227	-105,4	-73,4	309	536</			

## Årsopgørelse TOTAL-N

Punktkilder (kg)	Atm. dep. (kg)	Umält oplund (kg)	Tilløb (kg)	Fraløb (kg)	"Grundvand" (kg)	Magasin (kg)	Retention (kg)	Magasin + retention (kg)	Retention % %	Magasin + retention (kg)	Retention % %	Samlet tilførsel (kg)	Samlet fraførsel (kg)	Retention (kg/m2/år)	Magasin + retention (g/m2/år)	Magasin (g/m2/år)	Vandføringsvægtet indløbskoncentration (mg/l)
1980																	
1986	64	442	430	35.327	9.671	-2.350	529	23.713	20.700	64.1	105.600	70.700	39.500	330.00	220.94	14.365	
1988	66	442	459	47.282	35.784	12.051	1.530	22.985	24.241	65.4	19.8	104.600	83.900	326.88	9.523	10.018	
1990	58	442	1.142	60.922	41.834	10.987	-1.568	33.285	31.717	45.3	66.9	36.262	12.021	113.32	74.10	203.02	
1991	100	480	2.246	58.949	42.880	7.364	2.453	23.807	26.260	34.4	43.1	73.550	41.834	229.85	104.02	12.892	
1992	52	480	2.467	74.549	59.863	2.344	-1.060	21.089	20.029	26.4	25.1	79.892	59.863	249.66	65.90	13.175	
1993	136	640	4.693	96.249	94.597	6.699	-1.300	15.089	13.790	13.9	12.7	108.386	94.597	338.71	47.15	12.295	
1994	151	640	3.608	66.121	67.017	8.085	-2.192	13.781	11.588	17.5	14.7	78.605	67.017	245.64	43.06	99.12	
1995	144	640	934	11.414	8.839	-556	588	3.149	3.737	24.0	28.5	13.132	9.395	41.04	9.84	82.06	
1996	26	640	812	13.177	7.982	-69	1.478	5.127	6.604	35.0	45.1	14.655	8.051	45.80	16.02	13.062	
1997	0	480	2.472	61.876	54.613	11.419	-90	21.723	21.633	28.5	28.4	76.247	54.613	238.27	67.89	10.060	
1998	0	480	2.810	53.682	51.111	8.524	-784	15.170	14.385	23.2	22.0	65.496	51.111	204.67	47.40	12.919	
1999	0	480	2.378	42.936	41.080	13.846	48	18.512	18.560	31.0	31.1	59.640	41.080	186.37	57.85	7.614	
2000	0	480	2.298	37.668	33.114	6.801	-53	14.186	14.133	30.0	29.9	47.248	33.114	147.65	44.33	36.21	
2001	0	480	4.833	77.872	71.918	-7.506	-492	4.253	3.761	5.1	4.5	83.185	79.424	259.95	13.29	6.968	
2002	0	480	2.317	29.478	28.628	6.717	-397	10.762	10.364	27.6	26.6	38.992	28.628	121.85	33.63	5.021	
2003	0	480															

## Sommeropgørelse TOTAL-N

Punktkilder (kg)	Atm. dep. (kg)	Umält oplund (kg)	Tilløb (kg)	Fraløb (kg)	"Grundvand" (kg)	Magasin (kg)	Retention (kg)	Magasin + retention (kg)	Retention % %	Magasin + retention (kg)	Retention % %	Samlet tilførsel (kg)	Samlet fraførsel (kg)	Retention (kg/m2/år)	Magasin + retention (g/m2/år)	Magasin (g/m2/år)	Vandføringsvægtet indløbskoncentration (mg/l)
1980																	
1986	27	185	29	4.643	914	-970	-415	3.414	3.000	69.9	61.4	4.884	1.884	15.26	10.67	29.23	9.37
1988	28	185	15	4.163	98	-433	-170	3.138	2.969	71.5	67.6	4.390	1.421	13.72	9.81	26.87	9.28
1990	24	185	55	13.998	6.171	2.332	-747	11.170	10.423	67.3	62.8	16.594	6.171	51.86	34.91	32.57	14.231
1991	42	201	593	5.896	1.370	-916	-1.564	6.009	4.445	89.3	66.0	6.731	2.286	21.03	18.78	51.45	12.020
1992	22	201	341	7.254	2.323	-1.138	389	3.968	4.356	50.8	55.7	7.818	3.461	24.43	12.40	33.97	12.187
1993	57	268	596	5.634	3.958	-1.109	-108	1.596	1.488	24.3	22.7	6.555	5.067	20.49	4.99	13.67	7.408
1994	63	268	647	6.753	3.670	-922	-237	3.377	3.140	43.7	40.6	7.732	4.582	24.16	10.55	4.427	3.914
1995	60	268	337	2.795	2.739	-92	1.520	-891	628	-25.8	18.2	3.460	2.831	10.81	-2.79	-7.63	3.710
1996	11	268	287	2.308	1.250	-692	953	-20	932	-0.7	32.4	1.942	8.98	-0.06	-0.18	2.91	3.849
1997	0	200	370	3.854	2.616	-153	-855	2.510	1.655	56.7	37.4	4.424	2.769	13.83	7.84	21.49	5.17
1998	0	200	458	5.417	3.988	1.193	-194	3.473	3.279	47.8	45.1	7.267	3.988	22.71	10.95	29.74	10.25
1999	0	200	253	2.368	2.886	2.098	49	1.984	2.032	40.3	41.3	4.919	2.886	15.37	6.20	28.91	4.477
2000	0	200	474	5.944	3.537	468	-183	3.731	3.548	52.7	50.1	7.086	3.537	22.14	-2.79	16.99	6.35
2001	0	200	945	9.469	6.741	-704	259	2.910	3.169	27.4	29.9	10.613	7.445	33.17	11.66	31.95	4.134
2002	0	200	772	8.192	6.229	163	308	2.789	3.097	29.9	33.2	9.326	6.229	29.15	8.72	24.92	4.929
2003	0	200															

Punktkilder (kg)	Atm. dep. (kg)	Umält oplund (kg)	Tilløb (kg)	Fraløb (kg)	"Grundvand" (kg)	Magasin (kg)	Retention (kg)	Magasin + retention (kg)	Retention % %	Magasin + retention (kg)	Retention % %	Samlet tilførsel (kg)	Samlet fraførsel (kg)	Retention (kg/m2/år)	Magasin + retention (g/m2/år)	Magasin (g/m2/år)	Vandføringsvægtet indløbskoncentration (mg/l)
1980																	
1986	27	185	29	4.643	914	-970	-415	3.414	3.000	69.9	61.4	4.884	1.884	15.26	10.67	29.23	9.37
1988	28	185	15	4.163	98	-433	-170	3.138	2.969	71.5	67.6	4.390	1.421	13.72	9.81	26.87	9.28
1990	24	185	55	13.998	6.171	2.332	-747	11.170	10.423	67.3	62.8	16.594	6.171	51.86	34.91	32.57	14.231
1991	42	201	593	5.896	1.370	-916	-1.564	6.009	4.445	89.3	66.0	6.731	2.286	21.03	18.78	51.45	12.020
1992	22	201	341	7.254	2.323	-1.138	389	3.968	4.356	50.8	55.7	7.818	3.461	24.43	12.40	33.97	12.187
1993	57	268	596	5.634	3.958	-1.109	-108	1.596	1.488	24.3	22.7	6.555	5.067	20.49	4.99	13.67	7.408
1994	63	268	647	6.753	3.670	-922	-237	3.377	3.140	43.7	40.6	7.732	4.582	24.16	10.55	28.91	4.477
1995	60	268	337	2.795	2.739	-92	1.520	-891	628	-25.8	18.2	3.460	2.831	10.81	-2.79	-7.63	3.710
1996	11	268	287	2.308	1.250	-692	953	-20	932	-0.7	32.4	1.942	8.98	-0.06	-0.18	2.91	3.849
1997	0	200	370	3.854	2.616	-153	-855	2.510	1.655	56.7	37.4	4.424	2.769	13.83	7.84	21.49	5.17
1998	0	200	458	5.417	3.988	1.193	-194	3.473	3.279	47.8	45.1	7.267	3.988	22.71	10.95	29.74	10.25
1999	0	200	253	2.368	2.886	2.098	49	1.984	2.032	40.3	41.3	4.919	2.886	15.37	6.20	16.99	6.35
2000	0	200	474	5.944	3.537	468	-183	3.731	3.548	52.7	50.1	7.086	3.537	22.14	11.66	31.95	4.134
2001	0	200	945	9.469	6.741	-704	259	2.910	3.169	27.4	29.9	10.613	7.445	33.17	9.09	24.92	4.929
2002	0	200	772	8.192	6.229	163	308	2.789	3.097	29.9	33.2	9.326	6.229	29.15	8.72	23.88	9.68
2003	0	200															

## Gundsmøagle Sø

**Arsopgørelse TOTAL-JERN**

	Punkt-kilder (kg)	Atm. dep. (kg)	Umtålt oplund (kg)	Tilløb (kg)	Fraløb (kg)	"Grund- vand" (kg)	Magasin (kg)	Retention + retention (kg)	Magasin + retention (kg)	Retention + retention (%)	Magasin + retention (%)	Samlet tilførsel (kg)	Samlet fraførsel (kg)	Retention Magasin (g/m <sup>2</sup> /år)	Retention Magasin (mg/m <sup>2</sup> /år)	Magasin + retention (g/m <sup>2</sup> /år)	Vandføringsvægt indløbskoncentration (mg/l)		
1980	1990	0	0	2	1.639	1.241	403	14	788	802	38,6	39,3	2.043	1.241	6,39	2,46	6,75	2,51	0,453
1986	1991	0	0	30	3.070	1.234	386	7	2.245	2.252	64,4	64,6	3.486	1.234	10,89	7,02	19,22	7,04	0,662
1988	1992	0	0	22	3.931	1.762	122	30	2.283	2.313	56,0	56,8	4.075	1.762	12,73	7,13	19,54	7,23	0,516
1989	1993	0	0	47	7.681	4.102	585	14	4.197	4.212	50,5	50,7	8.313	4.102	25,98	13,12	35,94	13,16	0,583
1990	1994	0	0	39	5.742	2.680	742	-54	3.898	3.843	59,7	58,9	6.523	2.680	20,39	12,18	33,37	12,01	0,578
1991	1995	0	0	11	2.037	538	130	22	1.617	1.639	74,3	75,3	2.178	538	6,81	5,05	13,85	5,12	0,773
1992	1996	0	0	8	1.708	448	115	-48	1.430	1.382	78,1	75,5	1.831	448	5,72	4,47	12,24	4,32	0,775
1993	1997	0	0	26	3.917	1.394	737	129	3.156	3.285	67,5	70,2	4.679	1.394	14,62	9,86	27,02	10,27	0,538
1994	1998	0	0	28	6.129	1.876	1.323	-76	5.680	5.605	75,9	74,9	7.481	1.876	23,38	17,75	48,63	17,52	0,780
1995	1999	0	0	23	5.567	2.003	2.387	199	5.776	5.975	72,4	74,9	7.977	2.003	24,93	18,05	49,45	18,67	0,815
1996	2000	0	0	23	11.019	2.681	2.378	-93	10.833	10.740	80,7	80,0	13.420	2.681	41,94	33,85	92,74	33,56	1,646
1997	2001	0	0	44	12.192	7.125	-615	-26	4.523	4.496	37,0	36,7	12.236	7.740	38,24	14,13	38,72	14,05	0,863
1998	2002	0	0	26	10.778	2.282	2.828	105	11.245	11.350	82,5	83,3	13.632	2.282	42,60	35,14	96,28	35,47	1,706
1999	2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,550

**Sommeropgørelse TOTAL-JERN**

	Punkt-kilder (kg)	Atm. dep. (kg)	Umtålt oplund (kg)	Tilløb (kg)	Fraløb (kg)	"Grund- vand" (kg)	Magasin (kg)	Retention + retention (kg)	Magasin + retention (kg)	Retention + retention (%)	Magasin + retention (%)	Samlet tilførsel (kg)	Samlet fraførsel (kg)	Retention Magasin (g/m <sup>2</sup> /år)	Retention Magasin (mg/m <sup>2</sup> /år)	Magasin + retention (g/m <sup>2</sup> /år)	Vandføringsvægt indløbskoncentration (mg/l)				
1980	1986	0	0	0	0	0	161	42	-21	-35	133	98	82,3	60,7	161	63	0,50	0,42	1,14	0,31	0,550
1988	1989	0	0	9	269	100	-52	-75	200	125	72,2	45,1	278	152	0,87	0,63	1,72	0,39	0,521		
1989	1990	0	0	4	434	147	-67	-24	199	224	45,6	51,1	438	214	1,37	0,62	1,71	0,70	0,427		
1990	1991	0	0	8	949	740	-80	-316	453	136	47,3	14,2	956	820	2,99	1,41	3,87	0,43	0,601		
1991	1992	0	0	9	1.421	355	-59	-34	1.050	1.016	73,4	71,0	1.430	414	4,47	3,28	8,99	3,18	0,865		
1992	1993	0	0	5	960	223	48	-27	817	790	80,7	78,0	1.013	223	3,16	2,55	6,99	2,47	1,142		
1993	1994	0	0	4	635	107	-44	-64	552	488	86,4	76,3	639	151	2,00	1,72	4,73	1,52	0,947		
1994	1995	0	0	5	619	120	-19	-43	527	485	84,6	77,7	624	139	1,95	1,65	4,52	1,51	0,654		
1995	1996	0	0	6	1.365	340	-41	-41	1.403	82,9	80,5	1.742	340	5,44	4,51	12,36	4,38	1,173			
1996	1997	0	0	3	597	283	458	-3	778	775	73,5	73,2	1.058	283	3,31	2,43	6,66	2,42	0,947		
1997	1998	0	0	5	1.816	332	398	-65	1.951	1.886	88,0	85,0	2.219	332	6,93	6,10	16,71	5,90	1,399		
1998	1999	0	0	9	2.679	1.254	-56	-77	1.455	1.378	54,1	51,3	2.688	1.310	8,40	4,55	12,45	4,31	1,083		
1999	2000	0	0	11	3.545	555	151	-161	3.313	3.152	89,4	85,0	3.707	555	10,35	28,37	9,85	1,742			

Gundsømagle Sø

Årsopgørelse	Vandbalance										Gundsømagle Sø				
	Nedbør	For-dampning	Direkte tillørsel	Umålt opland	Tilløb	Afløb	"Grundvand"	Magasin	Samlet overflade tilførsel	Samlet tilsørsel	Samlet fraførsel	Stighøjde overfladetilførsel	Stighøjde sejlbøf	Opholdstid Ar	Opholdstid Ar (dage)
	(1000m³)	(1000m³)	(1000m³)	(1000m³)	(1000m³)	(1000m³)	(1000m³)	(1000m³)	(1000m³)	(1000m³)	(1000m³)	(m/vår)	(m/vår)	(år)	(dage)
1980	6.542											23,0	20,4		
1986												23,2	34,8		
1988	170	200	6	37	2.736	2.019	-715	16	2.750	2.750	2.734	8,6	6,3	0,199	73
1989	208	197	6	30	3.593	4.398	760	3	3.641	4.401	4.398	11,4	13,7	0,097	35
1990	214	181	6	74	4.974	5.903	810	-6	5.087	5.897	5.903	15,9	18,4	0,068	25
1991	168	205	6	161	4.524	4.948	303	10	4.654	4.958	4.948	14,5	15,5	0,088	32
1992	250	174	6	190	7.466	7.685	-15	38	7.738	7.738	7.700	24,0	24,0	0,051	19
1993	252	189	4	328	12.926	13.869	517	-32	13.320	13.837	13.869	41,6	43,3	0,033	12
1994	170	192	4	248	9.759	10.953	942	-22	9.989	10.931	10.953	31,2	34,2	0,040	15
1995	164	210	4	67	2.583	2.565	-44	-3	2.607	2.607	2.610	8,1	8,0	0,162	59
1996	234	210	1	56	2.159	2.178	-78	-16	2.240	2.240	2.256	7,0	6,8	0,186	68
1997	276	158	0	183	7.152	8.617	1.197	32	7.453	8.649	8.617	23,3	26,9	0,048	18
1998	259	181	0	196	7.703	9.157	1.175	-5	7.977	9.152	9.157	24,9	28,6	0,044	16
1999	200	151	0	171	6.688	9.187	2.294	14	6.907	9.201	9.187	21,6	28,7	0,045	16
2000	234	207	0	167	6.540	7.813	1.068	-12	6.733	7.802	7.813	21,0	24,4	0,051	19
2001	291	200	0	351	13.825	16.009	1.932	-28	14.266	16.198	16.009	44,6	50,0	0,027	10
2002	197	147	0	6.185	7.464	1.222	-13	6.320	7.543	7.464	23,3				

Sommeropgørelse Vandbalance										Gundsømagle Sø					
Nedbar	For-damning (1000m³)	Direkte tilløsel (1000m³)	Urmålt oplund (1000m³)	Tilløb (1000m³)	Afløb (1000m³)	"Grundvand"	Magasin (1000m³)	Samlet overflade tilførsel (1000m³)	Samlet tilløsel incl. udsvøring (1000m³)	Samlet taførsel incl. udsvøring (1000m³)	Stighøjde overfladetilførsel (m/år)	Stighøjde seaslet (m/år)	Opholdstid Sommer (dage)		
1980															
1986	85	153	3	2	391	110	-215	8	328	325	1,0	0,3	1.437	525	
1988	98	144	3	1	292	149	-110	-5	250	259	0,8	0,5	1.118	408	
1989	113	136	3	4	1.165	1.271	129	8	1.149	1.279	3,6	4,0	0,125	46	
1990	50	162	3	38	495	313	-176	-66	423	423	1,3	1,0	0,534	195	
1991	137	125	3	26	999	714	-280	45	1.040	994	3,2	2,2	0,211	77	
1992	101	147	2	40	1.552	1.106	-433	10	1.549	1.539	4,8	3,5	0,152	55	
1993	65	148	2	41	1.612	1.302	-281	-11	1.572	1.582	4,9	4,1	0,129	47	
1994	77	162	2	21	823	825	10	-54	761	771	2,4	2,6	0,202	74	
1995	114	162	0	17	657	480	-167	-21	626	626	2,0	1,5	0,339	124	
1996	103	123	0	25	930	898	-49	-13	934	934	2,9	2,8	0,156	57	
1997	118	140	0	29	1.140	1.398	240	-11	1.147	1.387	1.398	3,6	4,4	0,104	38
1998	96	118	0	16	618	1.113	541	41	613	1.153	1.113	1,9	3,5	0,135	49
1999	132	158	0	33	1.269	1.364	87	-0	1.276	1.364	1.364	4,0	4,3	0,101	37
2000	133	152	0	62	2.420	2.397	11	38	2.463	2.474	2.397	7,7	7,5	0,155	56
2001	108	154	0	51	1.991	2.021	42	-14	1.996	2.038	2.021	6,2	0,175		



## Bilag 7

# Gundsømagle Sø - Vand- og stofbalanceberegninger

Vand- og stofbalanceberegningerne er for 1989-97 udført ved hjælp af EDB-programmet STOQ-sømodul version 3.30, i 1998-2001 er anvendt vers. 4.4 og 4.6. I 2002-03 er anvendt STOQ SQL sømodul vers. 2.07.

De anvendte beregningsmetoder er udførligt beskrevet i de tidligere års rapporter, eksempelvis i rapporten "Gundsømagle Sø 1989-95". For en gennemgang af programmets beregningsmetoder henvises der derfor til eksempelvis nævnte rapport.

Til de beregnede værdier i samleskemaerne knytter sig følgende forklaringer:

## Vandbalancer

1. I 1980 er bidrag fra det umålte opland ikke medregnet.
2. Vandbalancer for perioden efter 1989 er beregnet under hensyntagen til vandstandsændringer, nedbør og fordampning.
3. Opholdstiden er beregnet på grundlag af fraførte vandmængder undtagen i 1980, hvor tilførte vandmængder er anvendt.

## Stofbalancer

1. Indsivet stofmængde via grundvandsindsivning lagt til tilførslen; udsivet stofmængde via grundvandsudsivning er lagt til fraførslen.
2. Tilbageholdelsen (retentionen) er beregnet som tilført stofmængde - fraført stofmængde, hvor:

tilført stofmængde er:

$$\text{transport fra målt opland} + \text{transport fra umålt opland} + \text{atm. deposition} - \text{magasinering} \\ + \text{transport i grundvand}$$

og fraført stofmængde er:

$$\text{transport i søafløb}$$

Tilbageholdelsen svarer til retentionen + magasinændringen.

3. I 1980 er stofbidrag fra umålten opland ikke medregnet.
4. Vandføringsvægtet indløbskoncentration er beregnet som periodens stoftilførsel fra målt + umålten opland / periodens vandtilførsel ligeledes fra målt + umålten opland.

## Vand- og stoftilførsel fra det umålte opland

For årene 1989-92 er vand- og stoftilførslen fra det umålte opland ( $Q_{umålt}$ ,  $T_{umålt}$ ) beregnet ved at vægte vandtilførslen i det mindre tilløb Østrup Bæk, st. 783 ( $Q_{783}$ ) med forholdet mellem arealet af det umålte opland til søen (Areal<sub>umålt</sub>) og det målte opland til st. 783 (Areal<sub>783</sub>); dvs.:

$$Q_{umålt}(l/s) (1989-92) = Q_{783}(l/s) \times \text{Areal}_{umålt}/\text{Areal}_{783} = Q_{783}(l/s) \times 2,13$$

Som følge af at Østrup Bæk, st. 783 udgik af overvågningen i 1993, er beregningen af afstrømningen fra det "nye" umålte opland til søen ( $Q_{umålt, ny}$ ) fra og med 1993 ændret i forhold til perioden 1989-92.

Størrelsen af afstrømningen fra det umålte opland i 1993-2003 er beregnet ud fra kendskabet til afstrømningen i Østrup Bæk, st. 783 i 1989-92; dvs. den i afsnit 3 nævnte Q/Q-korrelation mellem enkeltmålinger af vandføringen i Østrup Bæk og de målte døgnmiddelvandføringer i Hove Å, st. 777. I korrelationen er værdierne for månedsmiddelvandføringen i Hove Å, st. 777 i 1993-2003 indsat, hvorefter den resulterende månedsmiddelvandføring er vægtet ud fra forholdet mellem arealet af det nye umålte opland (Areal<sub>umålt, ny</sub>) og arealet af oplandet til Østrup Bæk, st. 783 (Areal<sub>783</sub>); dvs.:

$$\begin{aligned} Q_{umålt, ny, månedsmiddel}(l/s) &= \\ [(8,08 \times 10^{-3} \times Q_{777, månedsmiddel}(l/s)) + (1,32 \times 10^{-2})(l/s)] \times [(Areal_{umålt, ny})/(Areal_{783})] \end{aligned}$$

Stofkoncentrationerne i det afstrømmende vand fra det "nye" umålte opland i 1993-2003 er estimeret ved brug af gennemsnitlige vandføringsvægtede månedsmiddelkoncentrationer fra Østrup Bæk, st. 783, baseret på målinger i 1989-92.

For hele perioden 1989-97 er det månedlige vand- og stofbidrag fra Kirkerup renseanlæg (beliggende i det umålte opland) medregnet separat i vand- og stofbalancerne for søen. Renseanlægget er nedlagt i 1997.

## Stoftransport via ind- og udsivende "grundvand"

Det antages, at beregnede ind- og udsivende grundvandsmængder primært er et udtryk for måleusikkerhed på vandbalancen for søen og derfor er overfladevand fremfor grundvand. Derfor er stoftilførslen til søen via udsivende "grundvand" for alle år beregnet på månedsbasis ved brug af vandføringsvægtede stofkoncentrationer i de målte overfladiske tilløb til søen. Dette svarer til de anbefalinger, som en teknisk arbejdsgruppe med repræsentanter fra amterne og Danmarks Miljøundersøgelser har givet (*DMU 1994: Notat vedr. beregning af den diffuse tilførsel af total-N og total-P fra umålte oplande i overvågningsprogrammet*).

Da beregningsprogrammet STOQ-Sømodul tidligere kun kunne anvende en enkelt værdi pr. år for stofkoncentrationen i det udsivende "grundvand", er der for perioden 1989-98 anvendt vandføringsvægtede årsmiddelværdier af stofkoncentrationer i de målte tilløb til beregning af den månedlige stoftilførsel som følge af udsivning. I de nyeste versioner af STOQ-Sømodul (fra og med vers. 4.0) er der mulighed for at operere med et vilkårligt antal værdier af stofkoncentrationer i det udsivende "grundvand" pr. år. Ved beregningerne i 1999-2002 er derfor de målte koncentrationer i tilløbet anvendt for det udsivende "grundvand". I 2003 er anvendt vandføringsvægtede månedsmidler.

Stoftransporten fra søen via udsivende "grundvand" er beregnet på månedsbasis ved brug af interpolerede stofkoncentrationer i svovandet.



## Bilag 8

## Gundsømagle Sø - kildeopsplitning af kvælstof (N) og fosfor (P)

Forklaring til kildeopsplitningen:

Naturbidraget er beregnet ved multiplikation af den årlige vandtilførsel til søen og vandføringsvægtede mediankoncentrationer, anbefalet af DMU. De anvendte værdier er:

	Total-P (mg/l)	Total-N (mg/l)
1989	0,055	1,60
1990	0,055	1,80
1991	0,052	1,50
1992	0,050	1,61
1993	0,052	2,77
1994	0,051	1,60
1995	0,048	1,40
1996	0,048	1,40
1997	0,048	1,40
1998	0,050	1,52
1999	0,054	1,49
2000	0,044	1,35
2001	0,049	1,27
2002	0,051	1,56
2003	0,048	1,18

I 1989-91 blev antallet af PE i enkeltejendomme i oplandet til søen blev i 1988 vurderet til 1089 PE, baseret på en optælling i 1988.

I 1992-93 blev antallet justeret til 806 PE i forbindelse med kommunernes registrering af enkeltejendomme efter Miljøstyrelsens retningslinier.

I 1994 blev antallet af PE justeret til hhv. 782,5 PE i 287 enkeltejendomme i oplandet.

I 1995 blev antallet af PE justeret til hhv. 779,5 PE i 277 enkeltejendomme i oplandet.

En ny og mere detaljeret registrering foretaget af kommunerne i foråret 1999 har medført en ny justering af antallet af enkeltejendomme og PE i oplandet til henholdsvis 2031 og 4230. Af de i alt 2031 ejendomme er langt hovedparten, nemlig 1738, koloni- eller sommerhuse.

Fra og med 1994 er enhedsbidraget med fosfor (tot-P) justeret fra 1,5 kg tot-P/PE/år til 1,0 kg tot-P/PE/år efter Miljøstyrelsens retningslinier.

### Udviklingen i Punktkilder (PE = personækvivalenter):

Kallerup renseanlæg : 7231 PE, 1992. Ca. 10200 PE, 1995.

Sengeløse renseanlæg : 2636 PE, indtil februar 1992 selvstændig udledning til Hove Å, derefter tilsluttet Kallerup renseanlæg.

Ledøje renseanlæg : 810 PE, afskåret fra Hove Å i november 1989.

Hove renseanlæg : 110 PE. Tilsluttet Kallerup renseanlæg i starten af 1993.

Kirkerup renseanlæg : 35 PE. Afskåret i slutningen af marts 1997.

Marbjerg renseanlæg : 200 PE. Tilsluttet Kallerup renseanlæg i juni 1991. Indtil da udledning til Maglemose Å-systemet.

Gundsemagle Se: Kildeopsplitning af Frostor (P)  
- alle tal i kg

	Regnbælignede udleb.	Rensanlæg	Alværgeudb.	Punktkilder i alt	Enkeltejendomme	Landbrug	Natur	Atm. dep.	Samlet tilførsel	
1989	203	6.609	6.812	760	1.787	153	5	9.516	1989	
1990	202	10.127	760	2.617	241	5	6.716	1990		
1991	239	5.478	5.717	760	1.415	305	5	8.201	1991	
1992	141	3.184	3.325	639	-1.821	250	6	2.398	1992	
1993	255	4.112	4.367	639	-2.315	368	5	3.094	1993	
1994	232	1.144	1.376	356	1.78	703	6	2.619	1994	
1995	171	504	675	367	-52	526	6	1.523	1995	
1996	147	301	448	468	-493	127	6	1.523	1996	
1997	199	228	427	450	-569	106	6	421	1997	
1998	210	260	231	427	4	1229	1998			
1999	186	344	530	279	21	490	4	1.324	1999	
2000	173	204	317	254	300	403	4	1.337	2000	
2001	172	166	338	199	718	381	4	1.639	2001	
2002	193	366	8	567	327	401	821	4	2.120	2002
2003	153	126	8	287	325	395	363	4	1.373	2003

Gundsemagle Se: Kildeopsplitning af Kvæstof (N)  
- alle tal i %

	Regnbælignede udleb.	Rensanlæg	Alværgeudb.	Punktkilder i alt	Enkeltejendomme	Landbrug	Natur	Atm. dep.	Samlet tilførsel
1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989
1990	36.262	442	60.300	15.001	7.903	442	32.2	58.5	1990
1991	32.2	1.2	56.8	22.744	22.744	442	1.2	56.8	1991
1992	26.3	1.2	53.9	28.289	19.960	442	2.7	40.1	1992
1993	24.1	0.8	40.9	30.459	8.041	480	2.7	44.1	1993
1994	24.1	1.3	22.8	19.223	1.870	21.224	480	79.892	1994
1995	23.2	0.9	6.4	18.201	37.095	21.224	480	108.306	1995
1996	23.2	0.9	7.8	16.904	1.604	22.040	640	78.605	1996
1997	22.7	0.5	32.7	16.150	54.164	15.334	640	13.132	1997
1998	21.2	0.4	26.5	6.857	6.857	14.655	640	14.655	1998
1999	21.2	1.1	14.8	1.017	57.209	12.907	640	76.247	1999
2000	21.2	1.1	6.0	7.987	7.987	13.520	480	65.496	1999
2001	20.6	1.1	11.1	7.474	11.14	40.217	480	59.640	2000
2002	20.6	1.2	8.0	4.782	9.60	31.045	480	47.248	2001
2003	20.6	1.2	8.8	4.375	361	50.676	480	83.185	2002

Gundsemagle Se: Kildeopsplitning af Kvæstof (N)  
- alle tal i kg

	Regnbælignede udleb.	Rensanlæg	Alværgeudb.	Punktkilder i alt	Enkeltejendomme	Landbrug	Natur	Atm. dep.	Samlet tilførsel
1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989
1990	36.262	442	60.300	15.001	7.903	442	32.2	58.5	1990
1991	32.2	1.2	53.9	22.744	19.960	442	1.2	53.9	1991
1992	26.3	1.2	53.9	28.289	19.960	442	0.8	40.1	1992
1993	24.1	0.8	40.9	30.459	8.041	480	0.8	40.1	1993
1994	24.1	1.3	22.8	19.223	1.870	21.224	480	79.892	1994
1995	23.2	0.9	6.4	18.201	37.095	21.224	480	108.306	1995
1996	23.2	0.9	7.8	16.904	1.604	22.040	640	78.605	1996
1997	22.7	0.5	32.7	16.150	54.164	15.334	640	13.132	1997
1998	21.2	0.4	26.5	6.857	6.857	14.655	640	14.655	1998
1999	21.2	1.1	14.8	1.017	57.209	12.907	640	76.247	1999
2000	21.2	1.1	6.0	7.987	7.987	13.520	480	65.496	1999
2001	20.6	1.1	11.1	7.474	11.14	40.217	480	59.640	2000
2002	20.6	1.2	8.0	4.782	9.60	31.045	480	47.248	2001
2003	20.6	1.2	8.8	4.375	361	50.676	480	83.185	2002

Gundsemagle Se: Kildeopsplitning af Kvæstof (N)  
- alle tal i %



	Regnbælignede udleb.	Rensanlæg	Alværgeudb.	Punktkilder i alt	Enkeltejendomme	Landbrug	Natur	Atm. dep.	Samlet tilførsel
1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989
1990	36.262	442	60.300	15.001	7.903	442	32.2	58.5	1990
1991	32.2	1.2	53.9	22.744	19.960	442	1.2	53.9	1991
1992	26.3	1.2	53.9	28.289	19.960	442	0.8	40.1	1992
1993	24.1	0.8	40.9	30.459	8.041	480	0.8	40.1	1993
1994	24.1	1.3	22.8	19.223	1.870	21.224	480	79.892	1994
1995	23.2	0.9	6.4	18.201	37.095	21.224	480	108.306	1995
1996	23.2	0.9	7.8	16.904	1.604	22.040	640	78.605	1996
1997	22.7	0.5	32.7	16.150	54.164	15.334	640	13.132	1997
1998	21.2	0.4	26.5	6.857	6.857	14.655	640	14.655	1998
1999	21.2	1.1	14.8	1.017	57.209	12.907	640	76.247	1999
2000	21.2	1.1	6.0	7.987	7.987	13.520	480	65.496	1999
2001	20.6	1.1	11.1	7.474	11.14	40.217	480	59.640	2000
2002	20.6	1.2	8.0	4.782	9.60	31.045	480	47.248	2001
2003	20.6	1.2	8.8	4.375	361	50.676	480	83.185	2002

Gundsemagle Se: Kildeopsplitning af Kvæstof (N)  
- alle tal i %



## Bilag 9

Parameter	GUNDØMAGLE SG							Statistik - års- og sommermidler			
	Total-P mg/l	ÅR 1/1-31/12	Sommer 1/5-30/9	År Min.	År Max.	Sommer Min.	Sommer Max.	Type Lin. reg.	Periode	Niveau %	Symbol (+/-)
1980	1.084	1.049	0.690	3.300	0.690	1.400	1.400	År	1989-2003	0,1	---
1986	1.411	1.049	0.550	2.700	0.550	2.700	2.700	Sommer	1989-2003	0,1	---
1989	1.476	1.319	0.630	2.000	0.630	2.000	2.000				
1990	1.181	1.039	0.500	1.400	0.500	1.400	1.400				
1991	0.966	0.946	0.370	1.900	0.830	1.900	1.900				
1992	0.900	1.135	0.270	1.600	0.680	1.600	1.600				
1993	0.720	1.152	0.115	1.950	0.329	1.950	1.950				
1994	0.619	1.050	0.115	1.920	0.329	1.920	1.920				
1995	0.474	0.727	0.109	1.020	0.171	1.020	1.020				
1996	0.453	0.563	0.116	0.970	0.181	0.970	0.970				
1997	0.403	0.645	0.102	1.150	0.102	1.150	1.150				
1998	0.356	0.604	0.099	0.929	0.231	0.929	0.929				
1999	0.335	0.563	0.078	0.864	0.213	0.864	0.864				
2000	0.292	0.464	0.082	0.667	0.211	0.667	0.667				
2001	0.248	0.420	0.076	0.721	0.169	0.721	0.721				
2002	0.219	0.335	0.087	0.505	0.169	0.505	0.505				
2003	0.267	0.378	0.071	0.662	0.196	0.662	0.662				





**Total-P, sommermidler**

År	Total-P (mg/l)
80	1.45
86	1.45
89	1.25
90	1.15
91	1.15
92	1.15
93	1.15
94	1.15
95	1.15
96	1.15
97	1.15
98	1.15
99	1.15
00	1.15
01	1.15
02	1.15
03	1.15


**Total-P, årsmedier**

År	Total-P (mg/l)
80	1.45
86	1.45
89	1.45
90	1.45
91	1.45
92	1.45
93	1.45
94	1.45
95	1.45
96	1.45
97	1.45
98	1.45
99	1.45
00	1.45
01	1.45
02	1.45
03	1.45



Parameter	Tidsvægtede års- og sommermidler						GUNDØMAGLE SG			Statistik - års- og sommermidler		
	ÅR	År 1/1-31/12	Sommer 1/5-30/9	År Min.	År Max.	Sommer Min.	Sommer Max.	Type Lin. reg.	Periode	Niveau %	Symbol (+/-)	
NO2 + NO3 mg/l	1980	0.181	0.005	5.700	0.005	0.600	1.100	Ar	1989-2003	0		
	1986	2.053	0.174	0.005	5.000	0.005	2.600	0.022				
	1989	1.641	0.291	0.005	9.300	0.005	0.022	Sommer	1989-2003	0		
	1990	2.804	0.024	0.005	12.000	0.005	7.200					
	1991	3.404	0.798	0.005	10.900	0.005	1.600					
	1992	3.476	0.239	0.005	10.400	0.005	0.291					
	1993	3.452	0.220	0.005	9.310	0.005	2.760					
	1994	2.860	0.357	0.005	9.310	0.005	1.190					
	1995	1.817	0.131	0.005	6.870	0.005	0.036					
	1996	0.867	0.015	0.005	3.210	0.005	0.286					
	1997	0.919	0.070	0.005	4.390	0.005	1.600					
	1998	3.232	0.151	0.005	9.920	0.005	0.886					
	1999	2.185	0.142	0.005	7.200	0.005	0.295					
	2000	1.999	0.079	0.005	5.880	0.005	0.044					
	2001	1.934	0.080	0.005	5.960	0.005	0.472					
	2002	2.162	0.116	0.005	6.760	0.005	0.023					
	2003	1.209	0.131	0.005	5.200	0.005	0.658					

Tidsvægtede års- og sommermidler GUNDØMAGLE SG




Tidsvægtede års- og sommermidler GUNDØMAGLE SG



Tidsvægtede års- og sommermidler GUNDØMAGLE SG




Tidsvægtede års- og sommermidler GUNDØMAGLE SG






Tidsvægtede års- og sommermidler GUNDØMAGLE SG




Parameter	Tidsvægtede års- og sommermidler						GUNDØMAGLE SØ						Statistik - års- og sommermidler					
	ÅR	År 1/1-31/12	Sommer 1/5-30/9	År Max.	År Min.	Sommer Max.	Sommer Min.	ÅR	År 1/1-31/12	Sommer 1/5-30/9	År Max.	År Min.	Sommer Max.	Sommer Min.	Type	Periode	Niveau	Symbol (+/-)
Klorofyl a mikrogram/l	1980	189	189	52	329	109	292	19	1989	244	260	119	480	160	329	0,1	----	
	1986	130	178	52	329	109	292	19	1990	269	295	35	760	65	540	0,1	----	
	1989	244	260	119	480	160	329	0,1	1991	339	54	600	600	600	540	0,1	----	
	1990	269	274	35	760	65	540	0,1	1992	316	401	58	560	330	560	0,1	----	
	1991	339	339	54	600	100	600	0,1	1993	175	258	26	530	81	450	0,1	----	
	1992	316	401	58	560	330	560	0,1	1994	106	149	1	313	73	245	0,1	----	
	1993	175	258	26	530	81	450	0,1	1995	110	137	7	194	89	194	0,1	----	
	1994	106	149	1	313	73	245	0,1	1996	185	317	16	625	99	625	0,1	----	
	1995	110	137	7	194	89	194	0,1	1997	199	379	19	990	72	990	0,1	----	
	1996	185	317	16	625	99	625	0,1	1998	84	139	6	274	58	274	0,1	----	
	1997	199	379	19	990	72	990	0,1	1999	126	178	8	303	105	303	0,1	----	
	1998	84	139	6	274	58	274	0,1	2000	86	133	9	186	55	186	0,1	----	
	1999	126	178	8	303	105	303	0,1	2001	97	176	10	273	66	273	0,1	----	
	2000	86	133	9	186	55	186	0,1	2002	99	165	6	316	99	316	0,1	----	
	2001	97	176	10	273	66	273	0,1	2003	89	146	4	240	86	240	0,1	----	
	2002	99	165	6	316	99	316	0,1	2003	89	146	4	240	86	240	0,1	----	



Tidsvægtede års- og sommermidler GUNDØMAGLE SØ										Statistik - års- og sommermidler						
Parameter	AR	År	1/1-31/12	1/5-30/9	År	Min.	År	Max.	Sommer	Min.	Sommer	Max.	Type	Periode	Niveau	Symbol (+/-)
Silicium mg/l					1980	8.91	9.51	0.12	16.00	0.25	13.00	0.25	Ar	1989-2003	0	
		1986	9.10	10.30	0.18	14.00	2.10	16.00	0.12	16.00	14.00	15.00	Sommer	1989-2003	0	
		1989	8.73	10.75	0.05	16.00	2.20	15.00	0.95	11.00	0.95	11.00	Ar	1989-2003	0	
		1990	8.23	7.08	0.09	11.00	0.95	11.00	0.06	17.00	0.06	17.00	Ar	1989-2003	0	
		1991	6.04	10.51	0.06	17.00	0.06	17.00	0.41	14.00	3.60	14.00	Ar	1989-2003	0	
		1992	7.47	10.54	0.17	15.00	0.24	15.00	0.17	15.00	0.24	15.00	Ar	1989-2003	0	
		1993	7.45	7.11	0.41	14.00	0.41	14.00	0.02	11.00	0.02	11.00	Ar	1989-2003	0	
		1994	5.65	7.07	0.03	14.00	0.03	14.00	0.03	14.00	0.03	14.00	Ar	1989-2003	0	
		1995	4.89	5.03	0.06	17.00	0.06	17.00	0.28	19.00	0.28	19.00	Ar	1989-2003	0	
		1996	6.71	9.89	0.03	19.00	0.28	19.00	0.16	10.00	0.24	10.00	Ar	1989-2003	0	
		1997	8.48	10.54	0.16	10.00	0.24	10.00	0.02	11.00	0.02	11.00	Ar	1989-2003	0	
		1998	5.88	5.68	0.02	11.00	0.02	11.00	0.02	11.00	0.02	11.00	Ar	1989-2003	0	
		1999	6.49	6.78	0.02	11.00	0.02	11.00	0.02	11.00	0.02	11.00	Ar	1989-2003	0	
		2000	6.56	7.25	1.00	11.00	1.00	11.00	1.00	11.00	1.00	11.00	Ar	1989-2003	0	
		2001	7.36	8.65	0.03	13.00	0.03	13.00	0.03	13.00	0.03	13.00	Ar	1989-2003	0	
		2002	6.01	7.26	0.68	9.80	0.91	9.80	0.91	9.80	0.91	9.80	Ar	1989-2003	0	
		2003	6.83	8.34	1.60	14.00	3.20	14.00	3.20	14.00	3.20	14.00	Ar	1989-2003	0	




Parameter	Tidsvægtede års- og sommermidler						GUNDØMAGLE SG					
	ÅR	Ar	Sommer 1/5-30/9	Ar Min.	Ar Max.	Sommer Min.	Sommer Max.	Type Lin. reg.	Periode	Niveau %	Symbol (+/-)	
COD, part. mg/l	1980	23.3	30.5	10.0	40.0	26.0	40.0	Ar	1989-2003			
	1986	24.6	34.3	7.8	48.0	24.0	48.0	Sommer	1989-2003			
	1990	22.6	30.6	3.7	63.0	3.7	63.0					
	1991	19.6	33.7	1.9	54.0	18.0	54.0					
	1992	17.8	28.8	2.3	41.0	16.7	41.0					
	1993	18.5	27.9	3.3	38.0	20.0	38.0					
	1994	34.0	59.0	2.1	120.0	17.0	120.0					
	1995	36.0	59.9	6.0	150.0	22.0	150.0					
	1996	1998	1999	2000	2001	2002	2003					



Parameter	Tidsvægtede års- og sommermidler GUNDOMMAGLE SØ										
	ÅR	År 1/1-31/12	Sommer 1/5-30/9	År Min.	År Max.	Sommer Min.	Sommer Max.	Type	Periode	Niveau	Symbol (+/-)
Rel. vandstand m	1980							År	1989-2003		
	1986	0,51	0,43	0,33	0,61	0,33	0,52				
	1989	0,55	0,45	0,36	0,72	0,36	0,52				
	1990	0,55	0,45	0,48	0,35	0,71	0,35				
	1991	0,55	0,48	0,34	0,23	0,67	0,23				
	1992	0,47	0,47	0,47	0,37	0,75	0,37				
	1993	0,56	0,47	0,46	0,28	0,98	0,28				
	1994	0,63	0,58	0,45	0,34	0,98	0,34				
	1995	0,58	0,46	0,46	0,37	0,67	0,37				
	1996	0,53	0,48	0,48	0,43	0,64	0,43				
	1997	0,54	0,49	0,49	0,45	0,76	0,45				
	1998	0,59	0,55	0,45	0,40	0,86	0,40				
	1999	0,55	0,57	0,48	0,43	0,67	0,43				
	2000	0,57	0,48	0,48	0,43	0,72	0,41				
	2001	0,55	0,48	0,41	0,41	0,72	0,41				
	2002	0,64	0,53	0,43	0,43	1,07	0,43				
	2003	0,52	0,44	0,39	0,39	0,69	0,39				

### Grafik



Gundsømagle Sø 2003 - vandkemianalyser

Dato	Dybde cm	pH	Tørsstof, susp-stof mg/l	Gledetab,susp-stof mg/l	Alkalinitet,totale TA mmol/l	Ammonium-N,filt mg/l	Nitrit+nitrat-N,filt mg/l	Nitrogen,totale mg/l	Orthophosphat-P,filt mg/l	Phosphor,totale-P mg/l	Jern mg/l	Silicium mg/l	Chlorofyl A mikrogram/l
07-01-2003	55	7.6	6.8	3.1	5.98	0.391	5.200	6.02	0.040	0.105	0.495	6.4	6.2
06-02-2003	10	7.5	2.8	1.4	5.41	0.382	4.860	5.88	0.044	0.071	0.337	6.1	3.6
04-03-2003	10	7.8	7.6	5.2	6.74	<	0.005	2.330	3.66	0.026	0.076	0.289	5.1
01-04-2003	62	8.3	13	9.4	5.68	<	0.005	1.440	2.88	0.007	0.105	0.653	3.6
15-04-2003	60	8.3	21	15	5.44	<	0.005	0.889	2.54	0.012	0.117	0.481	3.0
29-04-2003	60	8.3	20	13	4.93	<	0.005	0.210	2.17	<	0.004	0.197	0.566
14-05-2003	62	8.4	24	19	4.94	<	0.005	0.658	2.76	0.006	0.196	0.544	3.2
04-06-2003	62	8.5	16	7.2	4.44	<	0.005	0.395	2.87	0.009	0.201	0.460	4.4
16-06-2003	65	8.5	29	22	4.62	<	0.005	0.005	2.19	0.005	0.235	0.346	4.5
30-06-2003	60	8.3	13	10	4.54	<	0.005	0.005	2.45	0.036	0.290	0.455	7.1
14-07-2003	60	8.4	29	22	4.45	<	0.005	0.005	2.22	0.007	0.231	0.216	8.2
28-07-2003	63	8.3	34	25	4.33	<	0.005	0.005	2.82	0.036	0.323	0.451	9.5
11-08-2003	60	8.8	49	42	3.58	<	0.005	0.005	3.89	0.089	0.504	0.397	12
25-08-2003	60	8.7	46	41	4.15	<	0.005	0.005	4.39	0.179	0.638	0.267	14
08-09-2003	60	8.9	49	45	4.43	<	0.005	0.005	4.26	0.242	0.662	0.213	13
22-09-2003	60	8.5	38	32	4.49	<	0.005	0.005	4.01	0.282	0.650	0.213	12
13-10-2003	65	8.6	12	7.4	4.92	<	0.005	0.106	1.72	0.305	0.451	0.130	11
10-11-2003	62	8.5	22	13	4.89	<	0.005	0.005	1.80	0.012	0.268	0.317	4.3
08-12-2003	65	8.2	11	5.8	5.53	0.422	0.910	2.47	0.095	0.206	0.013	6.1	52

**Gundsømagle Sø 2003 - feldtmålinger**

Dato	Klokkeslet	Sigtdybde m	Total dybde m	Vandstand lokal m
07-01-2003	1300	> 1,40	1,40	
06-02-2003	1245			0,69
04-03-2003	1000			0,61
01-04-2003	1310	0,85	1,55	0,48
15-04-2003	1315	0,75	1,50	0,47
29-04-2003	1245	0,70	1,50	0,52
14-05-2003	1325	0,55	1,55	0,53
04-06-2003	1310	0,60	1,55	0,44
16-06-2003	1045	0,60	1,60	0,44
30-06-2003	1100	0,50	1,50	0,42
14-07-2003	1030	0,45	1,50	0,43
28-07-2003	1020	0,40	1,55	0,44
11-08-2003	1310	0,27	1,45	0,39
25-08-2003	1030	0,27	1,50	0,39
08-09-2003	1310	0,25	1,50	0,41
22-09-2003	1030	0,30	1,50	0,46
13-10-2003	1300	1,00	1,60	0,50
10-11-2003	1300	0,80	1,55	0,58
08-12-2003	1315	1,10	1,60	0,56
13-01-2004	1040	0,85	1,45	0,68



## Bilag 10

## Planteplanktonbiomasser - tidsvægtede årgennemsnit

Årsmedeldata Blågrænslæger mm3/l	Gronælæger mm3/l	Rødkælæger mm3/l	Furealæger mm3/l	Ørrealæger mm3/l	Gulalæger mm3/l			Stilkalæger mm3/l	Ubestemte mm3/l	Total mm3/l	Øvrige mm3/l
					mm3/l	mm3/l	mm3/l				
1989	1.3	0.7	18.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	22.5	1.7
1990	2.1	3.1	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	24.3	1.0
1991	0.2	10.7	14.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	27.6	0.5
1992	4.4	6.3	16.0	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	29.3	1.5
1993	8.9	6.3	13.8	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	32.4	1.0
1994	3.2	2.6	3.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	11.1	0.9
1995	11.3	5.9	4.0	2.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	24.1	0.6
1996	39.2	2.2	3.3	2.6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.6	48.2	0.8
1997	13.5	0.6	5.2	2.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	22.3	0.6
1998	10.6	0.7	3.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	16.8	0.4
1999	1.7	1.6	4.4	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	11.1	0.6
2000	5.4	3.8	4.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	15.8	0.7
2001	11.0	0.9	2.8	2.6	0.3	0.0	0.2	0.1	0.7	18.6	1.3
2002	10.1	2.3	1.1	0.9	0.0	0.9	0.1	0.0	0.5	16.0	1.6
2003	16.8	1.8	3.1	0.7	0.2	0.5	0.1	0.5	0.7	24.5	2.1
Middelværdi 1989-2002		8.8	3.4	8.0	1.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.7	22.9

#### **Udvikling:**

signifikansniveau: symbol (+/-):	0	10%	0,1%	0	0	5%	1%	10%	+
-------------------------------------	---	-----	------	---	---	----	----	-----	---

## Planteplanktonbiomasser - tidsvægtede sommergennemsnit

eær regressionsanalyse

## Planteplanktonbiomasser - %-fordeling årsqqennemsnit

Signifikanzniveau: Symbol (+/-):	1% +++	0 ---	0,1% ----	0 ---	0 ---	10% ++	1% ++	5% ++
-------------------------------------	-----------	----------	--------------	----------	----------	-----------	----------	----------

## Planteplanktonbiomasser - %fordeling sommeren sommertid

Udvikling:  
Lineær regressionsanalyse

## Planteplanktonbiomasser - %-fordeling års gennemsnit

Årgang Kiesstaliger %	Blågrena		Grönalger		Rödalgat		Funaalger		Ørrealger		Gulalger		Stilkalger		Ubestemte		Total		Øvrige	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1989	5,7	3,0	81,1	2,8	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	100	7,5	
1990	8,8	12,6	74,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	100	4,2	
1991	0,8	38,8	52,8	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	100	1,8	
1992	14,9	21,4	54,5	4,2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	100	5,0	
1993	27,6	19,4	42,7	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	100	3,2	
1994	28,6	23,3	32,9	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	100	8,0	
1995	46,8	24,6	16,6	9,5	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,7	100	2,6	
1996	81,4	4,7	6,7	5,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	100	1,7	
1997	60,4	2,6	23,5	10,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	100	2,6	
1998	62,9	4,4	18,5	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	100	2,4	
1999	15,4	14,0	39,2	26,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	100	5,0	
2000	33,9	24,0	26,1	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	100	4,3	
2001	58,8	5,0	15,3	14,0	1,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	100	6,8	
2002	62,9	14,6	7,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	100	10,0	
2003	68,6	7,3	12,7	2,9	1,0	2,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	100	8,4	
Gns. 1989-2002	36,3	15,2	35,1	8,8	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	100	4,7	

Udvikling:

Dyreplankton biomasser samt græsningstryk - tidsvægtede års gennemsnit

Wijkling:  
eer regressionsanalyse

Byrep/ plankton biomasser - %fordeling årsgegnemsnit

Hjælddyrl	Vandloppet	Døbfirer	Total	%	%
%	%	%			
1.9	33.6	64.5	10		
0.7	27.9	71.4	10		
0.8	47.9	51.3	10		
1.1	60.2	38.7	10		
1.3	75.5	23.2	10		
5.9	69.1	25.0	10		
18.4	72.4	9.2	10		
23.6	68.6	5.8	10		
5.8	76.9	17.2	10		
12.2	50.7	37.1	10		
1.7	40.9	57.4	10		
4.8	56.4	38.8	10		
10.5	68.5	21.1	10		
9.9	55.3	34.9	10		
5.8	82.9	11.3	10		
				7.2	35.4
				57.4	10

### Udvikling:

Dytoplankton biomasser samt græsningstryk - tilsvarende sommeren 2014

Hjálptír μg TV/l	Vandloppet Dæfnir μg TV/l	Total μg TV/l	Pot. græsningstryk	Fydo-bio ic	Fydo-bio < Fytoplanktonbiomasse	%-store
			% af total	% < 50 μg C/l	μg C/l	%-smá
1989	40	488	1602	2130	15.9	21.3
1990	8	297	985	1290	11.1	12.4
1991	11	1040	1642	2693	25.6	28.5
1992	29	1399	1143	2571	16.6	16.9
1993	15	1363	447	1824	6.1	6.4
1994	106	949	411	1466	19.1	27.8
1995	163	1119	154	1436	10.7	18.0
1996	54	860	70	984	7.9	19.3
1997	7	1344	246	1597	21.6	27.1
1998	168	581	449	1198	14.9	39.0
1999	23	580	1023	1627	32.0	35.4
2000	75	594	525	1194	19.7	24.4
2001	20	677	171	868	10.3	17.2
2002	67	421	289	777	7.0	24.0
2003	50	666	105	821	4.8	18.8
1989-2001	56	837	654	1547	15.6	22.7
					4009	2338
						62.7

Kling:  
ær regressionsanalyse


Hjælptør %	Vandoppe %	Dafmær %	Total %
1,9	22,9	75,2	100
0,6	23,0	76,3	100
0,4	38,6	61,0	100
1,1	54,4	44,5	100
0,8	74,7	24,5	100
7,2	64,8	28,0	100
11,4	77,9	10,7	100
5,5	87,5	7,1	100
0,5	84,1	15,4	100
14,1	48,5	37,5	100
1,4	35,7	62,9	100
6,3	49,7	44,0	100
2,3	78,1	19,6	100
8,7	54,1	37,2	100
6,1	81,1	12,8	100
4,4	56,7	38,8	100

Udvikling:  
Lineær regressionsanalyse

Hjælptør %	Vandoppe %	Dafmær %	Total %
1,9	22,9	75,2	100
0,6	23,0	76,3	100
0,4	38,6	61,0	100
1,1	54,4	44,5	100
0,8	74,7	24,5	100
7,2	64,8	28,0	100
11,4	77,9	10,7	100
5,5	87,5	7,1	100
0,5	84,1	15,4	100
14,1	48,5	37,5	100
1,4	35,7	62,9	100
6,3	49,7	44,0	100
2,3	78,1	19,6	100
8,7	54,1	37,2	100
6,1	81,1	12,8	100
4,4	56,7	38,8	100

Udvikling:  
Lineær regressionsanalyse

Grafik



## Bilag 11

**Fiskeynglen  
i  
Gundsømagle Sø**

**Juli 2003**



Notat udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium oktober 2003  
Konsulenter : Jens Peter Müller & Helle Jerl Jensen

---

## 0. Sammenfatning

*Feltundersøgelsen*

I forbindelse med Roskilde Amts overvågning af miljøtilstanden i Gundsømagle Sø blev fiskeynglen undersøgt i natten mellem 3.- 4. juli 2003. Undersøgelsen, som er blevet foretaget siden i 1998, blev udført i overensstemmelse med anvisningen fra DMU med yngeltræk i 6 transekter i littoralen og 6 transekter i pelagiet af 1-2 minutters varighed.

*Ynglens tæthed og sammensætning*

Der blev konstateret årsyngel fra 3 arter; skalle, aborre og regnløje samt etårige regnløjer i fangsten.

Den samlede yngeltæthed beregnet ud fra fangsten (inklusive etårige regnløjer) var 5,82 pr. m<sup>3</sup> i littoralen og 4,51 pr. m<sup>3</sup> i pelagiet, og middeltætheden i søen var noget mindre end i 2002. Tætheden af fiskeyngel er generelt øget i forhold til de første undersøgelsesår. Vægtmæssigt var tætheden med 3,17 g vådvægt pr. m<sup>3</sup> i littoralen og 3,07 g pr. m<sup>3</sup> i pelagiet meget stor hovedsageligt som følge af en betydelig mængde etårige regnløjer i fangsten. Blandt årsynglen var regnløjeyngel antalsmæssigt dominerende over hele søen, og aborrengel forekom kun sparsomt.

Sammenlignet med 16 andre danske søer, hvor der er foretaget yngelundersøgelser de fem seneste år, var middeltætheden af karpefiskeyngel ligesom ved de tre foregående undersøgelser meget betydelig, mens aborrefiskeyngelens tæthed var tæt på medianen. Den samlede yngeltæthed er øget betydeligt siden 1998 til et højt niveau i de seneste tre år.

*Størrelse*

Skalleynglen var normal, mens aborrenglen var forholdsvis stor for tidspunktet i Gundsømagle Sø, hvilket har været tilfældet ved alle undersøgelserne siden 1998.

*Årgangsstyrke*

I 2003 var middeltætheden af karpefiskeyngel i lavvandede søer øget lidt i forhold til de seneste to år, mens aborrenglen generelt forekom under middel. I Gundsømagle Sø er der overvejende registreret yngel af skalle, regnløje og aborre ved yngelundersøgelserne siden 1998. Skalleyngelens tæthed har kun været betydelig i 2000 og 2001, mens regnløjernes tæthed generelt har været stigende gennem perioden. Aborrernes tæthed har generelt været beskeden. Dermed afviger rekutteringen i Gundsømagle Sø fra det generelle mønster i lavvandede søer.

*Fordeling*

Ynglens fordeling i de undersøgte søer viste en forkærlighed hos karpefiske- ynglen for de lavvandede områder, og kun i de uklare og lavvandede søer fandtes karpefiskeyngel i pelagiet. Aborrefiskeynglen var generelt mere pelagisk, dog med generelt aftagende mængder med øget dybde og sigtdybde. Fiskeyngelens sammensætning i Gundsømagle Sø i juli 2003 var i overensstemmelse med søens status som lavvandet og uklar.

*Påvirkning af dyreplanktonet*

Fiskeyngelens beregnede konsumptionsrate (inklusive etårsfisk) omkring 1. juli var med 41 mg tv/m<sup>3</sup>/d omrent som i 2002, og fiskeynglen har næppe alene kunne begrænse søens dyreplankton. Fiskenes samlede prædationstryk på dyreplanktonet kan dog have været betydeligt i sommeren 2003 som følge af prædation fra ældre fisk.


## 1. Baggrund og formål

I foråret 1997 vedtog Styringsgruppen for Ferskvand, at undersøgelser af fiskeyngel fra 1998 skal indgå i det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljøet (NOVA 2003).

Gundsømagle Sø er udvalgt som overvåningssø, og som følge heraf blev der i juli 2003 foretaget en undersøgelse af fiskeynglen. Formålet med undersøgelsen har været at belyse årsynglens mængde og sammensætning, for her igennem at vurdere fiskeynglens betydning for søens økologi over sommeren.

## 2. Materialer og metoder

Fiskeriet fandt sted natten mellem den 3.-4. juli 2003 i tidsrummet kl.23.05 - 00.05, og blev udført som beskrevet i vejledningen for fiskeyngelundersøgelser i søer fra Danmarks Miljøundersøgelser /1/. Søen blev således inddelt i 6 sektioner, der hver især blev befisket med 1-2 minutter i et transekts i bredzonen og 1-2 minutter i et transekts i pelagiet (fig.1) med et standardyngelnet (hoopnet).



*Figur 1. Kort over Gundsømagle Sø med angivelse af sektioner og placering af transekter.*

### Fiskeri med yngelnet

Det anvendte yngelnet var et standardnet som beskrevet i vejledningen, dvs. bestående af en 1 m lang cylindrisk del med en diameter på 40 cm og en maskestørrelse på 2 mm og en 1 m lang konisk del med en maskevidde på 1 mm monteret med en opsamlingsbeholder. Nettet var monteret med et kalibreret flowmeter placeret i nettets åbning.

Nettets centrum blev placeret 0,5 meter under overfladen og bevæget med en hastighed af omkring 1,5-2,5 m/s.

### Registrering

Ved de enkelte træk blev starttidspunkt, sluttidspunkt og omdrejningstæller

ved start og slutning registreret. Fangsten blev opsamlet i plastikglas og nedkølet til udsortering følgende dag.

Ved registreringen blev fiskene sorteret i arter og opmålt til nærmeste mm., og fangsten af de respektive arter blev for hver transekt vejet til nærmeste 1/10 g.

## 2.2 Beregninger

### Tæthed

For hvert transekt er den gennemsnitlige fangst i antal og i vægt pr. m<sup>3</sup> udregnet både for de enkelte arter og for hele årsynglen som fangsten divideret med den filtrerede vandmængde. Herefter er et gennemsnit for de respektive transekter i littoralzonen og i pelagiet med tilhørende varians udregnet.

### Gennemsnitsvægt

Tilsvarende er de enkelte arters gennemsnitsvægt (vådvægt) beregnet som et gennemsnit af gennemsnitsvægten fundet i de respektive transekter.

### Vægtet gennemsnit

I diskussionsafsnittet er anvendt arealvægtede gennemsnit beregnet som middelværdien i de respektive områder ganget med områdets andel af søarealet. Littoralzonen er sat ud til 50 m fra kystlinien dog maksimalt 50 % af søarealet.

### Daglig vækstrate

Middelvækstraten pr. dag er beregnet ud fra middeltal for den målte længdetilvækst i perioden fra yngelundersøgelse til den efterfølgende fiskeundersøgelse efter normalprogrammet i en række sør (tab.1).

**Tabel 1**

*Den gennemsnitlige målte daglige længdetilvækst (dL) og b fra længde-vægtrelationen hos årsyngel og etårige af de respektive fiskearter i sør, hvor der efterfølgende en yngelundersøgelse er foretaget fiskeundersøgelse efter normalprogrammet.*

mm/d	Antal sør	Gens.	Min	Max	b
Skalle 0+	11	0,385	0,216	0,570	3,114
Brasen 0+	4	0,456	0,320	0,579	3,292
Regnløje 0+	3	0,142	0,100	0,190	2,671
Rudskalle 0+	1	0,270	0,270	0,270	4,360
Aborre 0+	12	0,443	0,279	0,630	3,033
Sandart 0+	1	0,526	0,526	0,526	2,851
Skalle 1+	3	0,355	0,190	0,668	3,027
Regnløje 1+	2	0,131	0,110	0,152	3,717

Den daglige vækstrate omkring undersølsestidspunktet ( $G_t$ ) er herefter beregnet som :

$$G_t = b \ln((L_t + dL)/(L_t))$$

hvor  $L_t$  er den målte middellængde ved undersøgelsen og  $dL$  og  $b$  er henholdsvis den gennemsnitlige længdetilvækst og  $b$  fra længdevægtrelationen.

*Konsumptionsrate*

Den daglige konsumptionsrate på prøvetidspunktet er beregnet i mg tv/m<sup>3</sup>/d som:

$$K = 1000 (G_t B_t)$$

hvor  $B_t$  er den beregnede arealvægtede biomassetæthed på prøvetagningstids punktet.

*Årgangsstyrke*

Årgangsstyrken hos de respektive arter er vurderet udfra undersøgelserne foretaget i perioden 1998-2003.

*Sammenlignings-  
grundlag*

De beregnede værdier er så vidt muligt sammenholdt med tilsvarende størrelser fra 101 undersøgelser fra i alt 16 andre danske sører, hvor yngelundersøgelsesprogrammet har været anvendt siden 1998.

### 3. Resultater

#### 3.1 Arealtæthed

Der er ved undersøgelsen konstateret årsyngel af skaller, aborrer og regnløjer, samt etårige regnløjer. Den beregnede arealtæthed af de respektive arter i littoralen og i pelagiet og de respektive arters numeriske andel af fangsten er givet i tabel 2, mens samme data fordelt på karpefisk (inklusive etårige regnløjer), aborrefisk, laksefisk og øvrige fisk er givet i tabel 3.

**Tabel 2**

*Den beregnede tæthed af fiskeynglen hos de respektive arter i littoralzonen og i pelagiet i Gundsømagle Sø juli 2003.*

Antal/m <sup>3</sup>			Procent	
	Littoralen	Pelagiet	Littoralen	Pelagiet
Skalle 0+	1,230	0,558	21	12
Regnløje 0+	2,650	1,854	46	41
Regnløje 1+	1,846	1,986	32	44
Aborre 0+	0,095	0,115	2	3

**Tabel 3**

*Den beregnede tæthed af fiskeynglen hos de respektive grupper i littoralzonen og i pelagiet i Gundsømagle Sø juli 2003.*

Antal/m <sup>3</sup>			Procent	
	Littoralen	Pelagiet	Littoralen	Pelagiet
Karpefisk	5,726	4,398	98	97
Aborrefisk	0,095	0,115	2	3
Laksefisk	0,000	0,000	0	0
Andre	0,000	0,000	0	0
Total	5,821	4,513	100	100

Hovedparten af fangsten var årsyngel og etårige regnløjer, som optrådte med en høj tæthed over hele søen. Skalleynglen fandtes dog ligeledes i betydelige tætheder især i littoralen. Samlet udgjorde karpefisk med over 97 % langt hovedparten af fangsten over hele søen (tab.2 og 3).

#### Biomassetæthed

Vægtmæssigt var fangsten helt domineret af etårige regnløjer over hele søen. Blandt årsynglen fandtes skaller og regnløjer i omkrent lige store mængder. Aborreynghen udgjorde hverken antalsmæssigt eller vægtmæssigt nogen væsentlig andel af fangsten (tab.4 og 5).

**Tabel 4**

*Den beregnede biomassetæthed af fiskeynglen hos de respektive arter i littoralzonen og i pelagiet i Gundsømagle Sø juli 2003.*


Vådvægt/m <sup>3</sup> (g)			Procent	
	Littoralen	Pelagiet	Littoralen	Pelagiet
Skalle 0+	0,298	0,128	9	4
Regnløje 0+	0,230	0,173	7	6
Regnløje 1+	2,515	2,643	79	86
Aborre 0+	0,130	0,121	4	4

**Tabel 5**

*Den beregnede biomassetæthed af fiskeynglen hos de respektive grupper i littoralzonen og i pelagiet i Gundsømagle Sø juli 2003.*


Vådvægt/m <sup>3</sup> (g)			Procent	
	Littoralen	Pelagiet	Littoralen	Pelagiet
Karpefisk	3,042	2,944	96	96
Aborre fisk	0,130	0,121	4	4
Laksefisk	0,000	0,000	0	0
Andre	0,000	0,000	0	0
Total	3,173	3,066	100	100

Sammenlignet med andre søer, hvor der er foretaget undersøgelser af fiskeynglen, var karpefiskeynglens tæthed i juli 2003 betydelig ikke mindst i pelagiet. Middeltætheden i søen var dog faldet lidt i forhold til de to seneste år, men generelt har der været en stigende tendens siden fiskeyngelundersøgelsernes start i 1998 (fig.2).




*Figur 2. Tætheden af karpefiskeyngel i Gundsømagle Sø i 1998-2003 i littoralzonen, pelagiet og i hele søen sammenlignet med tætheden fundet i andre danske søer.*

Aborre fiskekeynglens tæthed var mere moderat og tæt på medianen blandt referencesøerne over hele søen (fig.3). Aborrekeynglens tæthed var dermed reduceret noget i forhold til de to foregående år.




*Figur 3.* Tæthedens af aborrefiskeyngel i Gundsømagle Sø i 1998-2003 i littoralzonen, pelagiet og i hele søen sammenlignet med tæthedens fundet i andre danske sører.

Den samlede tæthed af fiskeyngel har generelt været tiltagende siden 1998, fra et moderat niveau til et højt niveau i de tre seneste år sammenlignet med tæthedens fundet i de øvrige undersøgte sører (fig.4).



*Figur 4.* Tæthedens affiskeyngel i Gundsømagle Sø i littoralzonen, pelagiet og i hele søen i 1998-2003 sammenlignet med tæthedens fundet i andre danske sører.


Den samlede biomassetæthed var høj som i de tre foregående år, ikke mindst som følge af en del etårsfisk i fangsten (fig.5).



*Figur 5. Biomassetæthedden af fiskeyngel i Gundsømagle Sø i 1998-2003 i littoralzonen, pelagiet og i hele søen sammenlignet med tætheden fundet i andre danske søer.*

#### *Størrelsesfordeling*

Størrelsesfordelingen af fangsten af skalle, aborre og regnløje fremgår af figur 6.




*Figur 6. Længdefordelingen af de respektive arter i fangsten i Gundsømagle Sø juli 2003.*

Middelvægten hos skalleårsynglen var normal for tidspunktet, mens aborreysynglen var stor i forhold til middelvægten fundet på samme tidspunkt i de øvrige søer (fig.7). Størrelsen på aborreårsynglen i Gundsømagle Sø har dog ved alle undersøgelserne været over middel.

Der må forventes en meget stor spredning i ynglens størrelse på et givent tidspunkt i de respektive søer, på grund af morfometriske forskelle, som bl.a. påvirker gydetidspunkt og tilvækst som følge af den meget forskellige hastighed hvormed opvarmningen af svøndet foregår gennem forsommeren.

Middeltemperaturen i det første halvår af 2003 har været usædvanlig høj med månedsmidler væsentligt over normalen i de fleste måneder, hvilket kan have resulteret i en tidlig gydning og en hurtig opvækst i Gundsømagle Sø.


#### *Middelvægt*



**Figur 7.** Middelvægten af skalle- og aborre ynglen på undersøgelsestidspunktet i Gundsømagle Sø juli 2003 (stjerne), sammenlignet med årets øvrige undersøgelser (sort markering), tidlige undersøgelser i Gundsømagle Sø (rød markering) samt med andre tidlige undersøgte danske søer.

## 4. Vurderinger


Selvom søers fiskebestande oftest udviser variationer, som kan relateres til søernes morfologi og næringsniveau, er forholdene vedrørende årsynglen mere komplekse. Der vil således i alle sør og hos de fleste arter forekomme meget betydelige år til år variationer i ynglens mængde, idet de klimatiske forhold om foråret og gennem forsommernes påvirker henholdsvis gydetids punkt og vækst og overlevelse hos den spæde yngel. Dette fremgår tydeligt af figur 8, som viser procentafvigelsen fra gennemsnittet af årgangsstyrken hos aborre, brasen og skalle i perioden 1989-98, vurderet udfra fangsten af etårige- og ældre fisk ved fiskeundersøgelser efter normalprogrammet.



*Figur 8. Den gennemsnitlige årgangsstyrke i en række danske sør målt som afvigelse fra middel i perioden 1989-1998 hos aborre, brasen og skalle samt middeltemperaturens afvigelse fra normalen i april-maj og i juni-juli i samme periode /2/.*

Som figuren viser er der især hos brasener en negativ sammenhæng mellem et varmt forår efterfulgt af en kold sommer og årgangsstyrken i de respektive år. Generelt er der især hos de relativt sent gydende arter herunder brasen, rudskalle, suder og karusse ofte meget store variationer i ynglens mængde i sensommernes, antagelig bl.a. på grund af afhængigheden af en korrekt timing mellem ynglens fremkomst og et rimeligt fødegrundlag. Dette synes især at være gældende i klarvandede sør, hvor årsynglen ligeledes er utsat for rov fra aborrer, og hvor svigtende rekruttering er regelen mere end undtagelsen hos de nævnte arter.


Sammenlignes middeltætheden af fiskeyngel i 16 undersøgte sør i årene 1998-2003 ses i de lavvandede sør den højeste middeltæthed af karpefisk i 1998 og den laveste i årene 2000 og 2001, og en mindre tæthed i årene efter, mens tætheden af aborrefisk var høj i 1998, 1999 og i 2001 og lav i de øvrige år (fig.9). I de dybe sør har karpefiskeynglens rekruttering været ringest i 2001 og 2003, og hos aborrefiskene har rekrutteringen kun været god i 1999 og til dels i 2003.



**Figur 9.** Fiskeynglens gennemsnitlige tæthed i 7 lavvandede ( $< 3 \text{ m}$ ) og 7 dybere ( $> 3 \text{ m}$ ) søer i 1998-2003.

I perioden 1998-2003 har foråret i alle årene på nær i 2001 været varmt, men kun i 1999, 2002 og i 2003 har sommeren været tilsvarende varm. Dette kan være en forklaring på de generelt gode rekrutteringsforhold i 1999, mens rekrutteringen i de to seneste år især for aborre fisk har været mere moderate.

I Gundsømagle Sø er der overvejende registreret yngel af skalle, regnløje og aborre ved yngelundersøgelserne siden 1998 (fig.10). Skalleynglens tæthed har været beskeden i 1998 og 1999, betydelig i 2000 og 2001 og igen ringe i 2002 og 2003, mens regnløjernes tæthed generelt har været stigende gennem perioden. Aborrernes tæthed har generelt været beskeden. Dermed afviger rekrutteringen i Gundsømagle Sø fra det generelle mønster i lavvandede søer.




**Figur 10.** Fiskeynglens tæthed i Gundsømagle Sø 1998-2003. Gruppen Øvrige K.F. består helt overvejende af regnløjer.

#### Fordeling


Forskellige forhold påvirker dog ynglens adfærd. Vandets klarhed er således tilsyneladende afgørende for valget af habitat hos især karpefiskeyngel, idet ynglen i stigende grad foretrækker bredzonen med øget sigtdybde i de undersøgte søer. Hos aborre ynglen, som generelt er mere pelagisk, ses dette mønster ikke (fig.11). Generelt var der dog meget lidt fiskeyngel i pelagiet i søer med sigtdybder større end 2 m.

Middeldybden synes ligeledes at påvirke fiskeynglens mængde i bredzonen og i pelagiet. Således aftager mængden af karpefiskeyngel i pelagiet voldsomt med øget middeldybde i de undersøgte søer, hvorimod karpefiskenes mængde i littoralen kun aftog mere moderat med dybden (fig.12). Hos aborrefiskene var der ingen væsentlig forskydning mellem pelagiet og bredzonen ved øget middeldybde.

Det generelle billede er således, at karpefiskeyngel er tæt knyttet til de lavvandede områder i juli måned, og kun i de uklare, lavvandede søer findes karpefiskeynglen i pelagiet i nævneværdigt omfang. Aborrefiskeynglen har ikke samme præference for bredzonen, men tætheden aftager dog tilsyneladende generelt med øget sigtdybde.



*Figur 11. Fiskeynglens arealtæthed i littoralen og i pelagiet i søer med forskellig sigtdybde.*



*Figur 12. Fiskeynglens arealtæthed i littoralen og i pelagiet i søer med forskellig middeldybde.*

Fiskeynglens fordeling i juli 2003 i Gundsømagle Sø med betydelige mængder yngel i pelagiet er dermed i overensstemmelse med det generelle billede i en lavvandet uklar sø.

#### Påvirkning af dyreplankton


Fiskeynglens potentielle påvirkning af dyreplanktonet afhænger af både ynglens daglige fødebehov, som igen afhænger af deres specifikke vækstrate og af udnyttelsen af føden, og af dyreplanktonets produktivitet.

Vækstraten hos fiskeyngel aftager generelt med størrelsen, hvorimod længdetilvæksten pr. tidsenhed tilnærmelsesvis er konstant, såfremt forholde- ne ikke ændres væsentligt. Af samme grund er der ved beregningen af ynglens specifikke vækstrater taget udgangspunkt i en konstant længdetilvækst i perioden fra yngelundersøgelserne til fiskeundersøgelserne i sensommeren.

Vækstforholdene er dog kraftigt afhængig af både fødeudbud og vandtemperatur, hvorfaf sidstnævnte forhold ligeledes påvirker fødens udnyttelsesgrad.


Endelig er fiskeynglens potentielle påvirkning af dyreplanktonet ikke synonymt med fiskebestandens påvirkning af samme, da etårige- og ældre fisk ofte yder et meget betydeligt prædationstryk på dyreplanktonet.

I figur 13 er vist fiskeynglens (inklusive registrerede etårsfisk) skønnede daglige konsumption i de undersøgte sører. I Gundsømagle Sø var karpefiske- ynglens samlede prædationstryk i juli 2003 med 36 mg tv/m<sup>3</sup>/d meget højt dog uden at nå niveauet fra 2001, mens aborrefiskekeynglens beregnede prædations- tryk med 5 mg tv/m<sup>3</sup>/d var mere moderat og mindre end i de tre foregående år. Totalt var yngelprædationen med 41 mg tv/m<sup>3</sup>/d omrent som i 2002 , og langt over medianen blandt referencesøerne.



*Figur 13. Fiskeynglens konsumptionsrate i Gundsømagle Sø 1998-2003 sammenlignet med konsumptionsraten fundet i andre danske sører.*

Fiskeynglens skønnede konsumptionsrate er forskellig i de forskellige søtyper (fig.14). I de uklare sører er både karpefiskenes- og aborrefiskenes konsumption størst, hvilket antageligt hænger sammen med en større produktion af dyreplankton, og fiskeynglens konsumption falder i sører med middeldybde større end 2 m. I de næringsbegrænsede sører (tot-P sommertid gennemsnit < 100 µg/l) er fiskeynglens konsumption normalt beskedent.



**Figur 14.** Fiskeynglens konsumptionsrate i søer med forskellig sigtdybde, middeldybde og tot-P koncentration over sommeren (1/5-30/9).

I lavvandede, uklare og næringsrige søer som Gundsømagle Sø er konsumptionsrater hos fiskeynglen typisk mellem 30-45 mg tv/m<sup>3</sup>/d, og årets beregnede prædationstryk i Gundsømagle Sø er således som forventet.


Der forligger endnu ikke tal for dyreplanktonet i 2003, men i 2002 var dyreplanktonets sommernemsnitlige biomasse 777 mg tv/m<sup>3</sup>, hvilket svarer til en maksimal daglig middelproduktion på ca. 80-160 mg tv/m<sup>3</sup>/d ved en turn-over på 5-10 dage.

Selvom fiskeynglens prædation således næppe alene har været begrænsende for dyreplanktonbiomassen i starten af juli 2003, kan fiskenes samlede prædationstryk på dyreplanktonet have været betydeligt i sommeren 2003 som følge af prædation fra ældre fisk.

Fiskeynglen reguleres af en række forhold, hvoraf fødegrundlaget for den spæde yngel og prædation må antages at være de væsentligste faktorer. I klarvandede søer er mængden af dyreplankton normalt mindre end i mere produktive søer, og prædationstrykket på fiskeynglen er større, som følge af aborrens større betydning som rovfisk. Yngel af de fleste arter reagerer på klart vand med en udstrakt stimedannelse oftest i og umiddelbart udenfor bredvegetationen, hvilket begrænser deres fødesøgningsmuligheder og gør dem dermed mere sårbar overfor små koncentrationer af dyreplankton.

En sammenligning af fiskeynglens konsumptionsrate og dyreplanktonets sommermiddelbiomasse i uklare og klarvandede søer viser således ringe sammenhæng i de uklare søer, mens der er en positiv sammenhæng i de klarvandede søer. Dette tyder på, at tilgængeligheden af dyreplankton er en væsentlig regulerende faktor for fiskeynglen i de klarvandede søer, hvorimod fiskeynglens prædation på dyreplanktonet er af mindre regulerende betydning for dyreplanktonet i både klarvandede og uklare søer.

Gundsømagle Sø har gennem perioden haft sommersigtdybder mindre end 1 m, og som i flere af de øvrige uklare søer har dyreplanktonets biomasse været meget betydelig i forhold til fiskeynglens beregnede konsumption. Kun i 2001 var yngelprædationen betydelig i forhold til mængden af dyreplankton over sommeren.



*Figur 15. Dyreplanktonets sommermiddelbiomasse i uklare sører (sommermiddelsigtdybde<1m) og i klarvandede sører (>1m) i forhold til beregnede fiskeyngelkonsumptionsrater målt i årene 1998-2001. Gundsømagle Sø er angivet med sort markering.*



## Bilag 12

## Oversigt over udførte undersøgelser i Gundsmagle Sø i overvågningsperioden

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Vandkemi i sø	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vandkemi i tilløb	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vandkemi i afløb	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Planteplankton	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dyreplankton	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fiskeundersøgelse	x														
Bundfauna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Littoralfauna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sediment					x				x				x		
Miljøfremmede stoffer															
Fiskekeyngelundersøgelse													x	x	x

## Oversigt over tidligere undersøgelser i Gundsømagle Sø foretaget af Roskilde Amt før 1989

År	1975 x/x = antal målinger	1979 x/x = antal målinger	1980 x/x = antal målinger	1986 x/x = antal målinger	1988 x/x = antal målinger
Emne					
Søvand: vandkemi / ilt-, temperaturprofil og sigtdybde	2 / 2	9 / 10	8 / 8	12 / 12	1 / 8
Stoftransport: tilløb / afløb		17 / 11	12 / 5	16 / 23	16 / 15
Bundsediment	1	1		1	
Fytoplankton (art og mængde)			3		
Undervandsvegetation		1	1		
Bundfauna		1			
Fiskebestand		1		1 *	
Publiceret i:	/A/	/A/	/A/	/B/ * dog i /C/	/C/

- /A/ Roskilde Amtskommune (1982): Østrup-Gundsømagle Sø 1979-80. Udarbejdet af Roskilde Amtskommunes tekniske forvaltning for Hovedstadsrådet.
- /B/ Hovedstadsrådet (1986): Gundsømagle Sø 1980-86. Udarbejdet af Dansk Miljøværn A.m.b.a. for Hovedstadsrådet.
- /C/ Hovedstadsrådet (1989): Fiskeribiologisk undersøgelse i Gundsømagle Sø, september 1986. Udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium for Hovedstadsrådet.

